

COMMENTARII
DE REBUS
IN
SCIENTIA NATVRALI
ET
MEDICINA
GESTIS.



VOLVMINIS IV. PARS III.

LIPSIAE, MDCCLV.

APVD IOH. FRIDERICVM GLEDITSCH.

Venduntur etiam

Amstelodami apud I. Schreuder et P. Mortier iun. Parisiis apud
Briasson, Patavii apud I. Manfrè, Venetiis in B. Albrizzi et S.

Coleti officinis, Romae apud Venant. Monaldini.

CHURCH OF THE HOLY TRINITY

NEW YORK

1851

1851



I.

Philosophical Transactions, giving some account of the present Vndertakings, Studies and Labours of the ingenious, in many considerable Parts of the World. Vol. XLVIII. Part. I. For the Year 1753. London. Printed for C. Davis. 1754. 4. 2 alph. 3 pl. tab. aen. XII.

i. e.

Transfactiones philosophicae, quae laborum, ab eruditis in variis orbis terrarum partibus nouissime susceptorum, quandam exhibent notitiam.



Nouum, quod indicamus, harum transactionum volumen, variis singularibus obseruationibus locupletatum, eodem, ac praecedens, modo compositum, ut plura de eo praefari non debeamus, nos monet. Hinc ad expositas in eo obseruationes mox accedimus. Occurrit itaque:

1) *Relatio de vortice extraordinario, qui in comitatu Tyronensi, Hiberniae, per Termonomungan et Vrney a. d. 11. Octobris, 1752 saeuit, data per GUIL. HENRY, communicata per Ill. CADOGAN, Reg. Soc.* p. i.
Bb 2 Membr.

Membr. *. Quinque minuta prima durans, imbre vehementiore subsequuto, ex plaga orienti et meridiei media, ad plagam occidenti et septentrioni intermediam directus vortex aedificia, arbores hortosque destruxit immaniter, id, quod exemplis enarratis comprobatur.

p. 5. 2) *Recensio libri*: P. D. PAVLI FRISII Mediolanensis, &c. disquisitio mathematica in causam physicam figuræ et magnitudinis Telluris nostræ, qui prodiit Mediolani 1752. Auctore I. SHORT, Soc. Reg. Membr.

p. 17. 3) *Epistola* Cl. GEORG. COSTARD, Membr. Colleg. Wadhamensis, data Oxonii ad Cl. BEVIS, concernens annum eclipseos, quæ a THALETE fuerat prædicta.

p. 26. 4) *Casum* ANNAE ELISABETH QVERIOT, Parisiensis, cuius ossa distorta atque emollita fuerunt, describit AMBROSIVS HOSTY, Med. D. Fac. Paris. Adsess. **. Haec femina, cuius etiam iconem, morbosam dislocationem ossium ostendentem, addidit Cl. Auctor, triginta duos annos nata, sana et integra postquam aliquos enixa fuerat infantes, de dolore artuum conqueritur, ineptitudinem incedendi quæ producebat, infelici etiam casu in sinistrum latus, tumorem inferioris extremitatis illius lateris, sed sine fractura vel luxatione persentiscebatur. Noua post impregnatione, nouoque casu omnia haec mala exacerbabantur, nec non incongruis adhibitis medicationibus ingrauescebant. Nihilo tamen secius, partu feliciter absoluto, sex mensibus elapsis, adhuc vehementioribus excruciatâ doloribus, urinam, calcareo sedimento saturatam emisit, a quo etiam tempore pollex

* Lecta a. d. 11. ian. 1753.

** Lecta d. 25. ian. 1753.

pollex dextrae manus ad minimum digitum distortus videbatur. Sequebantur mox alia distortionis momenta in omnibus fere ossibus, inferiores praecipue extremitates ita distorquebantur, parallela corpori, ut recta extrorsum verterentur, pectus autem vehementer coarctaretur. Cretacea urinae materies cum acidis efferuescebat. Praeterimus reliqua vitae molestissimae symptomata, observavit autem Cl. Auctor, sputa et exsudantes ex corpore humores in linteis maculas reliquisse nigras, quales ab unguento vel datis mercurialibus remediis solent superesse, quibus apparentibus sedimentum in urina defuit. Credit ita p. 30. que Noster humores qualitatem contraxisse mercurialem, sedimentum urinae vero terream, quae solidum ossibus praebet fundamentum, fuisse materiam, per vitiatam fluidorum qualitatem exsolutam atque ex corpore per varia loca eliminatam. Post mortem concessa cadaueris sectione, ossium, flexilium redditorum et distortorum peruestigatio miranda adhuc demonstravit phaenomena. Scalpello ossa facile, etiam duriora, ut apophysis ossis temporum petrosa, poterant pertundi, cellularis vel caavernosa eorum interna tela maximam partem destructa, et loco medullae rubra densaque materia, sanguinis coagulati instar, unguinosa substantia mixta, detegebatur. Ossium latorum superficies sine diploe sibi incumbabant, suturae cranii abolitae erant, dentes autem duritiae sua naturali adhuc persistebant. In cerebro nulla mutatio, nisi, quod dextrum esset sinistro largius haemisphaerium. Speciales etiam cuiuscunque ossis conditiones observatae, casus adeo peculiaris recensentur.

5) *Descriptio arae romanae, cui inscriptio insculpta p. 33. erat, mense aprili, Eboraci detectae, et societati antiquitatum traditae a Cl. FRANCISCO DRAKE, accedit brevis explicatio inscriptionis per Cl. IO. WARD.* Bb 3 6) *Histo-*

p. 42.

6) *Historiam quorundam hominum, febre carcerum affectorum, in Newgate exorta, modumque, quo infectio uniuersae familiae communicata fuit, refert Cl. IO. PRINGLE**. Qui iam saepe huius morbi sollicitam instituit peruestigationem, ut alibi notauimus, Cl. Auctor**, nunc in eo est, ut, quid ventilatoris Halesiani applicatione boni fuerit praestitum, per experimenta doceat. Machina quadam, mola, quae vento agitur, simili, illi tribuitur motus, tubique, in conclauia carcerum directi, huius ope putridum aerem hauriunt, nouoque puro ingressum concedunt. Hinc euenit, ut breui intercedente

p. 45.

tempore notabilis admodum mutatio fuerit percepta, putridi, carceres occupantes, halitus dissipati, sanitasque captiuorum confirmata. Immo ex ipso ventilatore aer, putrido et laedente admodum odore refertus exiisse obseruatus est. Exemplum enim adducit Cl. Auctor hominis cuiusdam, qui in hoc opere laborauerat, et tubum ventilatoris, per aliquot temporis spatium clausum, iterum aperuerat, ex quo putridus exeuns aer mox eum ita inuasit, ut nausea, cardialgia atque mox subsequente febre fuerit afflatus. Idem euenit aliis, eodem officio defunctis, in primis iuniori quindecim annorum homini, qui inter ventilatoris truncum, in motu non versantis, aliquoties constitutus, nullam noxam perceperat, eo vero, in motum deducto mox suffocationis periculum incurrit, et maligna febre conflictatus est. Septem autem enumerantur exempla hominum, per corruptum aerem, extractum mediante ventilatore, affectorum morbo hocce periculoso, qui simul unius ex his uniuersae familiae contagiosus extitit, ex quo concludit Cl. Auctor, quanta sit necessitas praecauendi, ne putris in carceribus coaceruetur aer, vel in eius modi certe locis, in quibus multitudo hominum simul

* Lecta a. d. I. febr. 1753.

** Conf. Comment. nostr. Vol. II. P. III. p. 396 seq.

simul angustis in locis sordide viuere cogitur, optimum autem in mutatione depurationeque atmosphaerae auxilium esse repositum.

7) *Recensio ingentis mutationis, quam perpeſſae ſunt* p. 55.
insulae Silurum (Silley) *ex peruetuſtis temporibus, ratione ſcilicet numeri, magnitudinis ſitusque, contenta in epistoſa data ad Cl. T. H. BIRCH, per Reu. W. M. BORLASE. Mutationes autem inundationibus factas fuiſſe ſuſpicatur.*

8) *Methodum, aquam marinam dulcem reddendi,* p. 69.
a Cl. APPLEY inuentam, additis quibusdam experimentis, cum illa inſtitutis, ſiſtit GUIL. WATSON.*
Huius ſuſcepti tentaminis mentionem alibi iam fecimus**, quod denuo refert Cl. WATSON, et experimenta Cl. CLARK, pharmacopoei, ſubiungit. Proportionem autem ſequentem adducit. Ad viginti menſuras aquae marinae ſumuntur ſex unciae alcali fixi, ex calce viua parati, totidem lapidis infernalis, et offium, ad albedinem calcinatorum, in ſubtilem puluerem conuerſorum, lenique igne quindecim menſurae deſtillantur. Cl. CLARK ita fecit tentamina: cochleari aquae deſtillatae, viginti guttas ſoluti in aqua forti argenti inſtillauit, itemque cum aqua comuni repetiit, nulla tamen deprehenſa in utraque mutatione, quod abſentiam ſalis marini arguit. Volatilem vero urinoſum ſpiritum adhuc ſupereſſe, manifeſtum euasit ex inſtillatis decem guttis ſoluti ſacchari ſaturni, quae eam turbidam effecerunt. Si- mile namque euenit, dum aquae communis cochleari uni duae ſpiritus ſalis ammoniaci guttae adderentur, quae admixtis decem guttis ſacchari ſaturni ſoluti pariter mixturam turbidam reddiderunt. Si porro dictae quantitati aquae communis deſtillatae additur

Bb 4 unica

* Lecta a. d. 8. febr. 1753.

** Conf. Comment. noſtr. Vol. III. P. III. p. 556.

unica olei tartari per deliquium guttula, post vero decem guttae saturatae solutionis sublimati corrosiui, mox euadit mixtura turbida, atque solutione argenti praecipitatur et lactescit: ut ea propter volatile in illa alcali contineri censendum sit. Solutio enim argenti fixum tantum alcali manifestat, prout solutio sacchari saturni exiguam salis marini quantitatem non detegit, solutio e contrario sublimati utriusque generis alcali signa exhibet.

P. 71. 9) *Epitome literarum* Cl. CAMILLO PADERNI ad D. MEAD *scriptarum de antiquitatibus, in Herculaneo reperiundis, datarum Neapoli d. 18. novembris 1752.* Breuissimis recenset thesauros quosdam detectos.

P. 73. 10) *Transductio et explanatio quorundam capitum ex libro, qui inscribitur Theorie de la figure de la Terre* Auctore Cl. CLAIRAUT.

P. 86. 11) *Relatio de tempestate, tonitru et fulguribus mixto, prope Ludgvan in Cornubia, contenta in literis* Cl. WM. BORLASE, ad Reu. LYTTETON. Mirandos motus et effectus recensitos legimus huius tempestatis, in diuersis locis productos.

P. 94. 12) *Altera epistola* Cl. IO. HENRY ad Cl. CADOGAN *de fonte cupreo in regione Wicklow, Hiberniae**. Noua instituta obseruatione confirmatur, aquas huius fontis vere in cuprum conuertere ferrum, hoc, dum corroditur, limi instar apparere, illum, ne ab aquarum motu abripiatur, in profundius exsculpto catino coaceruari, claram, super inhaerentem aquam vero post conspici.

13) *De*

* Prima in transact. philos. Vol. XLVII. p. 500. extat. vid. Comment. nostr. Vol. III. P. I. p. 54. Lecta est a. d. 15. febr. 1753.

13) *De constructione linearum logarithmicarum* ad p. 96.
scalam GUNTERI differit Cl. IO. ROBERTSON.

14) *Epistola* Cl. IO. DOLLANDI ad Cl. IAC. SHORT p. 103.
de emendatione telescopiorum refringentium.

15) *Epitome observationum thermometricarum*, a Cl. p. 107.
 DEMIDOFF in *Sibiria institutarum*, tradita per Ill.
Com. de MACCLESFIELD.

16) *Comparatio diuersarum observationum thermometricarum*, in *Sibiria factarum*, auctore Cl. GUIL.
 WATSON.

17) *Catalogus quinquaginta plantarum horti Chel-* p. 110.
seyani, societati regiae exhibitus, a societate pharmaco-
poeorum, per IO. WILMER, horti Chelseyani praesc-
ctum et praelectorem botanices.

18) *Observationes de Corallina*, notatu dignae, per p. 115.
litteras Cl. IO. ELLIS communicatae Reu. THO.
 BIRCH*. Describit nimirum Cl. Auctor corallinam,
 a Cl. COLLINSON sibi traditam, quam, quod a co-
 piosius circa Angliae littora deprehendendis corallinis
 differt, americanam forte esse credit. Oritur ex tu-
 bis angulatis, quibus adhaesisse videtur aliis corpori-
 bus: hi in cauliculum uniuntur, intus cellulas effor-
 mant, et in dichotomos ramos abeunt. Vnusquis-
 que eorum ex duplici serie cellularum, inter se iun-
 ctarum, componitur, quae iuxta se eo modo posita
 sunt, ut unaquaeque duas alias a latere comprehen-
 dat, et prioris fundus cum alterius apice cohaereat.
 Ex una parte aperiuntur, et oualis sunt figurae, latio-
 res sunt superius et angulis seu duabus spinis arman-
 tur. Quum occasio suppeteret Cl. Auctori, varia
 huius corallinae specimina disquirendi, inuenit: tu-

Bb 5

bulos

* Lecta a. d. 17. mart. 1753.

bulos ab initio vegetantis plantae luteolo succo repletos, in perfectiori et adultiori statu transparentes; cellulas cum tubis communicantes, verno tempore maculas nigras ostendere, futuros embryones putatas, eodemque tempore singulae cellulae orificium teneriore membrana contegi; has maculas incrementum corpora sphaerica testacea euadere, per membranam, iam dictam, erumpere, cellulaeque orificio imponi, ligamento, quod umbilicale nominat, adfigi. Conueniunt figura sua hae cochleae cum nautilo, similesque se in anglica corallina inuenisse adserit Cl. Auctor, atque utrumque specimen in additis iconibus delineari curauit, nec non ex tenerioribus corallinis atque coralliis crassioribus varia huius generis animalcula originem suam habere putat.

p. 117. 19) *Relatio de fossilibus singularibus corporibus* Auctore Cl. HENR. BAKER *. Oxonii illa inuenta a Cl. FRANKCOMBE Nostroque transmissa sunt, ita tamen comparata, ut de eorum origine tantum coniecturae locus sit. In propositis iconibus eorum aliquam dedit declarationem Cl. Auctor. Osseae fere duritiei illa sunt, nigra, fragilia, non tamen corrosa. Inferior quorundam superficies regulari ordine dentium exasperata obseruatur, variae indolis, magnitudinisque, latior tuberculorum, quibus inhaerent, basis sensim leuatur et latera striata ostendit. Post expositam eorum figuram de stratis terrae, quibus haec corpora detinebantur, refert Cl. Auctor, et ob duritiei formaeque analogiam ex capite animalis cuiusdam desumpta fuisse coniecit, nec iniuria forte ad piscium genus pertinere autumat, quippe inter quos aliqui in palato dentes habent, hancque suam opinionem argumentis confirmare annititur.

20) *Epitome*

* Lecta a. d. 29. mart. 1753.

20) *Epitome sermonis, cui titulus: Historia imperatoris Tetrici, explanata et illustrata per nummos, gallice conscripti per CLAVD. GROS. DE BOZE, transmissi ad Cl. MEAD. Auctore Cl. IO. WARD.*

21) *Relatio de tractatu, academiae regiae tradita, p. 140. inscripto nomine: Florae Sibericae siue historiae plantarum Sibiriae To. II. Cl. GMELIN*, per W. WATSON.*

22) *Epistola ad Cl. W. WATSON, data per PHIL. p. 153. MILLER attingens errorem Cl. GMELINI, circa Sphondylium vulgare hirsutum C. BAVHINI**. Sphondylii hirsuti caulibus vesci incolas Siberiae scripserat GMELINVS, qua de re dubitat Cl. Auctor, quippe quod altitudinem, ab eo designatam, non indispiscitur vulgare. Hinc illud potius esse Sphondylium putat, quod a FREYNIO*** *Sphondylium maximum Transylvanicum Ricini folio* appellatur, siquidem hoc, cum vulgari simul in Anglia satum, semper altitudine maius extiterit, foliaque latiora, minus incisa et glabriora produxerit. Accedit porro, quod ex Austria, Hungaria, et Petroburgi semina, cum vulgaris nomine missa, semper hanc speciem exhibuerint, ceu signo, hanc in dictis terris plantam communem esse.*

23) *Epistola Rev. GEORGE COSLARD ad Cl. D. p. 155. BEVIS, de eclipsi, cuius mentionem fecit XENOPHON.*

24) *Descriptio nouae methodi aperiendi corneam, ut extrahatur humor crystallinus. Auctore Cl. SAMUEL SHARP,*

* Conf. Comment. nostr. Vol. II. P. II. p. 276. seqq.

** Lecta a. d. 3 mai. 1753.

*** In prodr. secund. p. 98.

SHARP, *Chirurgus et Reg. Societ. Sod.* *. Emendatorem tantum sistere annis est Cl. Auctor eam methodum, quam a Cl. DAVIEL inuentam fuisse alibi retulimus **. Instrumentis autem utitur paucioribus, suaeque methodi sequentem rationem exhibet: Aegri situs sit ille, qui in cataractae depositione sollennis est, aperiendae sunt palpebrae indice digito et pollice, vel a ministro leuanda superior, a chirurgo vero inferior palpebra. Post angusto cultello, cuius figuram addita delineatio suppeditat, deorsum verso acumine, incidenda est cornea circa peripheriam ad anteriorem cameram usque, sed ea cum directione, ut ad horizontem ducatur, ex opposito transversae pupillae diametro; quo facto cultellus ad nasum dirigitur per corneam ab interiore parte extrorsum, sed prope eius ambitum. Post alteram hanc incisionem lamina cultelli ad septimam digiti circiter partem sub corneam mittenda, et cornea deorsum incidenda est. Premitur deinde pollice inferior globi oculi pars, exprimiturque cataracta. Quoniam vero cultelli lamina sensim latior est, eam inde utilitatem redundare credit Cl. Auctor, quod incisiones nec hiare, nec humor aqueus effluere, nec corneae conuexitas possit imminui, quae tamen incommoda in operatione methodo Cl. DAVIEL suscepta, abesse non possint.

p. 163. 25) *Experimenta a Cl. D. FRANC. HUME facta, conseruandi pisces et carnes in aqua calcis, cum societate communicata per Cl. D. IO. CLEPHANE, Soc. Reg. Sod.* *** Pisces et carnem bouillam, utrosque separatim in aqua calcis reiterato experimento, clausisque vasis conseruauit Cl. Auctor. Pisces diutius praecarnibus resistere corruptioni, aliquam tamen suae densita-

* Lecta a. d. 12. april. 1753.

** Vol. II. P. II. p. 352. seqq. P. III. 453. Vol. III. P. IV. 603.

*** Lecta a. d. 3 mai. 1753.

densitatis naturalis partem amiserunt, mollioresque euaserunt. Alio etiam tentamine instituto cognouit, in aere libero corruptionem esse faciliorem, ac in aqua calcis.

26) *Epistola* Cl. IAC. SHORT, *missa ad Ill. praef. p. 165.*
dem Societatis COM. DE MACCLESFIELD, *de no-*
ui micrometri inuentione, proposita a Cl. SERVING-
 TON SAVERI.

27) *Descriptio modi dimetiendi angulos angustos, p. 170.*
 auctore Cl. IO. DOLLOND, communicata per Cl.
 IAC. SHORT.

28) *Litterae* Cl. PETR. THOMPSON, *recensentes p. 181.*
experimenta, cum fonte cupreo Wicklouiano in Hiber-
nia facta, et obseruationes circa eundem institutas. Au-
 ctore Cl. IO. BOND.* Chemicum praecipue harum
 aquarum examen suscepit, quarum vim ferrum in cu-
 prum mutandi primus detexit MATTH. IOHN-
 STON. Aqua ex crypta, cupri diuite defluens, aci-
 di et acris saporis, diluteque coerulei coloris est, qui-
 bus vero modis illa, ut ferrum arrodere possit in-
 mersum, colligatur, supra retulimus. Quem effe-
 ctum scrutaturus Cl. Auctor, principium primo,
 quod inest, indagat, experimentorumque instituto-
 rum summam recenset. Sunt eorum quinque: Aquae p. 183.
 scilicet ex puteo, cui immissi erant baculi ferrei, hau-
 stae, alcalinum salem solutum admiscuit et praeter
 vehementem efferuescentiam ex fusco nigricantem
 materiam praecipitari vidit, ex quo acidum inesse
 principium concluditur. Spiritu porro nitri vel aqua
 forti additis, ab hoc acido coeruleum, aquae nati-
 uum, colorem destrui obseruabatur, simulque ma-
 teriam, in primo experimento per alcali praecipita-
 tam,

* Lectae a. d. 10. mai. 1753. Conf. de hoc fonte Com-
 ment. nostr. Vol. III. P. I. p. 54. P. II. p. 122.

tam, nunc perfecte resolutam fuisse apparebat. Clavi ferrei, in aquam immissi, quatuor minutorum horae spatio ita cuprea obducebantur materie, ut microscopio etiam subiecta ferrea substantia amplius nequiret detegi, idem cum argento et stanno, cum auro tamen non accidit, quippe in quod acidum non penetrare videbatur posse, adhaesionique molecularum locum facere. Quantitatem vero aequae ac qualitatem materiae, in aqua contentae, explorandi causa tribus uncis aquae, duas drachmas clauorum ferreorum immisit Cl. Auctor, qui octo grana ponderis amiserunt, pulvis autem praecipitatus, quatuordecim grana pendens, fusione facta, duodecim cupri grana dedit. Aqua residua, euaporata in vitriolum viridis coloris concreuit. Ex aqua e contrario, ipso ex fonte hausta, vitriolum coeruleum, ex venere participans hoc modo praeparatum fuit. Ex quibus omnibus, iure quodam, concluditur acidum in aqua esse, quod transeundo per mineras cupri, aliquam eius partem erodendo sibi uniat, ferro praecipitetur, et vitriolum ferri, hinc paratum, secum auferat, cuprumque in fundum deciduum, relinquat. Simplex itaque praecipitatio male transmutationis ferri in cuprum nomine venit; id quod variis additis observationibus comprobatur. Ferrum enim solui, spuma aquae, in puteis contentae, monstrat: ferrum etiam sensim perit, et depressiora loca ostendit: aqua ex puteo effluens ochram vehit, quae igne tractata a magnete trahitur, nec prius eam admixtam habet, quam exiuerit: cupri tandem quantitas superat eam ferri immissi. Ex his varia deducit Cl. Auctor coniectaria, atque de acidi principii, quod hanc solutionem efficit, origine statuit, illud esse commune, quod in toto regno minerali distribuitur. Fontem autem hunc, tum ob medicas, tum ob metallicas vires esse utilem censet, neque veneni vim habere, quod a variis sine noxa bibitur hominibus; purgandi certe

certe vomendique vim exercet, exanthematicisque morbis medetur, nec non acidum primarum viarum absorbet. Siquidem aliqua limaturae ferri portio addita, spadunarum aquarum indolem ipsi conciliat.

29) *Litterae Cl. BEVIS ad Cl. IAC. SHORT, de no. p. 190. ua micrometri inuentione Cl. GASCOIGNE.*

30) *Observatio de transitu Mercurii per solem, facta p. 192. a. d. 6. mai. 1753. Auctore I. SHORT.*

31) *Relatio de tractatu, regiae societati communi- p. 201. cato, qui inscribitur: Litterae, ad electricitatem spectantes, &c. scriptae a Cl. NOLLETO: extracta per Cl. GVIL. WATSON.*

32) *Numerus incolarum urbis Bristolensis, tum ex p. 217. catalogo mortuorum, tum ex numero aedificiorum, per decem inde annos collectus; Auctore IO. BROWNING, communicatus societati per HENR. BAKER. Ex observationibus probat, in magnis et hominibus refer- tis urbibus quotannis vicesimam quintam partem populi diem suum obire.*

33) *Relatio de eclipsi quam venturam indicauit p. 221. THALES: Auctore Cl. GVIL. STVKELEY.*

34) *Continuatio disquisitionis cryptae, in comitatu p. 226. Antrimensi Hiberniae, (Giant's Causeway) Auctore Cl. RICHARD POOCK *. Huius descriptionem alibi suppeditauit Cl. Auctor, nouas nunc recenset ibidem factas observationes. Immensae altitudinis pilae, ex lapidibus singularis formae exstructae, hic reperiuntur, quorum figura lateraque vario modo variant. Horum formam itaque hic sollicite descrip- tam, aliquas etiam delineatas hic deprehendimus.*

Latera

* Lecta a. d. 24. mai. 1753.

Latera non omnia sibi accurate respondent, quaedam compressa sunt, ita quidem, ut si pilae cacumen conuexum fuerit vel concauum, quicumque, eam constituens, lapis eandem retineat habeatque figuram. Quum miranda haec sit, spontaneo naturae labore effecta, structura, descriptiones, quibus haec cognoscitur, consulere et ex collatis inter se phaenomenis iudicare iuuabit.

p. 238. 35) Pergit in eadem re explicanda IDEM, in literis ad Rev. THO. BIRCH datis * et transmittit delineationem geographicam cryptae.

p. 239. 36) De conuenientia tabularum Cl. HALLEY et notationum Cl. BUFFON, ad stabiliendam regulam de probabili vitae duratione in homine. Auctore Cl. GUIL. KERSSEBOOM, translata ex gallico idiomate per Cl. IAC. PARSONS.

p. 253. 37) Epistola Rev. P. D' INCARVILLE, Pekino Chinae ad Ill. CROMWELL MORTIMER transmissa **. Rationem reddit variorum naturalium thesaurorum, quos Ill. MORTIMER miserat Cl. Auctor, sed nomina plerumque chinenfium retinuit, quae obscuritatem relinquunt, v. c. kou chou arborem esse dicit, ex cuius cortice, eodem, ac cum cannabis filis solet fieri, modo, paratur papyrus. Alba cera, multum in China usitata, qua ratione quibusque infectis paretur, incognitum sibi esse adfirmat. Ex Persicaria vero maculata, prout ex Anil alibi, indicum paratur, ut alia iam praetereamus. Ad finem epistolae responsio additur, concernens caput historiae naturalis de fossilibus. Minerae omnis fere generis in China occurrunt, quamuis leui tantum opera in iis conquirendis elaborandisque occupentur inco-

* Lectae a. d. 28. iun. 1753.

** Lecta a. d. 7. iun. 1753.

incolae, in summis etiam montium cacuminibus varii generis petrefacta occurrunt, quae olim maris itinera per haec loca directa fuisse, suspensionem mouent Cl. Auctori; magna tandem in prouincia *Yunnan* cinnabaris copia occurrit.

38) *Litterae Cl. T. MELVIL ad Rev. IAC. BRAD* p. 261.
*LEY cum sermone de causa refrangibilitatis radiorum lucis**, quam in diuersa radiorum coloratorum velocitate positam esse autumat, opticas aequae ac astronomicas obseruationes inde declarans.

39) *Operationem empyematis feliciter susceptam describit* IOSEPH. WARNER, *Reg. Soc. Sod. *** Praegressis variis, inflammationem in pectore indicantibus, symptomatibus, in anteriori sinistri lateris parte circa sterni extremitatem tumor comparuit, sine integumentorum tamen colore mutato, qui pressus et respirationem reddidit difficiliorem et fluctuantem subtus materiem indicauit. Aegro itaque, conuenientem in situm deducto, incisio duorum digitorum latitudine, per obliquos musculos abdominis in eminente maxime parte tumoris fiebat, deinde altera transuersim per rectum abdominis musculum, intra septimae et octauae costae cartilaginem, quo facto materia spissa, viscida, viginti trium unciarum quantitate euacuabatur, sensim autem ad pristinam aeger sanitatem reducebatur. Prima, quae abscessui originem dedisse videtur, causa, infelicem casum, in latus sinistrum, ante duos iam annos perpeßsum, suspicatur Cl. Auctor fuisse.

40) *Epito-*

* Lecta a. d. I. mart. 1753.

** Lecta a. d. 28. iun. 1753.

- p. 273. 40) *Epitome epistolae a Cl. IAC. DODSON ad Cl. WILH. MOUNTAINE missae* *, quae de calculandis logarithmis agit.
- p. 284. 41) *Litterae Cl. IO. LINING, Med. D. Carolinopolis, Carolinae meridionalis, ad Reu. THO. BIRCH scriptae, de quantitate pluviae cadentis a mense ianuario 1752. ad Decembrem 1753.*
- p. 286. 42) *Epistola Cl. EMAN. MENDEZ DA COSTA, ad Reu. THO. BIRCH, de fossili, Dudleii in comitatu Staffordiensi inuenti, et descripti in Phil. Transact. No. 496. **.* Quum de eo multum dubitatum sit, ad crustacea animalia pertinere monstrat Cl. Auctor, nominatque *pediculum marinum maiorem trilobum.*
- p. 287. 43) *Epistolae variae, concernentes theorema Cl. EV-
LERI, de emendandis aberrationibus vitrorum obie-
ctiuorum, in telescopiis refringentibus.*
- p. 297. 44) *Notatu maxime dignus casus, fragilitatis, flexi-
bilitatis, dissolutionisque ossium, communicatus a IO.
PRINGLE, Med. D. **** Accidit ille feminae, quae
ad decimum quintum aetatis annum incorrupta usa
fuerat sanitate, sed et tunc restituta, ad tricesimum
vixit, quo demum dolore corporis, febrilibus sym-
ptomatibus stipato, affligebatur, qui dolor, extre-
mitates postmodum occupans, effecit, ut, sine omni
data occasione vehementi, inter ambulandum cru-
frangeretur. Callus tamen nullus generabatur, sed
relinquebatur mobilitas flexilitasque ossium, quae
breui post in femore eodem obseruabatur modo; cu-
tis oedematose intumescibat, excoriabatur, tenuem

* Lecta a. d. 5. iul. 1753.

** Lecta a. d. 12 iul. 1753. Conf. Comment. nostr. Vo-
I. P. IV. p. 709.

*** Lect. a. d. 12 iul. 1753.

que ichorem, luteoli coloris fundebat. Variis, ut, qui acidae indolis esse putabatur, morbi fomes expellatur, quaerebatur remediis, sed incassum, immò thorax constringebatur, spina dorsi distorquebatur, omniaque ob flexilitatem ossa, praecipue extremitatum, ad suscipienda negotia fiebant inutilia, ut lecto affixa remanere cogeretur aegra, contracta et magnitudine imminuta, quippe quum post mortem a naturali sua magnitudine duos pedes et duos pollices recessisse deprehenderetur. Symptomata, quibus affligebatur perpetuo, erant successuum difficilis respirationis incrementum, carnis extenuatio, cessatio menstruorum; ultimis mensibus facta, propensio in extremitatibus potissimum in sphacelum: sensus tamen ad mortem usque immutati supererant. Recensentur deinde, quae post mortem in cadaueris sectione fuerunt detecta. Cor et pulmones flaccidi tantum, forte ob nimiam hepatis molem inueniebantur, quod nempe omne fere abdomen occupabat, et diaphragmati accrescebat, de reliquo sanum erat. In mesenterio, unica tantum glandula scirrhusa et lien contractus erat. Cavitatem cranii autem disquirere non licuit. Sed, quum ita flexilia euaserint ossa, ut leui opera potuerint discindi, intus autem corrupta quasi inuenta fuerint, tenui tantum ossea lamina, testa ouorum non crassiore, superstiti, putat Cl. Auctor, omnia haec mala a medulla, dissolvente qualitate instructa, fuisse producta, in primis quod ab interiori superficie malum extus proserpere videretur. Chemicum autem tentamen, cum his ossibus institutum, neque acidum, neque alcali inesse declarauit.

45) *Observationes astronomicae, factae Londini a p. 301.*
Cl. BEVIS et IAC. SHORT.

46) *Litterae Cl. IO. ELLIS ad Cl. PETR. COLLIN-p. 305.*
son de polypo aggregato, (Cluster polype) inuento in
Cc 2 mari

mari ad ripas Groenlandiae *. Plura communi basi adhaerent corpora, singulum octo habet brachia, quorum unum quodque denuo serie tenuium fibrarum exornatur, quae digitorum sustinent officium, medio horum loco rotundum est os, sex semicircularia labia habens. Ad longitudinem dissectum corpus ex valido musculo compositum est, in cuius cavitate, valvulis quasi distincta tenuia corpuscula, seminibus similia, deprehensa sunt. Centro baseos, quae corpora haecce coniungit, adnascitur quadrata, ossa et sulcata columna, ceu truncus, quae attenuata est in loco, ubi corpora adhaerent, et membrana involuente augetur, quam ea propter adesse iudicat Cl. Auctor, ut pro lubitu in aquam se dimittere possit animal atque resurgere. Haec substantia cum aceto vini effervecebat, totum autem corpus ipsi videtur originem dedisse *Encrino* siue *Lilio lapideo*. Tabula aenea addita omnium harum partium icones suppeditat.

P. 309. 47) *Epitome litterarum Patr. GAVBIL ex China transmissarum*: Astronomica tractant.

P. 318. 48) *Epistola Cl. WILH. SHERVINGTON ad Cl. BENI. FRANKLIN, de transitu mercurii per solem*.

P. 320. 49) *Relatio de statu barometri et tempestatis, Dublini a die 7. mart. 1752. ad d. 28. febr. 1753. per Cl. IAC. SIMON facta: comm unicata societati per Cl. HENR. BAKER.*

P. 322. 50) *Altera relatio nouae methodi corneam aperienti, deponendae cataractae causa. Auctore Cl. SAM. SHARP.* ** In emendanda methodo Cl. PAVIEL occupatus Cl. Auctor, primo recenset numerum corum,

* Lectae a. d. 8. nov. 1753.

** Lecta a. d. 22. nouembr. 1753.

rum, quos sua methodo curauerat, adducendo eorum nomina, aetatem, diem, qua operatio fuit instituta, et oculorum numerum. Ingenue tamen ubique profitetur, quoniam cum successu omnia contingerint; quauē ratione instrumentorum vitia quandoque noxam contraxerint miseris. Singularis est obseruatio, cataractam fuisse inuentam, quae, licet omnem tolleretur videndi facultatem, coerulescens tamen et parum opaca comparuit, aperta autem cornea, immo resecta etiam capsula lentis, exire tamen recusauit. Inflammationes quidem in hac etiam operatione non deficiunt, saepe tamen, quam causam optime Cl. Auctor ex laesione partium affectarum deducit, sunt mitiores, et trium hebdomadarum spatio plerumque dissipantur. Pupilla etiam in hac ratione saepe circularem suam perdit figuram, quod iridis tensioni vel per cataractae pressionem factae nimiae dilatationi adscribere maluisset Cl. Auctor, nisi idem instrumentorum ineptitudinem saepe id efficere cognouisset. Hinc huic incommodo tollendo forcipem suum accommodatum esse scribit. Defectus autem sensus, qui mutationem luminis arguit, et signum amauroseos plerumque haberi solet, non tamen in uniuersum criterium est, falli nescium. Quod ad operationem ipsam attinet, eo hanc emendauit modo, ut post incisam corneam lentem crystallinam non exprimeret ex oculo, quippe quod metum humoris vitrei simul exprimendi iniiciebat, sed forfice eum extraheret protinus, siquidem et tunc facile a vitreo humore illa separari possit, simul cum inuolvente capsula, quae aliquando etiam relictā, sensim euanescit, si extrahenda tamen est, potest instrumento, quod *curette* Cl. DAVIEL nominat, id praestari. Idem instrumentum etiam in cataracta adhiberi potest, quae in partes dissiliit. Accidit vero Cl. Auctori nunquam, ut operationem succederet staphyloma. Speculi oculi usum inducere periculo-

sum esse docet, et magnam requirere sollicitudinem.

- P. 332. 51) *Inscriptionem antiquam Romanam lapidis, Bathoni inuenti, explicare tentat* Cl. IO. WARD.
- P. 347. 52) *Epistola ad Ill. Com. DE MACCLESFIELD data per Cl. BENI. WILSON de experimentis electricis, Parisiis factis.** Qui saepe iam electrica instituit magno cum studio tentamina, his demonstrare annis est, Cl. MONNIER opinionem, electricitatem ex aere prouenire, ita esse limitandam, ut ex hoc aequae, ac ex terra, ex illa tamen longe magis, deriuetur.
- P. 350. 53) *Experimenta electrica, cum explicatione variorum phaenomenorum, nec non additis observationibus de tonitruo proponit* Cl. IO. CANTON **. Ex hisce, quorum summa breui hic proponi nequit, corpora diuersa, differenti tamen tempore et conditione magis minusque electrica sunt. Ad finem tractationis adiungit quaestiones: numne aer, subito rarefactus, electricum producat ignem, et subito condensatus, recipiat ex nubibus vaporibusque transeuntibus eundem? porro, numne aurora borealis electricum ignem emittat ex nubibus posituae electricis, ad eos negatiue electricis per magnam distantiam atque superiorem atmosphaerae partem, quae minorem exercet resistentiam?
- P. 358. 54) *Epitome epistolae Cl. BOSII; Prof. Vitebergensis, missae ad Ill. Com. de MACCLESFIELD; observationes addidit* GVIL. WATSON ***. Post inundationem viridem mucum prata aruaque obduxisse docet Cl. BOSE, qui post ea exsiccatum contextum lanae similem,

* Lecta a. d. 6. dec. 1753.

** Lecta eodem d.

*** Lecta eod.

similem, effecerit, quem suam debere originem musco, bysso dicto, docet Cl. WATSON.

55) *Relatio de commentario praelecto Reg. Acad. p. 361. Scientiar. Paris. per Cl. DE BARROS, concernens phaenomena quaedam, quae Parisiis ab eodem observata sunt, circa transitum mercurii per solem: proposita per Cl. I. SHORT.*

56) *Explicatio loci obscuri, apud STEVINVM oc-p. 368. currentis (Vide les Oeuvres Mathemat. a Leyde 1634. p. 169.) per Cl. SIMSON.*

57) *Observationes de electricitate aeris, institutae p. 377. mense iunio, iulio, octobri 1753 in Castello Maintenon; tanquam epitome epistolae Abb. MAZEAS ad Cl. STEPH. HALES. Ex gallico sermone translatae per Cl. IAC. PARSONS*. Describit apparatus, quem adhibuit et saepe instituta observatione inuenit, tempestate aequaliter sicca, electricitatem etiam aequaliter fortem fuisse: materiae vero electricae paruum admodum esse motum: nec eundem posse sensibilem reddi: a tempestate tamen electricitatem non augeri, nisi tonitru simul adsit: virtutem porro electricam augeri, si applicetur vel incidat in superficiem metalli, quod per se iam electricum est: itidem, si nubes apparatus accuratissime supersunt: dissipari tandem, nubibus dissipatis. Recenset simul Cl. Auctor singularem casum, qui epileptico accidit homini, qui eo, dum per aerem excitabatur electricitas, tempore inter spectatores reperiebatur. Is enim ictibus electricis percussus, male se habuit, et domum rediens, morbo vehementer correptus fuit, variis paroxysmis se inuicem excipientibus. Restitutus tamen morbum et hoc tentamen inter magnam se adnotasse conueni-*

* Lecta a. d. 20. dec. 1753.

entiam professus est, olim etiam, tempestate exoriente et tonitru, eodem perlaepe excruciatu.

II.

D. IOANNIS HENRICI SCHVLZII, quondam Medicinae, Eloquentiae, Antiquitatum et Philosophiae in Regia Fridericiana Professoris Publici ordinarii, cetera, Praelectioniones in Dispensatorium Regium et Electorale Borussio-Brandenburgicum. Altera hac editione curate reuifae, emendatae atque insigniter auctae. Norimbergae, apud Io. Iac. Cremer; 1753. 8. I alph: 19 pl. f. praefat.

In dispensatorium, quod vocant, Borussio-Brandenburgicum, quum multis in Germaniae pharmacopoliis medicamentorum, quae dicuntur officinalia, parandorum dare soleat normam, iam olim commentatus b. SCHVLZIUS, hasce ideo praelectiones anno huius seculi tricesimo sexto Norimbergae ediderat, tironum quidem usui in primis consecratis, at tamen aliis etiam in arte facienda iam prouectionibus valde utiles factas. Lactamur itaque hocce opusculum optimi illius viri, cuius memoria viris doctis atque probis semper esse debet cara atque antiqua, quum post eius mortem denuo edi deberet, in viri nobis quidem incogniti, sed, uti ex eius, huic libro praestito, labore intelligimus, artis nostrae periti atque industrii incidisse manus, qui reuifum istud et vere auctum curaret. Is igitur hasce *Schulzianas* annotationes sedulo perlustrans, eis non nullas addidit emendationes, praesertim si remediorum formulas, quas vocare solent medici, et librorum, de singularibus medicamentis exponentium, respicere velis notitiam, atque iis porro aliqua adiecit additamenta, tum ratione illorum iam olim pertractatorum usus,

tum

tum aliorum etiam, quorum antea nondum facta fuerat mentio, nunc factae commendationis viriumque expositionis. Pro sua tamen, quam ex merito laudamus, modestia, hosce suos ab illis b. SCHVLZII ita distinguit labores, ut suis, quas *Schulzianis* subiungit, annotationibus unam stellulam unco inclusam, reliquis autem eorum medicamentorum, quae nunc primum inseruit opusculo, titulis duas stellulas, unco carentes, praefigeret, quo et suae et b. antecessoris sententiae, illico legentis oculo paterent; e quibus nunc illis prioribus speciminis loco aliquas tantum adducere, horum autem, titulorum quippe, plenam dare lubet enumerationem.

De sequentibus igitur remediis, in noua hac editione primum commemoratis, differitur: *Sunt illa nimirum: Acetum rutae: Alumen ustum: Anima rhabbari: Aqua Carmelitarum fratrum; melissae cum vino; pbagedaenica; veronicae vinosae: Balsama: Balsamus Anglicus; saturni compositus; Schauerianus; vulnerarius albus et ruber DIPPETII: Electuarium antiphthysicum; roborans antifebrile: Elixir acidum DIPPETII: Balsamicum HOFFMANNI; eiusque Elixir stomachicum, aliudque viscerale dictum: Essentia cantbaridum; chinchinae composita: Extractum anthelminticum; liliorum conuallium; myrrhae aquosum: Flores auripigmenti; salis ammoniaci simplices; zinci: Lapis infernalis: Mercurius praecipitatus viridis; sublimatus diaphoreticus ASTRUCII: Morsuli pectorales: Nitrum nitratum siue regeneratum: Nitrum praeparatum: Olea in genere: Oleum bezoardicum WEDELII; anisi; kajuput; myrrhae destillatum; naphthae; vini; vitrioli dulce; oliuarum; otalgicum: Phosphorus Anglicanus: Pilulae aethiopicae; foetidae minores SYDENHAMI; lithontripticae Anglicanae: Pulvis alexipharmacus Sinicus; cordialis Cellensis; contra febrem quartanam HOFFMANNI; sternutatorius in odontalgia; temperans albus et ruber STAHLII:*

Rotulae anthelminticae: Saccharum lactis; glycyrrhizatum: Species lithontripticae Anglicanae: Spiritus carminatiuus VATERI; vitrioli dulcis seu liquor anodynus mineralis HOFFMANNI: Tinctura antimonii saponata; veneris balsamica DIPPELII: Trochisci cathartici ZWINGERI.

Nunc adhuc aliqua ex ipsis depromere iuuabit annotationibus.

- p. 4. Circa praeparationem acetorum, herbis aut floribus infusorum, caueant pharmacopoei, ne diu nimis in insolatione, quam dicunt, ea relinquant: alias enim haec vappam facile contrahent, pelluciditatem amittent, neque ferent aetatem. Inter omnes *acetum* rectificandi modos ille, quem commendauerat olim b. STAHLIUS, laudem meretur, quo illud intenso hiemali frigori exponitur, donec tertia eius quartaue pars congelauerit; reliqua eius parte adhuc fluida in medio haerente, usui seruanda. Reliquis hoc erit purius acetum, et in gummi-resinis, salibus alcalicis terreisque medicamentis soluendis, communius destillato praestantius. *Aethiops mineralis*, sine ignis auxilio praeparatus, apyros dictus, illo inferior esse censetur, qui fit, sulphure antea leni calore fluido reddito, quam adiciatur mercurius. Medicae tamen virtutes neutri abiudicantur, non contra vermes solum aliosque glandularum in primis morbos, sed aduersus febres etiam rebelles quartanas conspicuae. Illum cum antimonio crudo ad morbos saturninos commendauit quidem Cl. KRÜGER, sed votis hanc methodum haud semper respondere, Noster p. 30. monet. *Antimonio* etiam *diaphoretico* dicto virtutis diaphnoicae laudem post b. SCHVLZIVM vindicat, idque omni actuoso principio non carere inde probat, quod emeticis aut purgantibus additum, eorum vim augeat; nec illud ab aetate vim emeticam haud attrahere, denuo confirmat. Dum de *vitri antimonii cerati* usu antidysenterico loquitur, in leuem aliquem

quem errorem, nisi ipsi fallimur, se deduxit, eiusque inuenti auctorem Cl. PRINGLE esse narrat, quem tamen Cl. YOUNG huc usque talem habitum fuisse constat, quoniam primus fuit, qui de eo scripsit. Nec huic tamen haec competere laudes, ex anglico quodam diario nuper monuimus *. De *balsamo* sic p. 92. dictis *vitalis* Cl. Auctor probe notat, quod olea maxime pura, nec aetate corrupta; menstruum omni phlegmate prorsus liberum, atque ab herbis floribusque odoriferis abstractum esse; olea porro antea salicalico puro vel saccharo in pollinem reductis infundi, eaque tandem singula hac sibi proportionem iungi debeant, ne alterum alteri odore antecedit. Illud balsamum, quod STABELIVS in *Chymia* sua descripsit, multum ad HOFFMANNI mentem videri esse compositum existimat, licet illud, quod ab hoc viro nomen traxit, inter arcana adhuc referatur ab eius heredibus. De *elixirio polychresto Halensi*, sub essentia spleneticae nomine etiam cognito, et paulo infra de *essentia amara*, utroque medicamento, etiam nunc in pharmacopolio orphanotrophi Halensis prostante, b. SCHVLZIVS non nulla commemorans, illud ibidem haud amplius dispensari dixerat: id consulto tamen dissimulasse Virum illum caeteroquin vere bonum, Noster autumat. Sed quam illud de causa is fecerit, nos quidem certo haud intelligimus; nisi forte existimauerit; id, quod ita quoque omnino se habere videtur; orphanotrophi medicorum honori ea dissimulatione magis consuli, quam si aperte fuerit confessus, ab iis haberi atque diuendi adhuc arcana. Ridiculus non nullorum pharmacopoeorum mos iure suo reprehenditur, qui sibi tantum sapientes in *elixirii vitrioli* MYNSICHTI praeparatione spiritum vitrioli omittunt, illudque igitur medicamentum, cui suum tamen relinquunt nomen, praecipua virtute sua priuant. *Emplastro*, quod *diabotanon*

BLON-

* v. Comm. nostr. Vol. IV. P. I. p. 76.

- BLONDELLI appellatur, insignis adeo vis tribuitur, ut tumores mesenterii lienisque scirrhosos solvere, ideoque in febribus mesentericis, hecticis aut atrophiceis, hoc ex fonte ortis, prodesse dicatur. De
p. 189. *emplastro d'asulphuris RVLANDI*, praeter vires ulcera reddendi munda eaque consolidandi, aliae adhuc in primis contra lymphae salivaeque vehementes effusiones depraedicantur, satisque memorabili confirmantur exemplo, quo ulcus genae sinistrae illius ope sanatum fuit, ex quo tanta humoris salivialis copia effluxerat, ut tabis subsecuturae esset periculum, omnibus antea medicamentis sine fructu
p. 192. impositis. Alius *emplastri, ad ganglia* in dispensatorio praescripti, usus contra ea vel maxime rebellia valde laudatur, quo potissimum hoc efficiatur, ut ca post diuturnam applicationem molliora fiant, manui-
p. 249. que chirurgi facilius cedant. Praeter effectus *essentiae pimpinellae albae* olim iam laudatos, singulari quoque vi pollere ea dicitur ad mercurium e corpore eliminandum, is si vel ab intempestiuo usu, vel a malo regimine, corpori alte inhaereat, et cruciatus
p. 255. in primis arthriticos visos excitet. Inter alias multas *essentiae succini* vires otalgica quoque refertur in tintitu atque susurru aurium conspicua, aliquot eius guttulis gossypio exceptis auriue inditis, praesertim si olei chamomillae aut spiritus terebinthinae aliqua
p. 270. portio ei iuncta fuerit. Circa usum *extracti bellebori nigri*, quod per se quidem contra pertinacissimos multos morbos valere dicitur, variae afferuntur cautiones, e quibus una est, ne illud vetustate corruptum sit; id, quod facile fieri soleat; altera, ne in aliorum extractorum modum in forma liquida porrigatur; utraque enim de causa pessimos non nullis
p. 274. aegris accidisse effectus, observatum esse dicitur. Recte porro mirari nobis videtur Cl. Auctor, quod *aquoso myrrhae extracto* locus in dispensatorio nondum concessus sit; quum illud tamen gummi duplici constet

constet principio, gummeo atque mucilaginoso cum resinoso, nec utrumque igitur omnibus convenire queat morbis. Sequentem ideo illius praeparandi docet modum: *Recipe myrrhae rubrae in crudiore* p. 275.
pulverem redactae libram dimidiam, irrota ipsam liquoris nitri fixi, siue alcabest GLAUBERI unciiis duabus; exacte haec spatula lignea agitata, per dimidium mensem in loco quodam humido e. g. cella reponere, ut myrrha penitus solvatur. Tum affunde aquam feruidam atque agita massam: dein quiescere relinquitur, donec crassius sedimentum deposuerit. Aqua supernatans tincta separetur. Atque hanc operationem repete, donec affusa aqua tingi desierit. Aqua vero haec omnis confusa moderatissimo calore euaporet, ut extractum euadat. Optime iungitur pilulis balsamicis, stomachicis, carminativis atque anthelminticis itemque uterinis: in quibus grana quinque ad duodecim unam pilularum dosin ingredi possunt. Antimonio crudo sub p. 342.
morsulorum restaurantium KVNCKELII titulo suas quidem laudes tribuit, easque contra multos quidem morbos egregias, stimulantibus et resolventibus; monet tamen simul, ne in scirrhis intestinorum obstructionibus eo temere utamur, eaque formula, quae in Borussico legitur dispensatorio, illam esse aptiorem, quam CL. I V N C K E R in Conspectu Therapiae spec. Tab. XLVI praescripsit. Sub nitri praeparati nomine il- p. 345.
lud in impalpabilem fere pulverem redactum intelligit, indeque medicam eius efficaciam augeri existimat. Eius itaque laboris magnum esse dicitur compendium, eiusque haud inepta erit praeparatio, si nitrum probe siccum in calido teratur mortario et per densius cribrum transjiciatur; vel si nitrum calida solutum, filtratum, in olla non vitreata parum coquatur et in eodem sicco frigidoque loco reponatur. Post paucos enim dies transsudabit illud ollam sub forma florum subtilissimorum, qui pede leporino ab-
sterfi

sterfi ufuique feruati, quibusdam *nitri florum* veniunt nomine, eiusdemque cum nitro sunt utilitatis.

Haec ad docendos lectores excerpta fufficiant, clare enim docent, quidnam huic per fe iam huc ufque vehementer utili *Schulziano* libro praestiterit Cl. Editor hisce fuis fat numerosis annotationibus, quae tertiam minimum totius libri partem conftituunt, fimulque insignem auctorum, qui de remediis fcripferunt officinalibus, allegatorum copiam exhibent.

III.

Observations de Medecine, ou l'on trouve, des Remarques qui tendent à detruire le Prejuge, ou l'on eft fur l'ufage du lait dans la Pulmonie: Avec une differtation fur les Ingredients de l'Air, confideré dans l'état naturel, et dans un état contre Nature, ou comme caufe de Maladies. Par M. JOSEPH RAVLIN, de l'Académie Royale des Belles-Lettres, Sciences et Arts, de Bordeaux, Docteur en Medecine, et Medecin Ordinaire de la ville de Nerac en la Province de Guienne. A Paris. Chez Moreau et Delaguette. 1754. In 12. pl. 18.

Hoc eft:

Observationes medicae, in quibus annotationes, praecudio, quod ufum lactis in phthifi pulmonali concernit, destruendo aptae inveniuntur: Vna cum differtatione, de aeris, in ftatu naturali et contra naturam, feu tanquam caufa morborum confiderati, ingredientibus. Auctore JOSEPH RAVLIN etc.

Cum lactis potum phthificorum plurimis ad modum proficuum effe haftenus quidem fere crederent omnes; Cl. Auctor, eidem quondam fententiae

tiae addictus, in hoc opere, primo contrarium demonstrare, phthificosque lactis potissimum potus victimas esse ostendere voluit. Ex hoc vero labore parvus phthisiologiae tractatus ortus est, quem, in prima huius libri parte, quatuor sectionibus distinctum, proposuit. In parte secunda diuersorum et speciatim eorum morborum observationes subiunxit, qui exeunte anno 1751 et incunte 1752 in Neraci confiniis epidemice grassati sunt; et dissertatio olim promissa, de aeris, in statu naturali, et contra naturam, seu tanquam causa morborum, considerati, ingredientibus, tertiam tandem ultimamque libri partem occupat.

Prima igitur huius libri pars *quatuor sectiones* continet, quarum *prima* de phthisibus dorsalibus ac nervosis, *secunda*, de phthisibus pulmonalibus a tuberculis, *tertia*, de phthisibus pulmonalibus ab ulceribus pulmonum ortis, et *quarta* tandem de usu lactis in phthisi pulmonali agit. In prima vero primae p. 1. partis sectione de phthisibus dorsalibus ac nervosis, quas generatim in essentielles et symptomaticas diuidit, tredecim observationes continentur, quarum praecipuas speciminis loco breuiter tantum recenserebimus.

I. *Phthisis hysterica.* Virgo decem et octo circiter p. 8. annorum vere anni 1744 paroxysmīs hystericis, cum dolore regionis epigastricae satis vehemente, saepius per diem et praecipue vesperi recurrentibus, catameniorum tempore, quae exinde supprimebantur, corripitur. Accedunt motus conuulsui, lypothymiae in syncopen se terminantes, intolerabilis ardor sub cartilagine xyphoidea, pulsatio inter scapulas, cordis motui synchrona atque in dies aucta, et tandem pedes oedematosi cum contabescencia totius corporis. Praemissis et tentatis variis, auenacea tandem, cum bolo ex croco martis aperituo et aethiope miner. ana gr. sex, omni mane, per mensem integrum sumta,

- p. 15. sumta, symptomata abigerunt, lac caprinum dein pristinam sanitatem plenarie restituit. II. *Phthisis scrophulosa*. Iuveni chirurgo anno 1740 in dextri pedis tarso parui tumores, gangliis haud absimiles nati, emplastrisque resoluentibus applicatis potius aucti, post quatuor menses ita exulcerantur, ut sinus inter phalangas procederent, febrisque lenta accedens aegrum valde emaciaret. His diu neglectis, postmodum vero rite tractatis, ossa sese exfoliare, et ulcera sanationis spem prae se ferre, coeperunt. Iuscula raparum, auenae et hordei, decoctio sarsaparillae, scolopendrii, hypericique, una cum bolo, ex lapidum cancerorum, antimonii diaphoretici et antihectici partibus aequalibus sumto, febrem fugarunt, ulceraque ad cicatrices perduxerunt. Lac vaccinum tandem aegrum pristinae sanitati restituit. In III et IV p. 19. observatione *phthises* proponuntur, quibus occultum p. 21. *virus venereum ansam praebuisse* creditur. Vir, dolores punctorios in toto corpore, et continuum quendam, in vasis spermaticis; femina, post feliciter peractum puerperium, dolorem, in media sinistrae coxendicis parte, ad os sacrum, coxendicem dextram, costas, musculos pectoris, scapulasque, se extendentem, percipiunt. Lactis potu omnia in peius ruunt. Frictionibus autem mercurialibus raris, vir restituitur, femina vero, in principio quidem alleuatur, neglectis vero iisdem, variisque aliis usurpatis, tandem summe emaciata moritur. V. *Phthisis a tumoribus scirrhis*. Sanissima femina, post tertium, admodum graue, puerperium, vere anni 1733, multum in principio sanguinis, et appetitum plenarie perdit. Sequuntur suppressio lochiorum, febris, paroxysmi hysterici, vigiliae. Superueniunt in toto corpore parui tumores scirrhi, sine dolore et rubore, paruorum granorum, in collo, pectore et inguinibus vero, oui columbini, magnitudine, conspici. Cl. Auctor, mense maio 1734 accer-

accerfitus, illam fere in ultimo marafmi gradu, cum parua febre lenta, et fudoribus nocturnis, deprehendit. Quidam tumores in pectore ad modum lente fuppurarunt. Praemiffis aperientibus, grana octo aethiopis mineralis, per duodecim dies mane fumta, quosdam tumores diffiparunt. Post friftiones tandem mercuriales, omnes tumores pedetentim, menfis unius et dimidii fpatio, difparuere, duobus in pectore, caftaneae maioris magnitudine, exceptis. Mercurius vero extinftus, emplafiro diapalmae mixtus, illos, paruo temporis fpatio, plenarie refoluit. Appetitus et menftrua larga copia rediere, aegraque, opé lactis, et nutriente diaeta, plenarie reftituta eft. VI. Obferuatio *phthifin, a lepra haereditaria*, continet, ubi aegra, omnibus incaffum tentatis, tandem fumme emaciata mortua eft. In VII et p. 37. VIII obferuatione Cl. Auctor *phthifin, a doloribus in regione epigaftica, et ab obftructionibus hepatis*, ortam, cum pertinaci vomitu coniunctam, describit, quam, iftic locorum, inter puellas, feminasque, fatis frequentem, ex tribus vero annis, longe frequentiore fuiffe, aegrasque exinde, fi iisdem cito, methodo fatis prolixè defcripta, et friftionibus tandem quibusdam mercurialibus fuccurratur, omnes fanitati reftitutas, alias vero hydrope mortuas effe, affert. Nonam, decimamque obferuationem, quae *ambae phthifes neruofas* et cafus parum confiderabiles continent, lubentes praeterimus. XI. *Phthifin neruofam* p. 49. fiftit, a corio bouino ortam. Iuuenis feptendecim annorum, coriarius, in prima praeparatione recentis corii bouis, paullo ante carbunculo mortui, paruum tumorem, in parte media cubiti, non dolentem, percipit. Post tres vero dies, totum brachium, una cum digitis, manu, et fcapula, inflatur. Hic tumor vero neutiquam dolet, et a chirurgo quodam facile curatur. Iuuenis autem ftatim extraordinariam fitim, ad mortem ufque durantem, experitur, mar-

Tom. IV. Pars III. D d cefcere

cescere incipit, accedunt diarrhoea, dolores capitis continui, vigiliae frequentes; nulla vero tussis; nec decumbit, sed semper obambulat; et, per quinque annos, magis magisque emaciatur, donec tandem, febre lenta accedente, hyeme 1751, absque ullo medicamentorum usu, placidissime expirauerit.

- p. 55. Causam harum phthisium immediatam, vel in peruerso et irregulari statu neruorum, seu cerebri ipsius, vel in vitio quodam liquidi neruosi ponit Cl. Auctor. Huic vero ansam praebere posse, congestiones, et obstructiones, in cerebro, aut medulla spinali, a quacunque causa, ortas. Et neruis, a statu naturali, sic semel declinantibus, non mirum esse, si reliquae actiones peruertantur, nutritio non
- p. 59. rite procedat, et phthises oriantur. Curatio igitur phthisium symptomaticarum, a curatione morbi primarii, haud diuersa esse debet. Sic phthisis, a malo hysterico orta, ut malum hystericum, scrophulosa, ut scrophulae, venerea, ut lues venerea, tractanda venit et s. p. Morbo vero primario hac ratione destructo, saepe accidit, ut genus neruosum adhuc affectum restet, phthisisque persistat; et tunc methodus mutanda, phthisisque, ut neruosa essentialis, tractanda erit 1) obstructiones destruendo, 2) tensiones et rigiditates solidorum dissipando, 3) et reparando vitia succi neruosi, id quod, per 1) resoluentia, incidentia, aperientia, 2) emollientia, humectantia, et 3) per exactum, et conueniens, diaetae regimen, fieri debet. In hisce vero phthisibus neruosis essentialibus, nequaquam quaelibet aperientia conducunt; sic martialia, ob irritationem fibrarum, sollicite vitanda sunt, et mercurialia itidem nocere possunt. Eorum vero loco, gummata incidentia resoluentia, et aperientia, succique, vel decoctiones, plantarum, eadem virtute gaudentes, adhibendae sunt.

In phthisi pulmonali a tuberculis, tubercula, vel p. 66.
cruda sunt, et naturaliter nunquam suppurant, vel
suppurant, ulceraque formant. Cruda, interdum
per tussim, reiiciuntur*. Quale exemplum Cl. Au-
toris observatio I. sistit. Sacerdos viginti octo an- p. 71.
norum, anno 1748, post febrem quotidianam, in-
lentam degenerantem, mensis praeterlapso spatio,
pondus in pectore, respirationem afficiens, sentit.
Frustra hoc tussiendo expellere conatur. Sequitur
tussis sicca. Lac, cum decocto hordei, diarrhoeam
excitat. Post aquarum mineralium potum tussis fit
molestior, excreationes lymphaticae sanguine tinctae,
et, post aliquot dies, obturaculum, corneae duri-
tiei, fere pollicem longum, pure tectum, et octo
linearum circumferentiae, reiicitur. Tussi aucta
acuti dolores in pectore insequuntur, et, post tussim,
quantitas aquarum rubellarum, post aliquot dies vero
Dd 2 albi-

* Noua litteraria Hamburgensia, notabilem eius modi
casum, continent. Virgo 16 vel 17 annorum, tussi,
cum excreatione pituitosa, corripiebatur, quae ve-
ro, nec male olens, nec purulenta erat. In hac pi-
tuitosa excreatione, interdum parua, dura, albican-
tia, corpuscula, grani piperis magnitudine, occurre-
bant. Haec, si aperiebantur, pus foetidum, carnem
prorsus putridam olens, exhibuerunt. Aegra de re-
liquo satis bene valens, nullum sanguinem exspue-
bat, nec tussi amplius vexabatur. Excreatio vero
continua, sine tussi, interdiu noctuque, satis larga
remanit. In hac pituitosa excreatione, absque ul-
lo puris signo, saepius eius modi dura corpuscula
occurrebant, foetido pure plena. Et hoc symptoma
adhuc cum durat, aegra iam annum tricesimum se-
cundum agente. Ex octo vel nouem annis maritata,
aliquot sanos infantes peperit. Haec corpuscula re-
iecta, ante aliquot tempus, pisi maioris magnitudi-
nem, adaequarunt, apertaue foetorem de se spar-
serunt horrendum. Vid. Freye Urtheile und Nach-
richten zum Aufnehmen der Wissenschaften und der
Historie überhaupt. LV. Stück. Hamburg, Dienstage
den 16 Iulii 1754. pag. 434-436.

- albicantium, reiecitur. Post aliquot tempus, aliud eius modi obturaculum, eiusdemque magnitudinis, reiecit. Sequuntur sputa purulenta, febris lenta, dolor, in pectore, et inter scapulas. Cl. Auctor venae sectione, purgatione, remediis vulnerariis, aperientibus, et tandem, ptisana, aquisque mineralibus, pristinae sanitati, eum restituit.
- p. 76. *Secunda observatio* virum nobilem, quadraginta annorum, exhibet, qui, anno 1744, plures vomicas, in pulmonibus se aperientes, reiecit, et tandem,
- p. 80. hydrope mortuus est. *Tertia* observatio iuuenem viginti quinque annorum sistit, qui, anno 1751, post tussim, apertam vomicam reiecit, et ab Cl. Auctore ptisanis pectoralibus, vulnerariis, balsamicis, plenarie restitutus est. *Sexta, septima, octava, nona,* observationes, non leuem suspicionem mouent, phthisin pulmonalem morbum, quodam modo contagiosum, esse. *Vndecima* observatio phthisin complicatam, cum symptomatibus phthiseos nervosae, et pulmonalis cum tuberculis, sistit, quam iuuenis viginti quinque annorum, anno 1747, sudore diffluens, aerique frigidiori sese exponens, sibi contraxit. Pristinae vero sanitati, a Cl. Auctore, re-
- p. 120. stitutus est. *Duodecima* tandem observatio casum continet, ubi femina viginti duorum annorum phthisi pulmonali, febre lenta, cum tussi admodum frequente, sputisque purulentis, et hereditario venereo malo, laborans, cum, post lactis asinini potum, febris, pectorisque dolores, longe vehementiores facti essent, frictionibus mercurialibus ad modum parvis, in principio quinque, dein quatuor, et postmodum trium, dierum interuallo, et diaeta conueniente, adhibitis, intra quatuor menses, perfectissimae sanitati restituta est.
- p. 106. Ortum vero, causamque tuberculorum in vasis lymphaticis, lymphae ipsa, ponit Cl. Auctor: Illa enim, aut nimis contracta, aut nimis relaxata, lymphae

phae motui obicem ponere possunt, et haec, naturaliter mucilaginosae viscosaeque, aeri frigidiori expositae, magis coagulari, hinc stagnare, durescere, et tubercula formare potest. Tubercula non suppu-
p. 110.
rantia a lymphae sola, suppurantia vero a particulis inflammationi aptis, v. g. si sanguinis quidpiam lymphae admisceretur, originem trahere arbitratur. Tubercula tunc demum per tussim siccam, aliaque phthiseos pulmonalis symptomata, se manifestant, si ex primo fluiditatis statu ad secundum mollitiei, peruenerunt: venae sectio ob plethoram, ad minimum particularem in pulmonibus, et ad auertendam inflammationem, semper necessaria est. Aquae minerales sulphureae et martiales, nec non martialia ipsa, et mercurialia, in hoc morbo perniciose sunt. Equitatio non nisi in primo phthiseos pulmonalis gradu utilis est. Primarum quoque viarum ratio habenda est, leni purgante per intervalla dando, et miscendo stomachica amara aperientibus. Aperientia vegetabilia in iusculis et ptisanis, succique plantarum, nec non electuaria aperitiua, cum leni quodam purgante mixta, necessaria sunt. In secundo vero phthiseos gradu, si tubercula inflammari incipiunt, aperientia aliena sunt. Venae sectiones potius, ptisanae anodynae, pectorales, narcotica, et leues emulsionem ex seminibus frigidis conducunt. Si tubercula suppurant, ulcera detergenda, cicatrifanda, et massa sanguinea, a corruptione a pure absorpto oriunda, defendenda est. Id, quod farinaceis in aqua, vel emulsione amygdalina, coctis, iusculis raparum, ranarum, interpositis anodynis, obtinetur. Sudores colliquatiuos et diarrhoeam, quae mortem annunciat, Cl. Auctor saepe absorbentibus et diaphoreticis auertit, dando, bis de die, dosin conuenientem, coralliorum, millepedum, pulueris cancerorum, antimonii diaphoretici cet. superbibendo haustum ptisanae ex farsaparilla. Si febris vero, calor, et excretio

exinde augentur, sputaque sanguine tincta sunt, tunc eorum loco remedia, contra tuberculorum inflammationem commendata, usurpanda sunt. Suppuratio-
ne finita febris adhuc subsistere potest, quae ptisanis
amaris, absorbentibus, diaphoreticis, lenibusque
purgantibus abigi debet; et tunc demum serum la-
ctis, cum cancerorum aliquibus, et pugillo fumariae,
scolopendriique, in balneo maris, decoctum, con-
uenit.

- Ex nouem sequentibus vero, *de phthisi pulmonali
ab ulceribus ortis, observationibus*, quarum quatuor
ultimae ex aliis auctoribus depromptae sunt, duas tan-
p. 127. tum priores breuiter indicabimus. Femina quadra-
ginta sex annorum, temperamenti sanguinei, et admo-
dum robusta, durante hyeme 1745, vehemente la-
borabat tussi. Qua in principio neglecta, post men-
sem oriuntur pectoris dolores, sanguinis sputum, fe-
bris satis vehemens, excreatio puris sanguine copio-
so mixti, augmentum pectoris dolorum, et macies,
quam Cl. Auctor, methodo consueta plenarie resti-
p. 132. tuit. Iuuenis vero chirurgus, qui de anno 1745
usque ad annum 1749 saepius sanguinem copiosum,
et dein adhuc per binos annos nil nisi pus excreaue-
rat, atque in morbi principio nil nisi venae sectiones,
lactis potum et aquas minerales, sanitatis statum lon-
ge deteriorem reddentes, adhibuerat, tandem hy-
p. 142. drope mortuus est. Causam harum phthisium, vel
in erosione pulmonum a vitio quodam massae san-
guineae, vel in ruptura vesicularum pulmonalium
a plethora, ponit Cl. Auctor; licet hanc ultimam, et
praecipue periodicam sanguinis excreationem, non
semper ulcera phthisinque pulmonalem producere,
sed potius interdum, eodem modo, uti seminarum
catameniorum fluxum, ad vitae conseruationem, ne-
p. 150. cessariam esse iudicet. In cura vero harum phthi-
sum primo sanguinis sputum venae sectionibus, ad-
stringentibus, vulnerariis, narcoticisque tollendum
erit

erit, quo facto, reliqua eadem methodo, uti in phthisi pulmonali a tuberculis orta, tractanda sunt. Certissime tamen persuasus est, ulcera pulmonum, licet a malo hereditario prouenerint, curari posse; siquidem praeter alios complures se puellam octode-
cim annorum (cuius parentes phthisi pulmonali mor-
tui erant) tuberculis pulmonum, et fere secundo phthiseos gradu laborantem, anno 1751, post trium mensium curationem, secundum methodum propo-
sitam, a tussi, pectoris doloribus reliquisque sym-
ptomatis liberasse, perfectissimaeque sanitati restituis-
se asseuerat. p. 161.

In quarta tandem sectione de usu lactis in phthisi
pulmonali Cl. Auctor ostendit, cum tubercula cruda
ex coagulatione lymphae oriantur, et hinc principi-
um coagulans in liquidis totius corporis adsit, lac ab
hoc necessario coagulari debere, et sic non solum
tubercula augere, sed et noua formare posse. Et
hinc in phthisi hereditaria, ubi principium coagu-
lans semper in sanguine praesens est, lac eo pernicio-
sius esse debet. In secundo vero phthiseos gradu,
ubi febris accedit, tubercula inflammantur, atque
suppurant, post lactis usum statim insequuntur sudores nocturni colliquatiui, exsiccatio corporis maior,
infarctus glandularum intestinalium et diarrhoea mor-
tis praenuncia. Febris certe inflammatoria, quae
in secundo phthiseos gradu incipit, lactis usum quam
maxime contraindicat. In ultimo phthiseos pulmo-
nalis gradu lac minime omnium conuenit, sed omnia
peiora reddit, mortemque accelerat. p. 165.

Prima secundae partis sectio decem variorum mor-
borum observationes continet, ex quibus praecipuas
breuiter tantum adducere liceat. Arthriticus sexagin-
ta annorum, finita accessione durante hyeme 1745,
frigori sese exposuit, ex quo urinae suppressio secuta
est, quam, intra horas viginti quatuor ope clysterum
et ptisanæ diureticae curatam, biduo post altera ea-
que

que pertinacior excepit. Sexto enim die extremitates oedematosae apparebant et transpiratio redolebat urinam. Nono oedema aderat uniuersale et circa noctem singultus frequens. Post varia inutiliter adhibita duodecimo tandem die spiritu salis restitutus

p.202. est. In *observatione secunda* virgo nobilis triginta annorum adducitur, quae mense martio 1749 vehementibus renum doloribus una cum vomitu pertinaciter perseuerante et cephalalgia admodum sensibili correpta fuit. Aquae minerales et balnea nihil effecerunt. Aestate vero 1750 lixiuum sarmentorum vitis primo cochleatim et dein poculatim haustum magnam arenularum et calculorum copiam depulit, aegramque a vomitu et renum dolore intra quatuor-

p.208. decim dies penitus liberauit. *Tertia observatio* puellam quindecim annorum producit, quae singulis tribus vel sex mensibus, vehementissimo, tres, quatuor, vel interdum etiam octo dies durante, singultu adeo laborauit, ut suffocationis periculum immineret, et sanguis accessionis tempore semper per nares auresque erumperet. Post duodecim vero annorum spatium ante hos tres annos ultima vice, nouis vero cum symptomatibus stipatus reuersus est. Urina enim per octo dies parca copia saepe et difficulter, deinde vero liberius promanauit. Partes vero gypseae duritiei, duas tertias partes lineae crassae, internam vesicae cavitatem procul dubio undiquaque obducentes, insimul per urethram egrediebantur. Omnia haec fragmenta duabus planis, superficiebus praedita erant, quarum altera interiori vesicae respondere visa rudis et scabra, altera vero leuis et polita erat. Sulci quoque irregulares, rugis huius visceris procul dubio respondentes, in illis conspiciebantur. Posteaquam igitur aegra horum plus quam quatuor uncias reddiderat, ab omni symptomate libera per-

p.250. mansit. In * *nona vel potius octaua observatione* contagiosus

* Loco septimae enim observationis ex typographi

tagiosus morbus, cum specie leprae illius hereditariae inter Negros sinus Mexici le Pian appellatae, multum similitudinis alens describitur. Hic morbus, qui in Neraci confiniis ineunte iunio 1752 se primo manifestavit, per suctionem atque lactationem potissimum propagatur. Infantes primo male se habent, emaciantur, et paulo post pustulis scatent in toto corpore, praecipue tamen in facie, circa labia, ore interno, collo, natibus, femoribusque. Nutricibus vero hae pustulae primo in pectore circa mammas et dein in toto corpore erumpunt. Hae pustulae generatim circulares, durae, et parum callosae sunt. Quaedam ad modum parum suppurant, materiem flavescentem farinosam emittentes, quaedam vero crusta eiusdem coloris tectae conspiciuntur. Vtriusque generis pustulae interdum adeo multiplicantur, ut crustas fere continuas forment, in ulcera profunda cum ossium denudatione degenerent, tandemque interficiant. Circa finem decembris 1752 iam plus quam quadraginta infantes feminacque hoc morbo laborantes innotuerunt. Cl. Auctor quidem ulcera profunda cum ossium denudatione ipse non vidit, omnes tamen, quotquot eum adire, unguento, quod ex uncia mercurii, ex cinnabari resuscitati atque cum terebinthina extincti, duabus unciis pinguedinis et granis viginti camphorae componebatur, linteis leuiter illinito, pristinae sanitati restituit. Infantes in quatuordecim diebus sanati videbantur, diutius tamen unguenti applicationem continuauit, et feminis ad plenariam restitutionem frictiones quasdam mercuriales adhibuit. Unguenti vero mercurialis sine camphora applicatio spem boni successus saepe fefellit. *Decima observatio* iuuenem p. 270. viginti quinque annorum sistit, qui per quinquaginta et quinque dies sola aqua vixit. *In undecima vel* p. 275.

Dd 5

potius

errore octaua legitur, qui numeri error in sequentibus continuatur.

potius decima obseruatione iuueni viginti trium annorum, qui per viginti minuta absque ulla respiratione sub aqua haesit, atque ex eadem extractus mortuo simillimus fuit, aere primum in anum immisso, labium inferius paululum moueri coepit, quo facto, post largam venae sectionem in brachio institutam, larga vini emetici dosi eidem propinatur. Hanc vero loco vomitus conuulsiones quadrihorium durantes, hasque sudor profusissimus bihorium durans excepit. Post iteratam venae sectionem sanus expergiscitur, cum omnimoda tamen facti huius obliuione.

p. 281. Quaestionem medico-legalem, utrum signa restent ex quibus, vel certo cognosci possit, feminam quondam partum edidisse, vel illam nunquam peperisse, negando soluit.

p. 296. *Altera secundae partis sectio*, obseruationes de morbis epidemicis, qui in Neraci confiniis sub finem anni 1751 regnarunt, continet. Tempestas a nouembri 1750 usque ad finem maii 1751 adeo pluuiosa fuit, ut viginti sex circiter pollices aquae deciderent. Hanc per totam aestatem aestuosi calores exceperunt. A mense nouembri 1751 ad 1 iulii 1752 tempestas variabilis fuit, qua sedecim tantum pollices aquae deciderunt. Vere 1751 multi longique catarrhi, dein febres intermittentes, aestate pleuritides spuriae, angina mediocris passim, mense nouembri vero inter vulgus laboriosum catarrhi, febres, dolores vagi aliaque incommoda regnarunt. His parui pectoris dolores cum febre, aliis oppressiones pectoris solae absque apparente febre cum prostratione virium et morte subitanea succedere. Paruas enim refrigerationes statim calor, pulsus frequens turbatus, dolor surdus parum sensibilis in pectore modo versus sternum tendens, modo in costis, pectorisque oppressio excepit. Hi dolorem per interualla, illi ad tertium vel quartum usque diem continuo, ambo non diutius sentiebant, oppressio vero ab initio

tio ad mortem usque semper augebatur. Cessante dolore aegri postero die, scilicet quinto, plerumque, alii vero, septimo, moriebantur. Quidam laterum dolore violento per intervalla cum febre, oppressione vero non adeo considerabili laborabant, et ex his longe pauciores moriebantur. Aegris cum laterum dolore, tussis sicca parum considerabilis, iis cum dolore obtuso excreationes lymphaticae, reliquis nulla tussis, sed pulsus depressus saepeque irregularis accedebat. Pauci capitis dolorem, omnes linguam flavam, urinam albicantem, sanguinemque ut in vera pleuritide habebant. Aegri parum dormiebant. Quidam statim a principio plurimum continuo sudabant, plurimi vero conatus vomendi vel vomitus, in diarrhoeam mortalem degenerantes, experiebantur. Neminem infra decimum quintum annum constitutum Cl. Auctor hoc morbo laborare vidit. In aegri cadauere, qui nulla febre apparente, nullo laterum dolore, nec tussi nec excreatione, sed sola oppressione vehementissima, vomitu, diarrhoea, quarto die cessante, dein sudore ad mortem, quinto die insequentem, usque durante, laborauerat, ambo pulmonum lobos sphacelatos, omnesque lobulorum cellulas lymphâ crassa viscosa repletas, et in medio dextri lobi congestionem lymphæ purulentæ inuenit. Intestina tenuia vermibus infarcta erant. Ambo quoque pulmonum lobos plenarie sphacelatos atque in cuiuslibet lobi pulmonum medio abscessum, pure bene digesto et satis liquido plenum, pulmonesque undequaque adhaerentes in alius cuiusdam aegri cadauere, qui parua refrigeratione, febre, dolore pectoris intolerabili, oppressione, tussi mediocri per intervalla accedente, excreatione lymphæ viscosæ, pulsu frequente turbato laborauerat, inuenit. Euanescentem sub finem tertii diei lateris dolorem exceperat crudelissima oppressio, et sub initium quinti diei mors. Alii medici pulmones itidem sphacelatos inuenerunt.

Causam

Causam partim in tempestatis pluuiosae aestuosaeque vicissitudines, partim in annonam atque frumentorum corruptorum usum coniicit. Pauperes enim plerumque multos vermes insimul habuere, diuites non item. Quo ad medendi methodum Cl. Auctor in pulsu eleuato atque febris symptomatibus, nec non si aegri ab initio statim multum sudarent, venae sectionem praemisit. In depresso vero pulsu febrisque absentia statim vomitorium exhibuit, praecipue si vomendi conatus insimul adfuerint. His persistentibus atque diarrhoeae suspicionem mouentibus vomitorium reiterauit, sequentibusque binis diebus purgationem cum vermifugis exhibuit. A secundo die ptisanæ ex scorzonera, scordio foliisque borraginis confectæ, cuius mensurae uni et dimidia graua duodecim camphoræ in spiritu vini solutæ, adiecta erant, omni quadrihorio haustum per tres vel quatuor dies propinauit. Tertio die cuilibet ptisanæ haustui corticis peruiani scrupulos duos iunxit vel eorum loco bolum ex corticis peruiani scrupulis duobus una cum granis duobus camphoræ. Ex iis, qui hac methodo utebantur, non nisi duos e vita discessisse, asseuerat Cl. Auctor.

De *tertia* vero huius *libri parte*, quæ dissertationem de aeris, in statu naturali et praeter naturam considerati, ingredientibus continet, hic partim eam ob rationem, ne fines recensitionis transgrediamur, partim vero ideo quoque nihil monemus, quia haec paruum tantum maioris longe operis sciagraphiam sistit, quod Cl. Auctor in posterum se editurum esse promittit, ad quod perficiendum eidem vitam, otium et sanitatem ex animo apprecamur. Quilibet enim ex modo recensitis Cl. Auctoris diligentiam in obseruando et dexteritatem in exercenda arte salutari facile perspiciet.

praefat.
pag. IX.



IV.

Dissertatio physico-medica, complectens experimenta varia calorem animale spectantia, Auctore ARNOLD DVNTZE, Bremensi. Lugduni Batavorum. 1754. 4 mai. pl. 5 $\frac{1}{2}$.

Omne animal dum viuit, calet. Atque illud est in primis, quod calidi innati titulo prisca admirata fuit aetas, quodque nostra sibi caloris nomine inuestigandum fumsit penitius. Multum tentarunt hac in re, neque sine successu, plurimi; multum tamen relictum adhuc fuit, quod detegant alii. Quid igitur eundem in finem tentauerit Cl. DVNTZE, enarrandum nobis iam est paullo fusius; quid autem inde euicerit, iudicium esto penes lectores.

Sensus ille singularis, corpori animali impressus p. 2. ab actione ignis in organa, sentiendo dicata, calor Cl. Auctori dicitur, cognituque valde difficilis est, absolutum in primis eius statum si consideres. Variat enim in omni viuo corpore, certaue, quam sequatur, nondum inuenta fuit lex. Neque clarior certiorue relatiui datur cognitio. Nam causam eius, ignem quamuis noueris, huiusque metiri queas gradus, varius tamen saepius atque contrarius est effectus. Feruente aestate interdum hunc calor urit, illum contra frigus; horrorem febrilem nulla profecto exstinguit caloris externi vis. Constantiorem tandem caloris cognoscendi metiendique rationem docuit scrutatores illa ignis vis, quae corporum auget volumen, rarefactionis nomine cognita. Vnde thermometra inuenta. Ex quibus eminet placuitque in primis Cl. Auctori Farenheitianum. Sensum autem hunc, calorem percipit et animal, quod calet, et cum aliis quoque, vario licet modo, communicat. Hinc, quae determinatum aliquem caloris gradum seruant, licet calor medii, in quo degunt, satis notabi-

tabilem fufceperit mutationem, *calentia*; quarum vero calor eadem in proportione, qua calor medii, quod obtinent, commutatur, *frigida* dicuntur animalia, licet absolute talia nulla dentur; gradu enim caloris, quam medium, maiori adhuc gaudent.

p. 4. Causam porro caloris si postules, externa alia est, alia interna. Illam cum reliquorum corporum caloris causa communem, ignem puta, obtinet. Haec vero, tanquam differentia caloris absoluti animalis a calore medii, in quo versatur, animali corpori propria est, prorsusque singularis; mutua nimirum vaforum eius fluidorumque in se inuicem actio, nataque inde frictio causa haec est, eaque proxima. Frictu autem fluida aequae, ac solida, incallescere, ipsa aqua confirmat, numquam congelascens in riuulis rapidissime decurrentibus, omnisque liquor pinguis, valido agitatus motu. Opus inde haud est, cum Cl.

p. 6. CROMWELL MORTIMER phosphoricas sibi in fluidis nostris fingere particulas; nullam umquam calorem ciet phosphorus. Neque veritati respondet illa caloris interni in animalibus genesis, quam a contractione vaforum minimorum per frigus externum deriuauit Cl. ROB. DOUGLASS. Quod si cum vaforum diametris, illos globulorum sanguinis proportionatim minuit frigus, quis erit et quo modo attritus? Deinde non nisi in pulmones et superficiem corporis quum agat frigus; in pulmonibus autem ipse adsumat sanguinis refrigerium; superficies corporis etiam uno vel duobus gradibus minus calescit, ac internae partes, teste experientia; ubi igitur a frigore calor animalium?

Tandem quoque motus internus sanguinis, quem Cl. STEVENSON statuit inter fermentationem atque putredinem medium, positaque in venis, ac in primis in duarum cauarum concursu, caloris sedes, ne refutatione quidem indiget, ficta ab ingenio, naturae repugnans phaenomenis.

Ab

Ab hac iam posita causa ad calorem iterum redire iuuabit. Qui quidem internus vitae perficiendae quum haud sufficiat, calorem ambientis medii necessario postulant animalia. Hic ipse nullibi licet deficiat, datur tamen eius gradus minimus, vitae usum impediens. Quis ille sit gradus, definire valde est difficile. Tentarunt id in Lapponia Cl. MAVPERTVIS, et in Sibiria Cl. GMELIN. Vltimum vero, p. 9. quem ferre queant animalia, caloris gradum euincere ausum fuit frequentius. Nonagesimum esse eundem, duce BOERHAAVIO, affirmarunt adhuc plumi; nuperioribus autem ex obseruationibus, in Carolina 1738, iunio mense, Cl. LINING caloris 98°, idem 1751 iulio mense eius 100°; Cl. REAUMUR in Syria 98°, in Senegallia 103½°; eundem gradum Astracaniae notauit Cl. LERCHE, sustinerique ab incolis 108°, imo 116° ad integram usque horam, commemorat. Ipse Cl. Auctor Gottingae 1750, iulio mense ad 95° euectum in thermometro vidit mercurium *. Vt vero accuratius in hanc rem inquireret Noster, in animalibus viuis varia eo lubentius instituit experimenta, quo celebriorem ducem, BOERHAAVIUM**, eadem qui fecerat, sequi licuerit. Delegit sibi igitur hunc in usum conclaue, longum p. 11. pedes 8½, latum 6½, profundum 6 pedes, cuius alterum latus duobus fornacibus ferreis instructum erat, nulla patente ianua, praeter quam quod superiori operculum, ex asseribus ligneis crassissimoque linteamine confectum, superimponeretur aperturae. In quo dein thermometrum proxime ad fundum, a fornacibus remotissime locauit, munitum insuper ligneo asserculo, ne laederent id animalia, foramine tamen

* Ex Transact. philos. Voi. XLVII. n. 3. obseruationem Cl. PRINGLE, qui militem viderat viuere adhuc in calore 103 graduum, ipsi olim indicauimus in Comment. nostr. Vol. III. P. I. p. 6.

** Conf. eiusd. Element. Chem. Tom. I. p. 275.

tamen exciso, ut calorem admitteret libere. His ita praeparatis, Cl. DVNTERE iteratis vicibus, huic caldario intrusit canes diuersi ponderis, coloris, aetatis et magnitudinis, auxit sensim calorem caldarii, obseruans attente et gradus thermometri, et temporis interualla, ipsaque, quae ad mortem usque experiebantur canes, symptomata; excisos post mortuos dissecuit, et, quae sese ipsi obtulerunt, adnotauit phaenomena; quibus denique inter se et cum aliorum obseruatis comparatis, sua adnectit corollaria, maximi omnino nobis visa momenti. Ipsam experimentorum enarrare seriem, diffusum nimis esset, iuuabit tamen praecipua inde hic adducere phaenomena, Auctorisque de iisdem addere iudicium:

p. 23. Primum igitur, quod notari meretur, gradus est ille caloris ultimus, quem ferre potuerunt isti canes. Moriebatur enim canis primus in aestu 113° minore; alter in 115° ; tertius in 122° ; quartus in 110° ; quinti experimenti primus in 106° ; alter in 126° ; tertius in 119° ; sexti tentaminis primus in 126° ; alter in 119° ; tertius in 108° ; quam diuersitatem caloris ultimi colori haud tribuit Cl. Auctor ideo, quod, nigri coloris qui erant, primus, alter, quinti tentaminis secundus, sextique experimenti primus varium aequae sustinuerunt aestus gradum, ac reliqui colore fusco vel albo praediti, licet nigri aethiopes maiorem dicantur ferre praec albis Europoeis calorem. Intensiorrem porro haud sustinent canes in directa ratione temporis, quo calor intenditur. Nam quum primo cani horis V, 20' a 67° ad 113° increuerit applicatus calor, adeoque gradibus 46; secundo horis IV, 20' a 64° ad 115° , adeo gradibus 51; tertio horis V, 20' a 67° ad 122° , hinc gradibus 55; sexto VII. horis a 65° ad 126° , hinc 61° ; septimo horis V, 30' a 65° ad 119° , inde 54° ; decimo horis IV, 30' a 62° ad 116° , hinc 54° , vix definiri inde poterit certus ultimusque ille caloris gradus; diuersusque adeo in eiusdem speciei

ciei indiuiduis effectus illius a peculiari forte pendet
 animalium horum structura. Internum porro disqui-
 rens calorem, immisso trium horum canum abdomi-
 ni thermometro, inuenit. Noster prioris canis calo-
 rem 110° , externo aeris existente 146° , respirauit-
 que inde aerem 36° calidiorem: reliquorum duorum
 in abdomen intrusum thermometrum descendit ad
 109° et 108° , aeris calor dum erat 110° . Quibus
 omnibus iam rite ponderatis, et cum BOERHAAVII
 sententia comparatis, quem tale animal, salua vita,
 ferat, caloris gradum extremum, dubius licet adhuc
 Cl. DVNTZE, ponit centesimum et decimum, Cl.
 HALES equidem summum febrilem aestum dicit esse
 136° ; Cl. MARTINE in intermittenti febre eum
 108° , similemque in febre podagrica Cl. SCHWEN-
 KE obseruarunt. Ill. BOERHAAVE meminit in ca. p. 27.
 ne, calore enecto, se percepisse immanem foeto-
 rem; Nostri autem in decem repetitis experimentis
 canes statim post mortem exhibuerunt prorsus nul-
 lum. Forte tamen illo in indiuiduo singularis latuit
 foetoris tanti causa; fortasse etiam Cl. FAHRENHEIT,
 qui fecerat tentamina, nimis terribilis tantum visus
 est idem. Hinc quoque ea, quae ex unica illius ob-
 seruatione deduxit corollaria Cl. BOERHAAVE, ad-
 mitti facile non possunt. Huc referri debet salua,
 quam rubram Cl. BOERHAAVE, copiosam quidem
 et mucidam, numquam tamen rubellam, Noster
 obseruauit. Miratu dignum est praeter ea illud quod
 canes, aestu enecti, post mortem rigeant, flectique
 stipitum instar non possint, quod alio mortis genere
 iugulati non patiuntur. Neque sudarunt canes, felis
 autem obseruante BOERHAAVIO sudauit largius:
 an in epidermidis animalium horum peculiari structu-
 ra latet causa? Singulare porro phaenomenon prae- p. 30.
 buit inflammatio, per totum fere canum enectorum
 corpus diffusa, diuersa tamen in variis. Quos enim
 statim post mortem secuit, leuem eam ostenderunt;
 Tom. IV. Pars III. Ee quos

quos duodecim horas post mortem aperuit, tantam, quantam vix produceret injectio anatomica; neque magna haec observata fuit in cane suspenso, statimque post obitum dissecto; hinc causa eiusdem ponenda omnino est in tanta humorum resolutione, ut corporis superficiem sponte inundauerint. In reliquis canibus, altero die dissectis, inflammata visa sunt cutis, musculi, ventriculus, intestina, hepar, lien, cordis superficies, meninges, cerebri cortex; in secundo contra et quinto cane pulmones leui modo tincti phlegmone erant, cerebri vero vasa turgebant sanguine; cor anterius et vena caua exhausta cruore, posterius autem turgidum sanguine fuerat. Mira omnino haec visa fuit Cl. Auctori res, quam tamen ita explicat, ut cor sinistrum in duobus his canibus ideo fuisse affirmet ultimum moriens, quod non in pulmonibus, sed in arteriarum finibus venarumque dextri cordis principiis impedimentum oppositum fuisset.

p. 33. Aliud phaenomenon obtulit, idque singulare prorsus, cordis caro albicans, valdeque rubens eius superficies, quod visum ita non fuit in laqueo iugulatis. Actione pallere musculum vulgaris quamvis est opinio, in ranis vera inuenta; rubere tamen cor, contractum licet, quum monstrauerint dissectiones, contractioni musculosae tribui inde vix poterit phaenomeni huius ratio, forte tamen aliquid contulit eadem summe anxia. An sanguinis visciditas in causa

p. 34. sit, dubius haeret Noster? Huc accedit et illud, quod aer in omnes cellulositates, partes glandulosas venasque eruperit in istis canibus. Cuius quidem causa praecipua videtur esse putredo. Id, quod confirmant Cl. HALLERI, HALLERII, SCHWENKII observationes, aerem nimirum ex statu suo non elastico in elasticum interdum in vasis secedere, bullulisque sese prodere. Vel in viuento id euenisse Cl. SCHWENKE exemplum habuit virginis, cuius ve-
nas

nas post mortem, quae fuit subitanea, inuenit turgidas aere, mortisque huius causam posuit in tali secessu aeris.

Attentionem quamdam adhuc merentur etiam p. 36. rubrae illae maculae, in aestu enectorum intestinis sparsim natae, in suspensis fune canibus nullae visae. Quas tribuere putredini dubitat Cl. Auctor, arbitratum potius, viuis adhuc canibus natas iam fuisse easdem, quum in cane etiam, cui venam inciderat ante mortem, licet dilutioni cum rubore, apparuerint: Quin in homine, qui febre catarrhali maligna obierit, easdem se vidisse meminit Noster.

Tandem etiam, quanta sit in aestuosis morbis p. 37. venae sectionis utilitas, ex illo patet experimento, quo canis ab inflicto abdomini vulnere, immissoque huic thermometro, nihil sensisse videbatur, quin, incisa post vena iugulari, ad se rediens insistebat pedibus, triaque per minuta progressus, demum morti succumbebat. Sanguis enim eius confestim et altero die apparuit floridus, sanoque similis, abiens in coagulum, supernatante sero, nulla crusta inflammatoria, nulloque molestus foetore; reliquorum contra sanguis viscidus fuit, tenax, in fila ductilis. Putredinem inde minus patet liquasse iam hunc sanguinem, illud forte potius inde comprobatur prognosticon, sanguinem, in morbis malignis e vena missum, quo sanior appareat, eo maius portendere periculum.

His ita expositis, ad finem properans fatetur Cl. DVNTZE, multa adhuc aliorum disquisitioni se relinquere, tum quae acutarum febrium doctrina doceat, tum quae medicina praestare possit applicata inter cruciatus illis animalibus.



V.

Dissertatio inauguralis medica, sistens experimen-
 ta quaedam circa ligaturas neruorum in
 viujs animalibus instituta Auctore IOANNE
 HENRICO ABRVNN, ciue Helucto-Sca-
 phusiano. Gottingae, 1753. 4.mai. pl. 7.

Quanto difficilior, licet certior, ad veritatem per
 experimenta panditur via, tanto excellentio-
 rem eadem progressi merentur omnino laudem. In-
 ter plures, hoc nomine iam laudatos, Gottingensis
 Academiae ciues, superest adhuc, qui eandem suo
 iure a nobis postulat, Cl. ABRVNN, dignus auitae
 virtutis heres. Experimenta eius testes sunt!

- p. 2. Primum quidem, in animalibus generationem ob-
 seruaturus, Cl. Auctor multos canes et cuniculos
 utriusque sexus sibi coemerat, locoque separato, ut
 non nisi ipso praesente coirent, incluserat; sed coire
 quum recusarent, veneris stimulum forte numquam
 sentientes in carceribus, laboris huius pertaesus,
 aliam sibi elegit, eamque arduam, materiem; ner-
 uos etenim, brachiales, ischiadicum et vagum seu
 octauum, ligare in viujs animalibus feliciori cum
 successu ausus fuit, obscuramque adhuc neruorum
 doctrinam, factis simul accurate obseruationibus,
 p. 6. egregie illustrauit. En primaria! Canis a ligato cum
 arteria neruorum brachialium plexu, inter operatio-
 nem conuulsus valdeque clamitans, mox hilaris am-
 bulauit, altero die mouere brachium, eique insistere
 non potuit; tertio die mortuus est; nihil vero in vul-
 nere, nihil in neruis visum singulare. Alius canis,
 cuius neruum medianum tantum filo crasso ligauerat,
 post leues concussiones, plures dies inde nihil mali
 sensit. Idem vero canis, cuius neruorum brachia-
 lium plexum absque arteria filo tenui in altero latere
 constrinxit, inter ligandum contortus misere ciulans-
 que

que vehementius, post tristis, vacillans, tribus nixus pedibus incessit, mox nihil ciborum, post parum appetiit, quintoque die tandem obiit; vulnus suppurare coepit foetide, nervis disruptis visis.

Inde iam patet, nervos esse instrumenta motu-p. 10.
um voluntariorum. Perit enim motus in artu a ligatis eius nervis; manet integer, unico ligato, reliquis liberis relictis nervis. Corruit ergo simul illa hypothesis Cl. THOM. SIMSONIS*, motum minime fieri per nervos, eos esse tantum vasa nutritia, cerebrum vero succi nutritii receptaculum; id, quod inde probarunt alii, quod artus, cuius ligantur nervi, contabescat. Sed neque Cl. VALSALVA ligato in aneurismate nervo, neque Ill. HALLERVS neque Cl. BRVNN ullam umquam a ligatis nervis observarunt atrophiam. Illi forte cum nervo arteriam ligarunt, ut inde secuta sit contabescencia. Vis ergo nervos nutriens dubia omnino est. Cl. Auctoris observata confirmant potius Cl. VESALIUS ipsiusque avus BRVNNERVS.

At vero brachiales nervos ligare, ob vicinam ar-p. 14.
teriam magnam, multosque simul musculos dissecandos, valde difficile quum esset, ausum potius fuit in inferiori extremitate filo constringere ischiadicum nervum. Quo in cuniculo, qui cutis sectionem tranquille passus est, dein vossella tacto, omnes femoris pedisque muscoli tremere coeperunt, nervus non aequè; mox, ubi ligatur, conuellitur clamatque vehementius bestia, post tristis, auide licet cibos petens, crus resolutum et immobile trahit; vulnus licet lauaturn fuerit lacte, tertio tamen die inter convulsiones periit: vulnus suppuravit, nervus integer, nihil mutatus fuit. Canis robustus a ligato eodem nervo, eadem patiens symptomata, itidem pedem habuit motu sensuque carentem: scalpello saepius ictus nihil sensit, doluit vero valde, supra ligaturam
E e 3 tactus;

* Conf. Comment. nostr. Vol. II. Part. III. p. 461 seqq.

tactus; vicesimo post die mortuus fuit; vulnus pure scatens foetuit; nervus statim non occurrit, dein disruptus visus. In cane alio eadem tentata sunt cum eodem euentu; vulnus autem, quum iam sanatum esset, cute iterum resecta, scalpello irritatus musculus subiacens innox tremuit, idque discissus vehementius, quieto ceterum cane nihilque inde sentiente. En! praesentem adhuc irritabilitatem, sublata sensibilitate. In alio denique cane eundem quaerens nervum, discidit Noster venam et arteriam, huiusque sanguinem proflientem simul observavit venoso multum rubicundiorum: quo sedato profluvio, ligatoque nervo, eadem, ac in priori, euenerunt. In mortuo post cane, vulnus pure scatuit, nervus vero disruptus erat pureque inquinatus.

p. 21. Ex quibus omnibus iterum iam palam fit, nervos esse organa sensus et motus, causamque eius in singulis partibus haud residere, sed animam in solo sensorio communi suam in organa reliqua exercere actionem. Sensus enim motusque tollitur infra ligaturam, supra eam non aequae. Male ergo affirmat **ROB. WHYTT***, animam totum per corpus diffusam esse, et immediate ubique agere. Illud autem porro quaeritur, utrum involucris, an contenti operantur nervi? A meningibus nervos falso derivant **CL. MISTICHELLI** et **BLASIVS**; sine meningibus enim molles dantur nervi in cerebro, sensuque carent meninges, medulla cerebri vero sensibilissima est observata. Neque elastici, instar chordarum tremunt nervi; molles enim et pulposi in principiis et finibus discissi longiores potius fiunt, quam breviores, debiles nimium, ut trahendo agerent, debilioresque evadunt aetate et immobiles, quum deberent fieri fortiores. Sunt itaque canaliculi caui nervi. Quorum oscula oculus non videt, licet eadem se vidisse putet **CL. LEEUWENHOECK**, neque detegit injectio; probat

* Conf. Comment. nostr. Vol. I. P. IV. p. 589.

bat autem continuata ex cortice vasculoso cerebri medulla, eiusque nutritio vasculosam ipsius et nervorum fabricam. Fluidum porro quoque in se conti-
 nent nervi. Quod quidem oculi fugit aciem; quod neque Cl. MALPIGHIVS neque Cl. BELLINVS in cauda bubula dissecta; sed synoviam viderunt; quodque non probat intumescencia, quam observarunt Ill. MOLINETTI et WILLISIVS, prorsus numquam Noster. Fibrillae enim nerveae, nimis tenerae, facilius discindi, quam comprimi possunt. Fluidum vero probat secretio, ex multo sanguine, quae debet perfici in cerebro.

Natura autem liquidi nervorum quaenam sit, variant Auctorum sententiae. Spiritus credidit HIPPOCRATES et GALENVS aereos esse; acidos eosdem statuit WILLISIVS, BORELLVS et BELLINVS; spicula quoque ipsis tribuerunt uterque BERNOLLI; eadem et vim attractilem adsumsit KEILIVS. Sed ficta haec potius ingenio, quam naturae respondent commenta. Electricam, quam nostra aetas detexit materiem, subtilissimam, in corporibus diffusam, agentemque celerrime, ideo fluido nervorum aptam putarunt nonnulli. Eam vero profecto non impediisset vinculum, compressio et destructio nervi, si fuisset electricum liquidum nerveum. Inde neque haec placet hypothesis. Enim vero Cl. Auctorem experimenta quum docuerint, fibram muscularem esse irritabilem, nervos autem non aequè; illamque irritari facilius a blando stimulo, quam acri, facilius ab aqua et aere, quam a veneno; materiem illam colligit inde, musculos irritantem esse debere blandissimam. Atque haec erit etiam fluidi nervei
 indoles, blanda, subtilissima, celerrime agens, ad irritationem musculi aptissima; qui ex eius defluxu celerius et fortius, quam ab acri irritante, contrahitur. Continuus igitur fluidi huius adfluxus in musculos vitales motus perficiet; voluntarios autem de-

riuatum illud ab anima in determinata loca. Quo modo id perficiat anima, latet; certum tamen illud est, eam in cerebro, non in finibus neruorum suam
 p. 36. exercere actionem. Confirmat id exemplum. Femina, cuius pedem, in inferiori parte carie excum-
 rite amputauit chirurgus, aliquot dies post diros do-
 lores passa in loco, ubi caries fuerat, sanaeque licet
 mentis, pedem amputatum fuisse, vix sibi persuade-
 re potuit. Certe, si in finibus neruorum sentiret,
 falli non potuisset anima.

Supereſt adhuc illud corollarium, quod sibi di-
 ctum eſſe velint chirurgi, ut nimirum in amputan-
 dis artubus a ligandis ſimul cum arteria neruis ſibi ca-
 ueant ſedulo; vehementiſſima inde quum ſequantur
 p. 37. ſymptomata. Vltimo tandem loco deueniendum
 iam eſt ad eā, quae ligato octauo ſeu vago neruo ob-
 ſeruauit Cl. Auctor. Ab eodem in dextro latere li-
 gato canis, inter operationem vehementer conuulſus
 clamitansque, poſt quietus iacuit. cibosque reſuſa-
 uit omnes. Qui quum aliquot diebus poſt e vulnere
 conualuiſſet, cibos iterum appetens, eius neruus va-
 gus in ſiniſtro latere ligatur. Conuulſus, nullum, am-
 pliſ, licet tentaret, edidit clamorem; mox vomere
 coepit aluumque deponere; et id conatus fuit ſaepi-
 us; cibos reſpuit; aerem non niſi erecto collo ca-
 ptauit; ſequente die mortuus. Vuluſ fuit recens,
 nihil mutatum; ventriculuſ diſtensus, ciborum ma-
 terie viridi, putrida reſertuſ. Cuniculuſ, a ligato

p. 40. in utroque latere neruo vago; mox concuſſuſ valde
 ſuſpiria edidit cibosque reſuſauit; breui poſt vomuit,
 fluente ſimul ex ore et naribuſ materia viridi, ſpumo-
 ſa; reſpirans diſſicillime, altero die periit, ſimili ma-
 terie in ore, naribuſ, oſophago, ventriculo et in-
 teſtinis inuenta. Aliuſ cuniculuſ, ſcuſ cum pupil-
 liſ ſcuſis*, ligato in dextro latere, craſſioris fili ope,
 neruo

* Quum candidi cuniculi tantum rubras, ſcuſi vero
 omnes ſcuſas habeant pupillas, erroris commiſſi ac-

neruo octauo, nihil sentiens incommodi, bene va-
luit, aliquot tamen dies nullas reddidisse foeces visus
est. Eiusdem neruus, in altero latere filo crasso li-
gatus, nihil quoque mali concitauit: ex ligato autem
ischiadico neruo mortuus est idem, nihil tamen in
vulnere neruoque octauo mutatum exhibuit.

In alio deinde cuniculo totum quum discinderet p. 43.

Cl. Auctor in utroque latere neruum vagum, anxie
lamentans ille vehementer contorquebatur, quietus
post factus, cibos, quos paullo ante appetiit, pror-
sus fastidiuit; tertio die in latus dextrum prostratus,
respiransque difficile, inter conuulsiones obiit, nullis
per tres dies redditis foecibus. Ventriculus distentus
paucis contentis foetidis; intestina tenuia inania fla-
tuque expansa; crassa vero simili, ac ventriculus, pu-
trida materie referta fuerunt.

Observata iam phaenomena facile explicantur ex
nerui dicti ortu et distributione in variis corporis
animalis partibus facta. Quorum primum notari me-
retur conuulsio partis, ad quam ligatus neruus adit,
uti patet ex experimentis Cl. Auctoris. Hinc ex con-
strictis vel discissis octauo paris neruis cor palpitare
vidit Cl. BORELLVS et WILLISIVS. Quo plures p. 45.

autem et maiores nerui aliquam ad partem adeunt,
eo maiores ab his ligatis sequuntur effectus. Patet
id ex vehementi vomitu animalium istorum; ex mo-
tu peristaltico intestinatorum inuerso facto; ex bilis in-
dole mutata; ex appetitu, sensuque ventriculi pror-
sus sublato.

Aliud, idque notatu dignum phaenomenon exhi- p. 47.
bet sublata ex ligato neruo octauo animalium vox.
Vidit idem Cl. MORGAGNIUS et ENS alique viri
clarissimi. Probat anatome illud, quae multos ra-
mos eius abire monstrat ad laryngem huiusque mu-
sculos.

cusatur Cl. LINNAEVS, quod definiat in syst. nat.
pag. 9. cuniculum esse *leporem cauda abrupta, pupillis*
rubris.

sculos. Cor quoque non nullos nervos in homine, plures et maiores in brutis a pari vago quum accipiat, hoc ipso ligato, debiliorem reddi cordis motum, observarunt Cl. LOWE RV S, E N S, atque WILLISIVS. Id, quod confirmant Cl. Auctoris observata. Sed ubi praeter vagum alios adhuc integros nervos cor habuit, ex ligato vago non subito perierunt animalia. Vixisse enim ab hac ligatura eadem per unum alterumque, imo plures dies, affirmant Cl. BORELLVS, WILLISIVS, PETITVS, et Noster. Post viginti demum horas perire inter tremulos motus animal, ab octavo et intercostali una discissis nervis, vidit Cl. VIEVSSENIUS. Sed omnes et minimos, quos cor accipit ab intercostali et vago, nervos ligare nullus quum possit, relictis quibusdam liberis, facile perdurare potuit vita. Inde inedia pluresque aliae fuerunt adhuc mortis huius animalium causae.

p. 50. Tandem consensum partium in corpore animali in primis hic octavus nervus illustrat: quatenus autem idem rite et naturae convenienter debeat explicari, aut quatenus eodem alii abutantur in explicandis variis phaenomenis, intactum relinquens Cl. BRUNN, labori suo finem imponit, maiorem autem, id si inuestigare ipse aggrederetur, penes omnes, veritatis amantes, sibi conciliaturus gratiam.



VI.

Traité de la Goutte, dans lequel, après avoir fait connoître le caractère propre & les vraies causes de cette maladie, on indique les moyens les plus sûrs pour la bien traiter & la guérir radicalement. par Mr. CHARLES-LOVIS LIGER, Docteur-Regent de la Faculté de Medecine en l'Université de Paris. A Paris, Chez la Veuve Quillau, et Nully, 1753. In 12. plag. 16½. sine praefat.

i. e.

Tractatus de Arthritide, in quo, caractere proprio causisque huius morbi veris antea declaratis, certissima eum rite tractandi radicatusque curandi remedia indicantur. Auctore CAROLO LUDOVICO LIGER.

Dirum, diuturnum periculique plenum morbi genus, arthritidis nomine, mortales ab omni aequo adeo excruciauit, ut Cl. Auctori, ob hunc in se susceptum laborem, quo et veram eius causam mendendique methodum, parum antea cognitas, clariores reddere, firmiterque stabilire tentauit, non paruae debeantur grates. Totum vero opus in tres partes diuisum deprehendimus. In prima huius libri p. 1. parte systemata, quae praecipui scriptores, ut HIPPOCRATES, GALENVS, AETIVS, ALEXANDER TRALLIANVS, PARACELSVS, HELMONTIVS, SENNERTVS, FERNELIVS, SANCTORIVS, SYLVIVS et BOERHAAVIUS sibi de causa articularis morbi formarunt, in quatuor capitibus disquirunt, eademque omnia vel prorsus, vel ex parte tantum reiiicit. In parte secunda in quindecim capitibus causam huius morbi primariam disquisiuit et praedisponentes detegere seduloque describere studuit. Initium vero

vero fecit a morbi historia eiusque progressu, illam-
 p. 204. que in certas epochas distinxit. Tertia huius libri
 pars et praeservandi et curandi methodum variarum
 huius morbi specierum in quatuordecim capitibus tra-
 p. 370. dit. Sub finem tandem quaestionem medicam, an
 arthritidis sapor? anno quadragesimo septimo huius seculi,
 a Cl. Auctore Parisiis propositam, recudere curavit.
 Ratione igitur libri sic exposita, pauca quoque, ea-
 que praecipua nobis visa, cum lectoribus nostris
 communicabimus.

P. 54. Arthritis HIPPOCRATIS tempore extremitatum
 articulationes tantum inuasit; dolorosa quidem, neu-
 tiquam vero periculosa, nec lethifera, nec adeo fre-
 quens fuit. GALENI tempore ob maiorem homi-
 num intemperantiam iam longe frequentior observa-
 ta fuit. Infantes enim haereditario iure illam iam
 contraxere. Feminae quoque et eunuchi, antea im-
 munes, illa corripiebantur. *Regularis* adhuc iam
irregularis et periculosa facta fuit. GALENVS enim
 prima vice observavit, aegrum a retropulsione ab ex-
 tremis in pulmones subito suffocatum esse.
 Haec irregularitas suffocatioque, a retrogressa mate-
 ria, quarto quintoque seculo longe frequentior facta
 est, et seculo, post C. N. septimo, PAULI nimirum
 AEGINETAE tempore, hicce morbus non solum
 extremitatum, sed etiam trunci, costarum et maxil-
 lae inferioris articulationes inuasit. Humor quoque
 arthriticus, sua sponte et absque ulla per topicam re-
 percussione data occasione retrogressus, guttur,
 pulmones, hepar atque lienem male habuit, quarum
 prior *arthritidis vagae*, posterior vero nunc *sua*
sponte retrogressae nomine insignitur. In hisce tan-
 dem ultimis seculis duas adhuc species irregularis ar-
 thritidis detexerunt medentes, quarum una *indeter-*
minata appellatur, quia inuasionem in omnes corpo-
 ris nostri partes externas aequaliter minatur, altera
 vero

vero *irregularis proprie sic dicitur*, et haereditariae arthritidis folius fructus est.

Harum tamen omnium specierum causa tantum p. 62.
 unica deprehenditur, quae in continuato usu bene
 digestorum nutrientium ciborum potuumque pluri-
 mum mucilaginis seu potius viscerum continentium, et
 hinc in abundantia lymphae spissae seu viscidae con-
 sistit, a qua natura sese generatim per depurationis
 quandam speciem liberare conatur. Existencia huius p. 75.
 mucilaginis in humoribus non solum ex inspectione
 partium afflictarum in paroxysmo, sed etiam ex pul-
 su lento cognoscitur. Certissimum vero signum ex
 sanguine desumitur, quod in materia quadam albi-
 cantis coloris consistit, quae supernatat, et in pleu-
 ritide et pectoris defluxionibus educatae similis est, ex-
 cepto eo, quod non adeo firmiter cohaereat uti in
 plurimis harum posteriorum observatur. Hicce
 enim color a parte sanguinis fibrosa abundante oritur,
 quae ideo arctius cohaeret, quoniam viscositate qua-
 dam seu glutine illi alieno, ad modumque tactui sen-
 sibili, praedita est; quod phaenomenon non nisi in
 arthritide sola occurrit. Haec arthritidis causa ex eo
 quoque facile cognoscitur, quod ipsa in quibusdam
 provinciis *endemia* in aliis vero interdum *epidemica*
 deprehenditur. In Cenomania v. c., Normandia p. 82.
 Flandriaque, ubi *endemia* est, potulenta, et in prio-
 ribus quidem vini genera, ex pomis pyrisque confe-
 cta, in Flandria vero cerevisia, et in aliis tandem
 provinciis, ubi *endemice* grassatur, vina hunc mor-
 bum producant. Haec enim ob mucilaginem solam,
 et neutiquam ob salia, acidum, spiritus atque tarta-
 rum peccare, ex eo patet, quod vina burgundiaca,
 campana, hispanicaque hisce principiis maxime abun-
 dent, neminemque tamen iis utentem arthritide affi-
 ciant; cum e contra vina moschata et condriacensia
 pauculum horum principiorum contineant, et tamen
 facile arthritidem procurent.

Vinum

- p. 88. Vinum ex pomis confectum ad procreandam arthritidem aptissimum potus genus, dein cereuisiam, et tertio tandem loco, reliqua vina ponenda esse. Quo minus vero limpida et transparentia sunt, quo plus spumae generant ex uno vase in alterum effusa, quo fortiora sunt, et hinc quo plus mucilaginis in paruo volumine continent, eo quoque aptiora sunt ad generandam arthritidem. Ii tandem, qui ab hisce potibus abstinuerunt, et tamen arthritide laborant, talia certe alimenta solida amant, quae plurimum mucilaginis continent. Nutrientia enim amant, et alimenta eo plus nutriunt, quo plus mucilaginis continent, qualia sunt iuscula saturata et cibi per longam coctionem penitus dissoluti, nec non vegetabilia, aquosa sua parte, per artem culinariam, orbata, et in mucilaginem fere redacta. E contra vero alimenta et potulenta earum regionum, quae ab arthritide immunes sunt v. c. burgundia, campanaque, parum mucilaginis continent. Vina enim burgundiacae campanae, optima sane aptissimaque ad conseruandam restituendamque sanitatem, longe plus salis acidi et spirituum continent, quam reliqua vina. Ob abundantiam vero horum trium principiorum mucilago destruitur, et saponacei quid exinde producitur. Vina quoque burgundiacae saponaceae virtute gaudere ex eo satis elucescit, quod linteis albis inspersa, ea non maculent, sed maculas potius nouiter inductas eluant. Quodsi igitur in hisce provinciis, ab arthritide alias immunibus, hic morbus
- p. 96. interdum epidemice grassari deprehenditur, hoc tantum in annis non salubribus continget, in quibus uuae perfectam non acquisiuerunt maturitatem, et vina inde confecta plus mucilaginis, minus vero salis acidi, et spirituum continent. Haec mucilago vero in humoribus nostris praesens arthritidem non producit, nisi abundet. Semper enim adest in haereditaria, nec non in adquisita arthritide, paroxysmi tamen

tamen non excitantur, nisi abundet, naturaque sese per ipsum paroxysmum ab illa liberare sanguinemque depurare tentet.

Haec abundantia autem vel *vera* vel *spuria* est. p. 175.

Vera est quantitas materiae mucilaginosae in vasis contentae tanta, ut molecule in massa humorum amplius suspensae teneri nequeant. Haec vero rursus est vel *naturalis* vel *accidentalis*. *Naturalis* est abundantia mucilaginis solius in humoribus, atque unice a diaeta mucilaginosa dependet, primaeque arthritidis accessiones, simplices, longoque temporis interuallo demum redeunt illi tribuuntur. Quod si vero haec naturalis per aliquot annos persistit, tunc in *accidentalem* mutatur, in qua praeter humorem arthriticum simul quoque alii humores abundant.

Abundantia spuria vero a relaxatione nimia vasorum dependet, nec non ab immoderatis corporis exercitiis, vigiliis, ira, gaudio, a potu irregulari vini spirituosorumque producitur, et adesse cognoscitur, si paroxysmus aegrum vel ante consuetum tempus inuadit, vel si aeger unum tantum, vel duos decubitus (depots) experitur quatuor aut quinque alias in uno paroxysmo aduersus. Et licet veneris exercitium in p. 187. se spectatum innoxium sit, attamen cum praematurum et nimis frequens non solum corpus debilitet, sed cum ii etiam, qui huic nimium dediti sunt, ad corporis vires resarciendas, veneremque eo crebrius exercendam, nutrientium plerumque ciborum potuumque largiorem quantitatem assumere soleant; hinc forsitan non immerito dici posset, hanc, venerem scilicet, unicam causam esse, quae utramque abundantiam et veram et spuriam eodem tempore simul producere possit.

Vtraque vero haec abundantia vera et naturalis, p. 134. et spuria et accidentalis vasa ultra modum distendunt, hinc relaxantur vasa, et motus humorum fit languidior. Partes igitur mucilaginosae, in humoribus suspen-

suspensae, quae antea iam aegre propelli poterant, nunc magis quiescunt, et in vasis praecipue maioribus facile reuniuntur. Exinde vero formantur massae, quae sese non solum circulationi humorum opponunt, sed et relaxationem vasorum augent. Massae hinc longe maiores fiunt. Et dum natura summis conatibus illas diffringere, seseque ab illis liberare tentat, circulatio fit rapidior. Easdem vero in extremitates vasorum, in articulationibus occurrentium, praecipitare ibidemque deponere ideo cogitur, quia vires ipsi non suppetunt ad illas ulterius propellendas; et quia eodem momento, partim in spissitudine humoris, partim vero in nimis parua vasorum diametro, in quibus ille inclusus est, obstacula inuincibilia offendit. Hinc febris et irritatio et dolor. Resistentiae vero, quas natura offendit, illam incitant, ut reiteratis conaminibus illas superare tentet. Effectus vero sunt depositiones in glandulis synovialibus, cum quarum secretionem * arthriticum humorem maximam convenientiam habere asserit Cl. Auctor, et tumores articulorum magis magisque aucti. En modum quo natura in depurando sanguine et formanda accessione arthritica utitur.

p. 112. Eiusmodi *accessio* in uno tantum articulo contingens, quae iuuenibus plerumque euenit, *simplex* appellatur, quodsi vero in pluribus contingat, quod senibus admodum familiare est, tunc *composita*, et quidem plus vel minus composita audit, prout vel plures vel pauciores articulationes successiue occupat.

p. 114. Causae plurium accessionum et depositionum sunt 1) abundantia mucilaginis, 2) defectus capacitatis partium

* Arthriticos vero et podagricos dolores non in capsula articulorum, ubi nervi nulli sunt, sed in ipsa cute et in nervis ipsi subiectis sedem habere, ex experimentis in vivis animalibus institutis conclusit Illustr. ab HAL-
LER. Vid. Comment. regiae soc. scient. Goetting.
Tom. II. et Comment. nostr. Vol. II. P. IV. p. 697.

tium hanc recipientium et 3) insufficientia seu debilitas conaminum, quae natura in arthritide praecipue irregulari ad semetipsam subleuandam facit. Haec p. 117. *insufficientia* rursus vel *naturalis* est, ut in senibus, vel *accidentalis*, ut in iuuenibus, qui ad subleuandos dolores saepius reprimentia adhibent. Depositione igitur in articulis plenarie facta omnia mitigantur, depositaque materies ipsa sese vel per transpirationem dissipat, si fluida et parum crassa est, vel in sanguinem redit, si crassior est, quam quae per poros cutis dissipari queat, vel, si nimis crassa est, in articulis restat nodosque format. Facilitas quoque et p. 138. velocitas, quibus cum humor arthriticus locum mutare, prioremque antea occupatum prorsus derelinquere, seseque in alium conicere videtur, effectus sunt apparentis mobilitatis, cuius explicatio omnibus auctoribus multum molestiae creauit. Viscositas enim humoris arthritici, quam omnes concedunt, cum mobilitate singulari vix concilianda videtur. Duas vero mobilitatis species distinguit Cl. Auctor, *regularem* et *irregularem*. *Regularis* fit ex uno articulo in alterum omnique periculo vacat. *Irregularis* vel ex articulationibus in viscera migrat, et saepe lethalis est, vel ex viscere quodam in articulationes, omnique periculo non vacat, vel ex uno viscere in aliud viscus, quae ad modum rara est periculosissimaque deprehenditur.

Negat vero Cl. Auctor materiem semel in articulo vel viscere quodam depositam hinc egredi, seseque in alio articulo vel viscere deponere posse. Priorem enim tumorem in articulo persistere, et, quotiescunque apparens eiusmodi metastasis oriatur, non veram metastasin, sed nouam quandam esse depositionem ab abundante humore arthritico. Omnis quoque generis mobilitatem easdem, quas depositionem, causas agnoscere arguit. Hinc quoque est, quod, si in viscere quodam depositio completa et perfecta facta sit, ma-

teries in viscere isto deposita nunquam in articulos reuocari possit; quod si vero in viscere isto depositio incompleta contigerit, tunc reliquum materiei, adhuc cum sanguine circulantis, arte vel natura in articulos
 p. 155. expelli poterit. Et cum tres plerumque recenscantur arthritidis species 1) *frigida* nimirum, a spissitudine lymphae orta, quae cum paruo calore et dolore paucoque rubore coniuncta, *frigorisque impatiens* sit, cui temperamenta frigida pituitosa, subiecta esse dicuntur, 2) *calida*, quae lymphae acrimoniae adscribitur, *caloris impatiens*, temperamentis siccis biliosis propria, in qua interdum ne tumor quidem apparet, pars affecta vero longe calidior, dolorosior et plus minus rubra conspicitur, et dein 3) ex prioribus utrisque composita, *et frigoris et caloris impatiens*, in qua tumor admodum insignis, valde dolens valdeque inflammatus est, quae sanguineis temperamentis admodum familiaris, esse perhibetur; Cl. Auctor ostendit, has omnes non nisi unam speciem constituere et tantum arthritidis varietates esse. Omnes enim non solum in uno eodemque subiecto, sed in una quoque eademque accessione composita adesse saepius obseruantur.

p. 159. Mucilago tamen, harum omnium causa, mixtum est, ex admodum pauco oleo, multa terra, et longe copiosiore aquae aerisque quantitate compositum. Pro diuersa igitur horum ingredientium proportionem, mucilago quoque eodem modo variare potest, uti gummata plantarum, quibuscum arthriticum humorem admodum concinne comparat Cl. Auctor. Gummi enim unius arboris non solum a gummi alterius differt, sed in una quoque eademque arbore diuersitas gummatum obseruatur, alterum enim siccum, alterum liquidum adhuc deprehenditur. Mucilago igitur, in siccis biliosis hominibus, crassior terraque plurima referta, multum rarefiet, doloresque augebit, si calida externe applicaueris

caueris. In humidis vero pituitosisque hominibus, ubi eadem in paruo volumine multum aquae continet, et fere prorsus fluida est, tantum abest, ut calor externe applicatus dolores augeat, ut potius eosdem, diuidendo aquosas particulas, easdemque per poros cutis abigendo, admodum lenire possit: frigus vero externe applicatum, constringendo poros, et condensando aquam, distensionem vasorum, dolorumque vehementiam, continuo augere debet. Hanc quoque ob rationem arthritidis, cuius mucilago p. 166. admodum crassa est, largiorem tamen insimul aquae quantitatem continet, qualis in sanguineis hominibus haud raro deprehenditur, et frigoris et caloris impatiens esse potest. Mucilago quoque in uno eodemque subiecto variat, prout nimirum depuratio vel lente vel promte facta fuit. In priore enim casu massae maiores, in posteriore minores fient, et depositio exinde oriunda vel magis vel minus compacta solidaque euadet. Regimen quoque aegri ad hasce varietates multum conferre videtur. Nodop. 168. rum vero ex eius modi depositionibus in articulis formarum, qui nec a frigore nec a calore amplius afficiuntur, duae obseruantur species. Materies enim arthritica, aut aliquid adhuc mucilaginis retinet, et gummatibus extreme exsiccatis comparanda venit; aut adeo aquosa sua parte per diuturniorem moram in loco calido articulorum orbatur, ut ipsi nil nisi terra alba plus minus friabilis, plus minus levis, gypsoque saepius simillima restet, qualis ex gummatibus per diuturniorem exsiccationem, licet paulo difficilius, itidem obtineri potest.

In *tertia* tandem huius operis parte, *arthritidem* p. 205. *regularem* definiuit Cl. Auctor, quod sit *morbus periodicus articulationum cum febre plus minus forti, dolore caloreque in parte affecta plus minus magnis, seque per depositionem quandam seu diuersi voluminis tumorem, nunquam in suppurationem abeuntem, terminans.*

- p. 216. Certissimum eius signum est, si dolor post duas vel tres somni horas demum inuadit, sequentibusque diebus redit. Tres vero vulgo sic dictas species, utrum nimirum tumor frigoris, an caloris, an utriusque impatiens sit, sedulo obseruare oportet; aeger enim pro huius diuersitate diuersimode quoque tractandus est. Frigoris impatiens faciliorem curationem admittit. *Curatio* vero duplex est vel *accessio-*
p. 228. *num*, vel *morbi ipsius*. Venae sectio, quae quidem naturae operationem turbare potest, in primis tamen accessionibus, ab abundantia vera ortis, in feminis eidem adfuetis, et viris, in flore aetatis constitutis, reuulsionis scopo, in loco, a parte affecta remotissimo, necessario institui debet, atque pro febris, vigiliarum et dolorum ratione repeti quoque potest. Hanc quidem, eo plerumque in loco, ubi instituta est, noua insequitur depositio, sed parua et plerumque ultima, nec adeo periculosa est. Hinc si fieri potest, semper in sano pede, vel etiam in altero, ab arthritide parum affecto, instituenda erit, ut praeter alias utilitates, depositio quoque, venae sectionem insequens, in loco a corde maxime remoto fiat.
- p. 232. Vigiliae clysteribus simplicibus, vel ad summum emollientibus, et ptisana ex herba chamaepytios, chamaedryos, capillorum veneris cum pauco saccharo arceri possunt. Ventriculo tamen inter haec usu vini boni canariensis, burgundiaci vel campani cum
p. 236. pane tosto quotidie prospiciatur. Narcoticis, ob relaxationem, quam inducunt, insequensque dolorum augmentum caute utendum, iisdemque raro opus esse, recte iudicat Cl. Auctor. Theriacam tamen e reliquis huic scopo aptissimam esse censet. Quod si vero febris tandem cessauit, dolores imminuti sunt, somnusque rediit, tunc, ad accelerandam conualescentiam, primae viae, potione leni mannata, ter vel quater repetita, a deprauatis humoribus ex-
purgan-

purgandae sunt; licet enim et has euacuationes interdum quoque noua insequatur depositio, timeri tamen ideo non debet, quia semper regularis est; fortiora vero purgantia ad modum noxia sunt, seduloque tunc in primis vitari debent, si nodi antea caloris impatientes fuerunt. Reliquae secretiones, et p. 240. praecipue transpiratio insensibilis, optime promouentur, si circa finem accessionis drachm. iij vel iiii radicis chinae in libr. iij aquae simpl. ad remanentiam libr. ij. coquuntur atque ter de die largus eiusdem haustus assumitur. Vinum quoque huic decocto interponi vel misceri potest, in arthritide tamen caloris et frigoris impatiēte ante huius decocti usum ptisana per quatuordecim dies, et in arthritide, solius caloris impatiēte per mensem integrum aqua copiose potari debet. Praeterimus vero, ne nimis longi simus, reliquas a Cl. Auctore in curandis accessionibus, ab hac vel illa speciali causa determinante ortis, additas animaduersiones, utilesque cautelas practicas. Casum tamen, a Cl. Auctore adductum, eo lubentius adducimus, quo magis exinde elucescit, quantum damni ex topicorum usu, licet interdum etiam innocentissimus videatur, saepius oriri possit.

Robusto viro quadraginta sex circiter annorum, p. 260. temperamenti pituitosi, arthritidis, qua, cum nec inordinate nec intemperanter viueret, ab anno tamen aetatis tricesimo sexto regulari laborauerat, per taeso, facile persuadebatur, huncce morbum a pedum frigiditate, cui adeo obnoxius erat, ut etiam frigus per longam noctem sentiret, originem traxisse; hancque causam, morbumque ipsum facile destrui posse, si lecto lagenam stanneam calida repletam infereret, pedesque mediante ista moderate calidos seruaret. Arthriticus eius modi lagenam durante hyeme 1749 adhibens, nullam mense februario eiusdem anni ceu tempore alias ipsi consueto regularem arthritidis accessionem sensit. Vuula vero, basis

linguae omnesque internae ac posteriores oris partes sensum adeo intumesccebant, ut primo martii nec liquida nec solida deglutire posset, quin statim convulsionibus, diu admodum durantibus, corriperetur, id quod eum tandem eo adigebat, ut unciam tantum panis totidemque vini quotidie pro cibo potuque assumeret, quae viuendi vero ratio eum quam maxime emaciabat. Vsurpatum tamen remedium ipsi adeo innocens videbatur, ut die decimo quarto maii, quodemum accersebatur Cl. Auctor, ne suspicaretur quidem hunc morbum arthritidem irregularem et retrogressam esse.

p. 263. Dantur tamen externa remedia, quae tuto adhiberi possunt. Sic urina infantis, infra decem annos nati, moderate calida, anodyna resoluens et efficax est, si linteis eadem bene imbutis affecta pars obtegatur. Fortius remedium, in omnibus arthritidis speciebus conueniens, nec unquam nocens, sapo medicinalis albus est, cuius unciae 5 vel 6 in 7 vel 8 mensuris (pintes) aquae communis solui possunt. Pars affecta in eius modi balneum immergitur, cuius calor affusa calida pro aegri lubitu augeri minuique

p. 266. potest. Quodsi vero circumstantiae quaedam balnei usum prohibeant, tunc in arthritide frigoris impatiente cataplasma emolliens ita concedi potest, ut decoctioni tantum pauca minuta, anteaquam ab igne auferatur, sapo adiciatur. In arthritide vero caloris impatiente sapo unice in formam pastae redactus applicari potest; facile enim cum corpore quodam se ipso liquidiore pinguique v. g. butyro de Cacao, miscetur. Haec pasta super linteam extensa et parum calefacta adplicari atque bis de die durante accessione renouari potest. Tumoribus quoque, finita accessione, non prorsus dissipatis nodosque cuiuscunque generis formantibus topicum hoc chirotecis et tibialibus adaptatum noctu diuque, quoad eius fieri potest, superhaberi, atque usque ad eorum plenariam

riam euanescentiam continuari debet. Nullum enim nodum huic remedio resistere posse asserit Cl. Auctor.

Altera curationis pars, morbi nimirum ipsius, p. 269.
extra accessiones in eo consistit, ut vel abundantia tantum humoris arthritici exacto vitae regimine prae-
caueatur, vel causa morbi primaria penitus destrua-
tur. Lac in se spectatum nulla specifica virtute gau- p. 287.
det, nec ob multas butyraceas et mucilaginosas par-
tes huic scopo aptum remedium esse videtur. Iis,
qui parum comedunt, parum quoque vel nihil profi-
ciet, iis vero, qui multum edunt, maioris emolu-
menti esse, et generatim saltem per accidens eodem
modo, ut venae sectio, purgatioque iuuare poterit.
Ad destructionem vero humoris arthritici praestantis-
simum remedium est sapo medicinalis gallicus seu
alius quicumque ex oleo oliuarum, sale alcali et calce
viua paratus. Huius saponis drachmae semis, Rhabarb. p. 295.
Gentian. ana scrupuli semis et cum syrupo quodam
purgante in formam boli redacti usum, diu continua-
tum, mane et vesperi interpositis lenioribus laxanti-
bus suadet Cl. Auctor. Monet tamen, hoc reme-
dium in hominibus, morbo cutaneo affectis vel acri-
monia quadam seu scorbuto laborantibus caute usur-
pandum esse, et uno verbo nemini conducere, nisi
unice arthritide laborantibus. Arthritis indetermina- p. 305.
ta, in qua aeger non nisi in dorso cubare potest, et
fere immobilis iacet, regulari fere non est periculo-
sior. Venae sectio vero in hac prorsus non condu- p. 310.
cit, et topica omnia nocent.

In arthritide vaga in principio parti affectae lintea p. 315.
ad modum calida ideo applicanda sunt, quia calor
uni tantum parti applicatus repellit, pediluua quo-
que, calorem tamen hominis naturalem non multum
excedentia, applicari debent, et si respiratio ab affectis
articulationibus thoracis laesa est, theriaca exhiberi
potest. In arthritide, per accidens regressa, primo p. 329.
vena in pede secanda, dein statim alteri pedi vesica-

torium adplicandum, et paulo post aqua tepida butyracea seu oleosa, vel infusum theiforme ex carduo benedicto, quod in primis commendatur, ad vomitum excitandum, et post hanc euacuationem statim quidam haustus vini hispanici, canariensis etc. exhibendi sunt. Si vero ideo reuocari non potest, quia in viscere quodam depositio completa facta est, tunc humor arthriticus destruaturs lenibus laxantibus reiteratis, ptisana tenui, et deinde sapone ad gr. quindecim, viginti et tandem ad drachmam semissem, sed solus aliisque medicamentis nequaquam remixtus exhiberi debet, interpositis purgantibus lenioribus.

P. 338. Quodsi vero ex arthritide regressa angina orta est, tunc eadem per repercutientia tuto tractari potest 1) adplicetur pediluuium 2) dein celebretur venae sectio in pede, et statim, cum raro epispasticis opus sit, adhibeatur sequens gargarisma repercutiens R̄ Aq. destill. Peruinc. unc. V. kermes mineral. gran. iiij. Crysell. mineral. drach. ss. Aq. vitae spirituos. Syrup. moror. ana unc. j. M. cuius crebrior fortiorque gargarisatio conuenit, quotiescunque dolores in articulationibus sentiuntur. Quodsi vero humor in angina fixus est, non nimium huic gargarismati insisti debet.

P. 350 In arthritide sua sponte regressa 1) vomitorium lene et insipidum v. g. aqua tepida unica vice exhibeatur, adhibeatur pediluuium, dentur cordialia spirituosas, vina, parua sed repetita dosi; venae sectio et narcotica ob nimiam aegri debilitatem non conducunt. In

P. 359. arthritide irregulari proprie sic dicta, venae sectio raro iuuat, epispastica et vesicatoria nocent. Sed dignus est hic liber, qui ab omnibus legatur.



VII.

B. S. ALBINI academiarum annotationum Liber primus. Continet anatomica, physiologica, zoographica, phytographica. Leidae apud I. et H. Verbeek, 1754. 4. pl. 12. tab. aen. 7.

Et si neminem lateat, quanta sint magni ALBINI in anatomen merita et elegantissima, ad hanc doctrinam pertinentia opera, optime de iis testentur, quasdam tamen rationes sibi esse intellexit Cl. Auctor, quibus confirmet, quam exacto studio in omnibus iis proponendis usus fuerit, quae huc usque ab eo orbi litterario fuerunt communicata. Hanc suam itaque solertiam in praefatione, huic libro praemisso, uberiorius exposuit, ipsam autem pertractationem in viginti et unum caput diuisit. Sunt quidem inter has annotationes quaedam, quae, quum Cl. Auctoris discipuli alio iam tempore pro candore eius ab eo tradita, acceperint, plane nouae non videbuntur, quae tamen ab eo, cui inuentionem debemus, descriptae dum sunt, nec minus placebunt. Licet forte a scopo eius et pro sua dignitate tuenda plane alienum non fuisset, indicasse aliorum descriptiones, et eorum, qui ex eius eruditionis fonte haurire potuerint. Harum vero obseruationum praecipua indicabimus momenta.

Caput primum tradit quaedam de modis, quibus p. 16.
cuticula cum corpore reticulari de cute abscedit et feruida aquae usum prae reliquis commendat, reliquorumque modorum et in primis macerationis, non nunquam tamen non in uniuersum negligendae, incommoda recenset, simulque *capite secundo cognationem et distinctionem cuticulae et reticuli* p. 21. demonstrat, a qua hoc mollitiae sua discrepat, et colore in albis etiam hominibus discernendo. Huius reticuli *foucolae* p. 22.

- vaginulaeque, quibus papillae continentur, capite tertio* exponuntur, quae scilicet loco foraminum, quae sine demonstratione adesse supponuntur, observare licet, foveae ubique in reticulo, vaginulae autem, ubi, prout circa apices digitorum, papillae longiores existunt. Habet autem cuticula plicas ab extus depressas, intus eminentes, in quibus papillae etiam nullae sunt, et haec *incisuras cuticulae et cutis* efficiunt, quarum naturam *caput quartum* declarat. Verum, quod cutis et reticulum et cuticula arcte inter se nexa iunguntur, *usus* harum partium, de quo non nulla *caput quintum* explicat, in defendenda cute et temperando tactu conspicitur, ubi simul docet Cl. Auctor, se ex tenerrimis embryonibus volae plantaeque cuticulam per se crassiorem inuenisse, ut hanc mutationem ab attritu aliisque causis, eam densantibus, deriuare non liceat. Ad alia progrediens *capite sexto*, num *urachus* in aetate proVectioribus adultisque hominibus *peruius* sit, disquirat et copiosis aliorum testimoniis, tum etiam sua ipsius experientia comprobat, urachum in iuvene adhuc peruium esse. Vascula vero, membranam, quae crystallinum humorem circumdat, penetrantia, a RVYSCHIO in
- p. 25.
- p. 28.
- p. 31.
- p. 33.
- oue visa, in homine pariter detexit et *capite septimo* describit. A retinae vasis oriebatur truncus, ante ingressum in membranam lentis non ramosus, mox in copiosiores ramulos diuisus, qui omnem ambitum capsulae inuestiebant, quosque in icone depingi curavit, nec non copiosissima haec vascula vitiorum forte sedem in oculorum morbis constituere posse conicit Cl. Auctor. In *sequente capite vero membranam, pupillam infantis, nuper nati, occludentem*, describit, eamque, quae a recentioribus dissectoribus ante hunc librum editum pluries confirmata est*, ante viginti quinque

* Descripsit eandem, prima eius inuentione Cl. WACHENDORFFIUS in *Commerc. litter. Noric.*

quinque annos, a se obseruatam iam iam fuisse asse-
rit. In *nono* dein *capite* in anu decrepita *cordis fora* p. 34.
men ouale apertum et cum aetate, conueniente pro-
portione, auctum fuisse docet. Quas porro olim
in uteri placenta demonstraerat arterias, nunc alio
exemplo confirmatas accepit easque ex utero in pla-
centam abire vidit, sanguineque repletas adhuc inue-
nit; licet inde conficere nolit, an verus sanguis em-
bryoni tradatur necne. Haec in *capite decimo* descri-
buntur, quam considerationem tanti momenti esse
iudicat Cl. Auctor, ut in partu iuuando instruat eum,
qui placentam, ex parte auulsam, ex haemorrhagia
uteri, letali postmodum futura, perspexerit, siqui-
dem tunc auulsa placenta uteroque contracto sponte
omnia praecaueri possint mala. *Vndecimum caput* ex p. 37.
ponit sinuum frontaliū conformationem, quos, tum
in iis, quibus frontis os futura diuisum est, tum in
iis, quibus sima est facies et depressa, deficere credi-
derunt anatomici, quorum tamen vestigia et praesen-
tia confirmata fuit in eiusmodi subiectis. Varia ad
cerebrum et piam matrem spectantia momenta obser-
uata explicantur in *capite duodecimo*, ad quae icones p. 39.
etiam pertinent tabulae secundae. Cortex contegit
medullam ubique, etiam in fulcis, in quos descendit
pia mater et undatim sinuosa est; arteriae eius maio-
res per angulos, a sinubus factos, decurrunt et in
copiosissimos innumerabiles et breues ramusculos, in-
tus deriuatos, abeunt, et piam matrem quasi villo-
sam reddunt. Impleti si fuerint materie conuenienti,
rubrae lanuginis instar comparent et per corticem ad
medullam pertingunt, in eaque disseminantur. Re-
futatur tamen BOERHAAVII sententia, nec non ea,
quae ex arteriolarum harum ad medullam progressu
deducitur, opinio, ac si ea propter medulla ex his
vasis

- vasis constare debeat. Etenim eius substantia multum discrepat, in qua nihil sit, quod possit euincere, ut putat Ill. Auctor, humorem quendam secretum per neruorum canaliculos ferri, quum in ea re multa supersit obscuritas. Simul autem eam tangit, quae de actione musculari agitur, controuersiam, vasorum nimirum, sanguinem vehentium atque neruorum ad eam requiri mutuam actionem: quam ex compressis ligatisque vel aliter adfectis hisce vasis deducunt, quum nihil tamen probet, nisi hoc, sic adfectis hisce partibus motum musculorum cessare. Venas deinde corticis se adnotasse testatur Cl. Auctor, praeter arterias, quas R V Y S C H I V S, cuius simul de hac parte datas figuras passim taxat, solas corticem efficere credebat, nec a vero abesse arbitratur, alias etiam praeter has, quae impletione facta vasculorum sub forma non comparent, et maceratione perduntur, adesse partes. *Dentium aberrationes decimum tertium caput* demonstrat, earundemque tres diuersas varietates adducit atque delineat. Prima exhibet dentes duos incisivos, in ossibus maxillaribus superioribus positos: altera vero longius aberrantem in eodem osse prope nexum cum palati osse dentem offert: tertia tandem, magis adhuc miranda, dentes duos inter nasum et orbitam, in nasali ossis maxillaris processu delitescentes, describit; praeter hos tamen aderant canini solito loco, sed breuiiores et minores. Simile fere et nos exemplum vidimus, in quo tamen paulo profundius et ad mediam commissuram ossium maxillae incisores dentes positi fuerant. *Papillae linguae humanae*, prout aliorum animantium constantiori ratione *differentes* sunt, quas descriptas
- P. 55. legimus capite *decimo quarto*. Quatuor earum genera sunt, aliae magnae ad radicem linguae ante foramen coecum, quae parte sua gracili inhaerent, crassiore eminent ex lingua, aliae fungiformes seu mediae magnitudinis, inter se tamen magnitudine quoque discre-

discrepantes, ante priores positaе, in extrema lingua
 copiosiores: aliae porro minores, arcuatae a R V Y-
 SCHIO dictae, in superna parte linguae copiosiores
 haerent, itidem magnitudine et forma discrepant:
 tandem aliae minimae, tuberculorum rotundorum
 formam referentes, in incisuris linguae copiosiores.
 His omnibus accedit quartum genus, quod in poste-
 riore parte laterum linguae, rugarum transuersarum
 instar, continetur. In diuersis tamen subiectis mul-
 tis variant modis. Harum autem fabricam ulterius
 persequitur Cl. Auctor *capite sequenti* et in eo omnis p. 59.
 est, ut declaret, eas non solas neruosae propaginis
 esse, sed arterias etiam atque venas eas simul consti-
 tuere. Inuenit nimirum ad papillas accedere fascicu-
 lum staminum, inter se coniunctorum et ad finem
 papillae in tuberculum coeuntium, quorum etiam
 icones tabula prima suppeditat. Has in linguis,
 quarum arteriae repletae fuerant, aequae ac in iis, in
 quibus vasa vacua disquirebantur, detexit, varietates-
 que conformationis adnotauit. Non impletis vasis
 albae sunt mollesque, impletis autem rubrae, inter
 quae tamen vasa forte et venae continentur. Per
 mediam papillam unum maiusque vas transit ad eius
 extremitatem usque, quod, an patulum sit, dici ne-
 quit. Probabile id videtur ex facili post deterfam
 linguam redeunte humectatione. Materies autem
 alba, vasculis circumfusa, cutis linguae continuatio
 est; medullam enim neruosam non esse, repugnant
 macerationis phaenomena, quum nec tabescat, nec
 dissoluatur; neruos accedere interim negandum non
 est. Estne autem in lingua *periglottis et reticulare*, a
 MALPIGHIO dictum corpus, de hac re capite deci- p. 64.
mo sexto dispicitur. Statuit itaque, Cl. Auctor, licet
 hoc Cl. HEISTERVS affirmauerit olim, corpus reti-
 culare in lingua humana non inueniri, eique tamen
 integumentum, cuticulae simile, quod toti superin-
 ducitur linguae, albescat et pertinaciter inhaereat,
 datum

datum esse. Ad internam eius superficiem, substantia, reticulo similis, adhaeret, quae vaginulis suis papillas comprehendit, et, quod in interstitiis papillarum crassior est, ac in fundo, ut papillae emineant, efficit. Ex his conditionibus tamen *gustus et tactus organorum similitudo et dissimilitudo* noscitur, quam caput

- p. 67. *decimum septimum* expendit: quae vero non tantum in eo consistit, ut periglottis sapida facile imbibat, cuticula non item, sed in papillarum etiam diuersitate posita esse videtur. Praecipue periglottis mollior
- p. 68. est. Porro capite *decimo octauo* disserit Cl. Auctor *de vasis placentae paruulorum embryonum et de inuolucro, quo elisa eorum oua reconduntur*. Soluta illa vasa sunt, rami scilicet inter se non implicantur, sed distincti decurrunt, immo quidam ex his, a reliquis distantes, quasi aberrant, et cum incremento placentae tantum compingi obseruantur. Interim praeternaturalis etiam in iis status occurrit, per interual-
la nimirum haec vasa contrahuntur amplianturue, ut hydatides fiant, nec non in fine vasculorum non nullorum vesiculae animaduersae fuerunt, quas quidem conditiones elegans addita figura exprimit. Vasa tandem haec contegit inuolucrum crassitie discrepans, quod pro coagulato sanguine, qui inde reprehenditur, assumerat R V Y S C H I V S et quod idem credit esse Noster, quod in maturis ouis, cuius delineationem in tabulis uteri muliebris grauidi dederat, obseruatur.
- p. 71. Subiecit itaque in *sequenti capite non nulla de embryonibus humanis ouisque, quibus continentur*. Nitidae sane icones propositam illustrant descriptionem, praeter inuolucra chorii et amnios, umbilicus in conspectum venit, membranis oui continuatus, et vagina chorii inuoluta vasa comprehendens, quae placentam vario decursu efformant. Amnios saepe ad umbilicum non desinit, sed ante, a chorio recedens, infundibulum constituit, quod ad umbilicum quandoque in embryonibus perpusillis et
ad

ad ventrem usque pertingit. Nam umbilicalis funiculi in uniuersum est aliqua diuersitas. Filum album a ventre embryonis per umbilicum decurrit, et in vesiculam intumescit, liquido plenam, quae allantoidem fingit, veram tamen nunquam inuenit Cl. Auctor. Partes deinde in embryone minuto obseruandae describuntur et obseruatio simul additur maturi foetus, cuius umbilicalis funiculus per herniam omnem fere intestinorum canalem suscepit, breui post mortui. Quae supersunt capita, botanica tractant et *viceſimum* quidem, *pennam marinam albam* p. 77. et *rubentem* describit, de alba RONDELETIVS, de rubra GESNERVS retulit, utriusque iconem suppeditauit Noster. Haec alba minor est, utraque adiunctam inferius partem, glandi penis assimilata, ostendit, caulis in brachia abit, quae denticulata, immo horrida aculeis sunt, et striis interdistingta. Ultimo tandem loco, *capite viceſimo primo Clematidis* p. 79. *Floridensis*, *flore albo odoratissimo*, quoad omnes partes exprimitur, cuius etiam icon additur, quae tamen nisi odorem, quem prae se ferre dicitur, excipias, parum vel nihil discrepare ab illa vulgari specie, quae caule volubili et flore albo instruitur, putamus.

VIII.

B. SIEGFRIED ALBINI tabulae ossium humanorum Leidae apud I. et H. Verbeek Bibliop. 1753. fol. max. tab. 34. et totidem sciagraphiam exhibentes.

Denuo perindustrii Auctoris famam, nouo specimine nobilitatam, indicamus, quod, et ea, quae adhibita est, accurata opera et pretio carum, omnibus sese commendat. Postquam totam emensus est ossium doctrinam, describendo eorum singulorum, tum in adulto homine, tum in foetu praecipua

pua momenta; postquam porro sceleti humani dedit delineationem subtilem et naturae convenientem, id supererat, ut ossium etiam singulorum proponeret figuras, tales tamen, quae in naturali magnitudine simul demonstrarent, quae ad unumquodque eorum rite intelligendum pertinent. Ipse etiam monet Cl. Auctor, se in singulis optimo naturae exemplo usum fuisse speciminibus, nihilque praetermisisse eorum, ad quae attendendum est anatomico, quum in reliquorum, a dissectoribus datis, iconibus saepe musculorum, ligamentorum aliarumque partium annexarum sedes neglectae, aut studiose additae non fuerint. Haec autem Cl. Auctoris singularis fere cognitio, quae artificis direxit scientiam, ita scite curavit, ut obseruentur in omnibus partibus, ut ex iconibus hisce, anatomes etiam ignarus, veram sibi comparare possit earum notitiam, quamvis id inde nolimus cogere, elegantius semper naturam consulere non esse atque praestantius. Initium facit enumerandi ossa a capite, a quo deinde ad reliqua progreditur, omnium; tum, si plura in uno membro inter se cohaerent, ossium, tum singulorum, prout in sceleti expositione factum est, delineationes ab anteriore, posteriore et laterali parte exhibens. Brevis est singulae tabulae, lineas tantum circum scribentes figurarum exprimenti, additus indiculus, qui inscriptas figuris litteras explicet. Omnia quidem subtilissima momenta sigillatim simul non exprimuntur, nihil autem neglectum fuisse, quod adnotandum esse videbatur,prehendent ii, qui cum historia ossium Ill. Auctoris conferre voluerint hic exposita. Capitis praecipue variae sectiones in pluribus tabulis proponuntur, singulae tum lineares, quas vocant, tum umbra distinctas delineationes sistunt.

Liceat de his quaedam adducere, ut pateat, quaratione suam expleuerit voluntatem Cl. Auctor. Ossa capitis nimirum in sex tabulis exhibentur, quarum

prima

prima integrum illud a parte anteriore, posteriore lateralique visum sistit, *altera* cranii inferiorem, nec non maxillae superiorem et inferiorem faciem, *tertia* cranii interiorem superficiem et basin, nec non ad verticem factam totius capitis, adhuc cohaerentis, sectionem, declarat. Sed quum probe intelligeret Cl. Auctor, et his sufficienter omnium ossium tam diuersorum indolem nondum perspicere, dissectorum et solutorum a nexu ossium in sequentibus tabulis figurae adduntur. In his, ut eo melius succurreret eorum, qui uti his tabulis velint, studio, quae ratione diuersae sectiones se excipiant, simul indicatur, nexumque singulorum designantur, inter quae ossis temporum externae etiam superficiei notae sunt, internam autem organi auditus fabricam addere non libuit Cl. Auctori: ossa tamen faciei et hyoides simul comprehenduntur.

Ab his ad truncum sceleti progreditur Cl. Auctor, pro ea, quam in expositione de ossibus corporis humani sequutus est, norma, incipiendo a spina; exponit itaque tabula *septima* os sacrum atque coccygem, *octaua* syntaxin vertebrarum lumbarium, *nona* earum dorso, *decima* colli, quarum singularum, quod communes quaedam sunt et conformes sibi conuenientiae, in linearibus delineationibus unicam ex his, in iis, quibus umbra accessit, omnium cohaerentium figuras offert, quarum, conferendo inter se quamcunque, discrimina eo facilius perspiciuntur. *Vndecima* ad *decimam quartam* pectori dicatae sunt, primo costarum, deinde sterni figuras, earumque triplicem faciem monstrant. *Decima quinta* clauiculae sinistrae formas, *sexta* scapulam, *septima* humeri, *octaua* ulnae, *nona* radii, *vicesima* porro carpi ossicula, distincta et quidem ab interiore, exteriori, posteriore, priore, inferiore, superioreque facie, *vicesima prima* metacarpi, et *secunda* tandem singulorum digitorum phalangas cum ossium sesamoideorum recensio-

ne eadem ratione exprimit. Cuncta ab extremitate sinistri lateris sunt desumpta.

His peractis in subsequenter tabulis extremitates illustrantur inferiores, initium fit in tabula *vicecima tertia* ab ossibus coxarum. Sequitur in *quarta* os femoris a priore, in *quinta* ab interno latere, in *sexta* tibia a priore, in *septima* eadem ab interno latere, adiunguntur his patellae icones, quas excipit in *octava* fibulae delineatio, in *nona* deinde adduntur separata ossa tarfi pro diuersis scilicet, quibus inuicem uniuntur, superficiebus. *Tricesima* metatarsi ossa singula exhibet, quibus finem imponunt in *tricesima prima* ossiculorum, quae digitos pedis efficiunt, delineationes. Appendicis instar autem in *duabus sequentibus* tabulis pedis integri, ab interno latere aequè ac externo, superiore et inferiore visi, cohaerentium adhuc ossium figurae accedunt, quippe in quibus variae adhaerentium etiam musculorum sedes sunt attendendae. Vltima tandem, seu *tricesima quarta* tum calcanei cum talo coniunctionem, tum metacarpi cum carpo, et huius serierum compositionem inter se sistit. De singulis, quum non possit, quicquid in specie praestitum fuerit, hic exponi, desideratum hoc opus breuiter indicasse sufficiet.

IX.

Tentamen Herpetologiae. Auctore IACOB. THEOD. KLEINIO cum perpetuo commentario. Accessit I. A. VNZERII obseruatio de taeniis, latine reddita, cum dubiis circa eandem. Leidae et Gottingae apud Eliam Luzac. 1755. 4. mai. pl. 10. tab. aen. 2.

Quam olim de edendo hoc libro conceperamus spem*, nunc a Cl. Auctore sedulo impletam fuisse laetamur, quippe quum animalium dispositio-

nem

* Vid. Comment. nostr. Vol. III. P. II. p. 290 seq.

nem methodicam magis reddidit magisque completam. Retinuit autem, quam indicato iam loco exposuimus, sciagraphiam, paucis tantum mutatam, ubique commentariis et dilucidationibus additis locupletatam.

Herpetorum naturam illustraturus, primo eadem in genere considerat, hocque vocabulo denotat *ani-p. i.*
mantia apeda, corpore elongato, quae volutim et flexuose loco in alium mouentur, et sinuosa quiescunt.
 Haec in duos secedunt ordines, in angues nimirum et vermes. *Anguis Nostro est animal herpetum sanguineum, transformationi non obnoxium,* quorum capita aequae ac caudae differunt, et classes constituunt. *Prima eos complectitur, quibus caput discretum est, P. 5.*
et cauda decrescit; caput nempe a reliquo corpore in his facile, figura discrepans, distinguitur et cauda ex latiori sua forma sensim attenuata acutaque redditur. Generibus huius classis formandis deinde inserunt dentes, qui vel manifesti exseruntur, vel intus delitescunt, vel plane defunt. Primum genus, dentes, anticos caninos, longissimos, mobiles ostendit, vocatur *κυνόδον*. Pertinet autem huc primo *Vipera*. Plerumque consuevit viperarum nota generica a viuo desumi partu, de quo tamen semper certi esse non possumus; suadet itaque Cl. Auctor, aliam quandam notam constantiorem quaerendam esse, ex qua possit naturale genus formari. Quam in dentibus solis inueniri sufficienter monstrat; *ex his autem bini ma-p. ii.*
iores non in ipsa maxilla, sed in fortibus tunicis emissilibus defigi et tanquam in vagina recondi, usque dum ad mordendum inservire debeant, denuo experientia confirmat. Sed, dum eos non prostantes ab auctoribus pingi putet, nos eosdem tales a SEVERINO * proponi meminimus. Interim in dissecto viperæ capite nullos vidit studiose inquirens Auctor, detexit

Gg 2

vero

* Vid. MARC. AVREL. SEVERINI *Vipera Pythia*. Patav. 1651. 4. Part. II. cap. 2. p. 297.

- vero duo corpuseula oblonga, palato appressa, tanquam loculos, in quibus canini dentes delitescabant, *mobiles, albissimi, diaphani, ginglymos in maxilla habentes*, ad quorum basin orificium occurrebat, tenuissimam setam porcinam admittens, in canalem, ad apicem dentium usque procedentem, continuatum. Vaginam hanc Noster cum processu mamillari comparat, eiusque praesentiam indubium viperae signum suppeditare credit, quae si retrahitur, erigit dentes et ad morsum faciendum aptos reddit. Huius generis porro triginta et sex species adducuntur, quae maximam partem a CATESBY et SEBA descriptae sunt. Secundo loco ad hoc genus refertur *Caudifona*, quae ab omnibus anguibus crepitaculo seu tintinnabulo differt, in exitu caudae constituto, cui etiam quotannis articulus accedere fertur. Harum octo species enumerantur, inter quas Americana dentes exsertos caninos fortiores habere dicitur.
- p. 16. Tercium locum occupat *Conspicillaris*, venenatissima bestia, quarum duodecim species notatae occurrunt. Aliam porro subdivisionem huius generis faciunt dentes pectinati, qui, quod Lucii piscis et Crocodili similes sunt dentibus, a Cl. Auctore *ἰχθυοδόντες* vocantur; viginti et duae earum species sunt, veneni virulentia inter se differentes. Ex his periculosissima est vipera, *Argus* dicta. Quaedam ex his tantam consequuntur magnitudinem, ut integrum bubulum comprimendo suffocare valeant, et CLEYERVS in Ephem. Nat. Curios. refert, se vidisse extractum ex ventriculo eius modi anguis ceruum integrum mediae aetatis, ex alio sylvestrem caprum bene cornutum, et denuo ex alio, hystricem cum aculeis.
- p. 23. Alterum genus, ex dentibus determinatum, dentibus acicularibus, umbrosis vel occultis angues complectitur, quibus *Αυγαίοδον* seu *Coluber* nomen est. Ea namque, quae ex miti et innocua natura desumuntur, differentia et denominationis ratio parum valere poterit.

poterit, dummodo dentes habeant acutos, vel ex-
fertos, vel in gingiua latitantes. Copiosissimus ho-
rum catalogus est, enumerantur namque eorum cen-
tum et sexaginta quinque, quorum plerique diuersi-
tate colorum ludunt, et virulentia multum discrepant.
Inter alios huc pertinet Ceraſtes et Caecilia. Num
vero coloris ratio nullam patiatur varietatem, ut ille
constantiore, ac squamarum numerus, ad quem
praecipue attendendum esse credidit Cl. LINNAE-
us, characterem suppeditet, utique putamus in-
quisitione necessarium esse, in primis, quum et hic, si,
prout fieri debet, eorum in museis fiat conseruatio,
ille non videatur ab immutatione immunis esse.

Tertium huius ordinis genus *ἀνέδους* seu edentu- p. 43.
los sistit, in quibus nimirum nulli obseruati sunt den-
tes, incompletam tamen hanc classem, quae quin-
que tantum species recenset, se proposuisse fatetur.
Cl. Auctor, omnibusque, angues disquisituros, ut
ora studiosius perlustrent, commendat. Hinc etiam
est, ut spicilegium colubrorum CATESBY et LIN-
CKII additum sit, eorum scilicet, de quibus, num
dentes habeant, nec ne, parum constat. Siquidem
et plura fabulosa apud diuersos occurrunt scriptores
de serpentibus, draconibus, ut sese extricare vix genu-
inus possit naturae indagator. Huc refertur itaque
serpens siue lacertus monstrosus, a IOBO LVDOL-
PHO descriptus, duobus pedibus lacertinis, quem
Tabula prima huic operi addita, delineatum sistit.

Altera huius ordinis classis *angues* sistit *capite in-* p. 51.
discreto, cauda quasi truncata. Caput cum reliquo
corpore sic cohaeret, ut difficulter discernatur, cauda
vero circa finem ita rotundata apparet, ut pro capite
etiam possit haberi. In duo diuiditur illa genera, in
scytalem nempe et *amphisbaenam*. Scytale caudam
habet prae capite rotundatam, eiusque septendecim
species sunt, amphisbaena vero caput caudamque du-
biam offert, quarum quindecim species descriptas in-

uenit Cl. Auctor, eleganter a natura coloribus pictas atque variantes. Horum venenati morsus non aequae ac praecedentium celeriter nocent, sed inflammatione sensim facta, tempus applicandi et opponendi efficacia remedia relinquunt.

p. 58.

Accedimus ad alterum herpetologiae ordinem, qui de vermibus exponit. Est autem Nostro *vermis animal herpetum, exsanguis, transformationi non obnoxium, cute nuda, spina carens, non nisi gustum et tactum habens, trachaeis in musculis praeditum*. An tres secedit classes, in *lumbricum, taeniam et hirudinem*. Lumbricum teretem vocat vermem Noster, corpore vel annulato, vel laeui aut laeuissimo, cuius ulteriora genera a loco, quem inhabitare solent, definiuntur. Est itaque horum alius *terrestris*, qui in aqua degere non potest: Quatuor illorum recenset Noster, eosque a caudae figura et fascia in dorso praesente & absente distinguit. Alium deprehendimus esse *aquaticum*, qui in terra vel sicco non subsistit, in quibus magnitudo et crassities differentiam constituit. Refertur huc *Gordius* Cl. LINNAEI, cuius in filiformi corpore elegantes motus descripti leguntur. Tandem lumbricus est *animalium*, qui corpus habet teres et in partibus animalium habitat. In rene lupi inuentum similem vermem, olim cum societate Anglicana communicatum, descriptum et delineatum dederat Cl. Auctor, cuius icones nunc perfectiores iterum proponit, simulque internam eorum fabricam, per sectionem noscendam, exponit, in

p. 64.

Tab. II. Ab his discrepat *Taenia*, in classe secunda descripta, quae vermis articulatus est, et *Hirudo*, classem tertiam efficiens, qui vermis est aquaticus, ventre sessili, cauda tereti, annulatus. Illa, quae medicinae loco adhibetur, species, in fundo oris carunculas dentiformes, maiores, acutas, latas et albas, molles habet.

Obser-

Observatio Cl. I. A. VNZERI de taeniis ex promptuario Hamburgensi defumta est *, et ad calcem libri accedit. Putat nimirum ille, taenias, a femina excretas, per aquam putealem haustam ingurgitatas et enutritas fuisse, idque ea propter, quod a potu aquae dum abstinuit femina, a taeniis etiam liberata fuit, simulque monet, teretes intestinorum vermes cum lumbricis terrestribus accuratissime convenire. Huic itaque opinioni varia, quae hic modeste declarat, opposuit dubia Cl. Auctor. Non enim definire audeat, omnium auctorum eam esse sententiam, vermes teretes ac lumbricos terrestres esse eosdem, quippe qui structura corporum, cinguli seu fasciae in dorso et annulorum absentia, nec non aliis conditionibus ab illis distinguuntur **. Porro ea de quaestione movet dubitationem, num lumbricorum terrestrium ova vel cum aqua hauriri, vel hausta in corpore animali possint enutrir. Id, quod iterum negat Noster, quoniam calorem ferre nequeunt terrestres lumbrici, quo destituti intestinales pereunt: quoniam ouula etiam forma externa utriusque vermis differunt: quoniam aquam fugiunt terrestres, in qua intestinales degunt. Filiformis etiam vermis, quem *Gordium* Cl. LINNAEVS nominat, quemque ore haustum Nigritarum morbos varios excitare adserunt, in intestinis non commoratur, sed per corpus vagando in lumbis, pedibus, brachiisque exitum quaerit, ut longe probabilius sit, per poros cutis eundem sese infinuasse, per easdem autem vias iterum aufugere tentasse. De taeniis tandem, quod rarissime extra corpus inveniuntur, longe obscurior est sententia. Quae quum

Gg 4 ita

* Conf. huius promptuarii To. VIII. Part. III. no. 6. pag. 312. et Comment. nostr. Vol. II. P. I. p. 66.

** Conf. quae hac de re eleganter docuit GVALTH. VAN DOEVEREN in diss. de vermibus intestinalibus hominum. Lugd. Batav. 1753. 4. vid. Comment. nostr. Vol. III. P. III. p. 449.

ita sint, flamina quaedam verminosa in hominibus praesupponenda esse putat Cl. Auctor, licet in omnibus non euirescant, quum nulla fere internarum partium sit, quae aliquando vermibus obfessa deprehensa non fuerit. Verum et haec, a variis defensa, opinio, difficultatibus non caret.

X.

Hamburgisches Magazin oder gesammlete Schriften, aus der Naturforschung und den angenehmen Wissenschaften überhaupt. Dreyzehnter und vierzehnter Band. Hamburg und Leipzig, bey G. C. Grund, und A. H. Holle. 1754 und 1755. 8. Dreyzehnter Band 1 Alph. 19 Bog. 1 Kupf. Vierzehnter Band 1 Alph. 19 Bog. 2 Kupf.

Hoc est:

Promptuarium Hamburgense siue collectio scriptorum, ex scientia naturali et humanioribus litteris depromptorum. Vol. XIII. et XIV.

P. 3. **P**art. I. no. 1. Itali cuiusdam epistola *de morsu tarantulae*, ex diario anglico, *the Gentleman's Magazine for sept. 1753.* translata est a Cl. CHRISTLOB MYLIO.

P. 9. No. 2. THEOD. THORKELLI WIDALINI, olim Rectoris Scholae Skalholtensis, *de montibus Islandiae crystallinis tractationem* e latino sermone vertit notisque illustravit affinis Auctoris, WIDALINVS, iam Lipsiae degens litterarum gratia. Cl. Auctor vero, de nomine horum montium in patria lingua eiusque derivatione, vocant eos *Jökull*, non nulla primum ubi exposuit, montes suos aggreditur propius, atque sub iisdem illam hic intelligi vult glaciei molem, quae in plano Islandiae agro sponte orta, crescen-

crecendo sensim summorum montium adaequat altitudinem, duraturam per aeuum. In orientali in primis Islandiae regione, huiusque in agro *Skaptafells-sysla*, inter alios montes, tali haud cinctos glacie, arenosa occupant crySTALLINI montes loca, seseque ad quinque milliaria quoad longitudinem diffundunt, latitudine ob immanes atque haud peruios recessus nondum definita. Quicquid enim medios inter montes perhibetur visum fuisse, multum redolet fabulas. Iam si quaeritur, unde tanta glaciei moles trahat p. 20. originem, eam quidem a niue, omnem per annum montium inuestiente cacumina, plurimi deriuare solent, multis tamen argumentis fieri prorsus non posse euincit Cl. WIDALIN, ut e niue, haud soluta prius, nascatur glacies. Plura post haec.

No. 3. *Epistola de fructuum Hippocastani ad saginanda pecora praeparandorum modo*, ex diario, *Journal oeconomique octobr. 1751*. huc transumpta est. p. 28.

No. 4. C. S. M. *disquisitio de particulis martialibus in sanguine*; per experimenta chemica demonstratis, addito *circa ferri in coeruleo colore praesentiam experimento*. p. 31. Coeruleum illud prussicum, dum inuentum erat, multorum ad se traxit oculos et attentionem, iam ubi detectae cognitaeque fuerunt partes, eam constituentes, sanguis nempe, tartarus et nitrum, igne inuicem iunctae, acidis praecipitatae iterum; cui tamen ex his tribus causa coloris attribui debeat, dubia res est. Sanguini vero in primis competere hanc tingendi vim quum crederet Noster, varia cum illo instituit experimenta, eorumque iam exponit ingenue summam. Sanguinis bubuli exsiccati duas partes cum aequalibus nitri puri carbonumque pulueris sufficiente quantitate commiscuit, igne fudit valido, donec alcalesceret, et tunc remouit, ut refrigeret. Post varia, cum ita parato lixiuio facta, tentamina, quae hic filemus, ad rem nostram parum spectantia, quum ipsi lixiuio adfunderet spiritum nitri,

tri, mox fundum petiit praecipitatus crocus; liquor reliquus post euaporationem reddidit nitrum: crocum et aqua fortis soluit plenarie, et magnes auide attrahit; solutus ille acetō saporem linguae imprimit stypticum vitriolicum; idem post euaporationem dat vitriolum viride martis, quod nigro colore tingit gal-
 larum solutionem. Porro croco suo addidit Noster phlogiston et igne fudit, fustumque malleo subiecit; a quo quidem se non patitur tūdi, friabilis nimis, a magnete tamen trahitur. Croci ex duabus libris sanguinis bubuli obtinuit drachmas duas cum semisse et grana tria, ex aequali sanguinis humani quantitate drachmas tres, et grana quindecim. En! itaque fer-
 rum in sanguine! en illud causam coloris quoque coerulei! Vt autem demonstret Cl. Auctor, ferrum inesse coeruleo pigmento, aliud exponit experimen-
 tum. Limaturae martis, subtilissime contusae, un-
 ciam unam, nitri uncias sex, sulphuris aliquantum, carbonumque pulueris sufficientem quantitatem inui-
 cem immisit in crucibulum, igneque valido fudit; fusa haec aqua soluit et per alutrum transcolauit. Sa-
 por erat acris, alcalinus, causticus, illi, quem ha-
 buit lixiuium e sanguine, haud dissimilis. Addito
 dein eidem alumine et vitriolo martis, ad fundum
 mox se deposuit pigmentum illud quacsitum coeru-
 leum, quod mixtum post cum acidis, elegantio-
 rem sensim impetrauit colorem. Mars itaque causa colo-
 ris coerulei.

p.46. No. 5. M. E. F. SCHMERSAHLII tractatio de
Hyacintho tuberoso Indico. Multa habet planta haec,
 quibus se commendat hominum arbitrio, et colorem,
 et odorem, et alia; Noster vero ad culturam eius
 solani respexit, neglecta structurae partium eius de-
 scriptione botanica. Duas eius species esse, aliam
 simplici flore, alteram pleno flore, quas nos dicere-
 mus varietates, primum dum monuit, tertiamque
 flore pleno rubicundo, quum nondum vidisset eam,
 vel-

veluti dubiam relinquit; statim ad culturam se vertit, sollicitaque docet et tempus et modum, quo tubera istius integra per hyemem seruari, vereque nouo debeant in terram plantari, et autumnus tandem colligi semina.

Pars II. no. 1. Cl. HILL observationum microscop. p. 116. picarum et physicarum continuata expositio, hic legitur ex anglica in vernaculam nostram versa linguam.*

No. 2. IO. GOTTFR. ZINNII observationes exp. 166. corporibus morbofis, et

No. 3. IO. LAVR. WITHOFII anatome pili hu-p. 171. mani, et

*No. 4. IO. GOTTFR. ZINNII observationes de p. 195. scirrhis cerebelli et cerebri, e Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis Commentariorum Tomo II, in germanicum translatae sermonem, hic exhibentur, quarum tamen summam alio loco iam exposuimus**.*

No. 5. De montibus Islandiae crystallinis continua-p. 197. ta sequitur tractatio. E niue, qua tali, nasci non posse glaciem supra euicerat Cl. WIDALINVS; iam, ubi glaciei per artem genesin, e niuis nimirum cum salibus et in primis nitro commixtione, docte fuisseque demonstraui, simili modo adfirmat niuem aquasque, adfluentes copiosius, subterraneas, salium multique nitri ope, quod illis terris abunde inesse comprobatur, facile mutari potuisse in tot tantaque glaciei volumina. Notatu quoque dignum est illud, quod sese moueant hi montes crystallini, et modo incedant aestate, modo retrogrediantur hyeme, et vice versa. Causa phaenomeni huius in eo ponitur, quod, dum certum sit aquam congelascentem maius occupare spatium, idem valeat de progressu regres-
sue

* Comment. nostr. Vol. II. Part. IV. p. 664. et Vol. IV. Pars I. p. 106. 108. III. Hamburgisches Magazin, 12ter Band. p. 3. 115. 355.

** vid. Comment. nostr. Vol. II. Pars IV. p. 714.

fuque montium. Dum enim congelatur aqua, propellit ante se, quae ei superincumbunt, glaciales rupes, unde progressus: eadem regelascens, in omnes sese diffundit plagas, unde collabuntur iterum retroque cedunt montes. Cl. Editor sub finem suas quoque addidit adnotationes, doctaeque non nulla, quae forte superessent; resoluit dubia.

p. 227. *Pars III. no. 1. ALBERTI DE HALLER de partibus corporis humani sensibilibus et irritabilibus commentatio*, Societ. Reg. Scient. Gotting. Commentar. Tom. II. p. 114. inserta, hic germanice versa traditur*.

p. 260. *No. 2. ANT. LEPROTTI Epistola ad IAC. BARTH. BECCARI, de aneurismate in arteria bronchiali aliisque observationes continens*, ex Comment. Bonon. Tom. I. p. 345 seqq. desumpta est.

p. 276. *No. 3. De modo frumentum diu conservandi observationes* ex Cl. DESLANDES libro, quem inscripsit, *Recueil des differens traités de physique et d'histoire naturelle. à Paris 1750. 12. p. 91.* teutonico idiomati redditae exhibentur. Sequens ordo est contentorum, ut delectus frumenti, dein horrea struendi modus, porro infecta frumenti granis infecta, eademque extirpandi modus, post haec structura tritici, hordei aliorumque granorum cerealium interior, tandem quoque in farina latitantes vermes considerentur. Primum quod attinet ad delectum frumenti, illud, quod in calidioribus crescit terris, servari diutius, quam quod frigidiores ferunt agri, itemque illud, quod siccioribus annis, quam quod humidioribus maturuit, melius esse constans quum doceat experientia, consultum omnino esset e calidioribus terris frumenta adferre servareque in publicos usus in granariis. Granaria vero optima construuntur sub terra, ut aeris aquaeque accessus evitari possit melius.

Hic

* Comment. nostr. Vol. II. Pars IV. p. 695. seqq.

Hic fuit mos veterum. Nunc quoque Afri profundis frumenta recondunt fontium cuniculis. Quum pretiosior iusto ita exstruendi visa esset ratio, consuetis haecenus uti licet horreis, quae docet Noster varia ratione construere melius convenientiusque, quam fieri plerumque solet. Porro contra insecta, quorum triplex describit genus, frumentorum hostes duo in primis commendat Cl. DESLANDES remedia, nimirum, ut saepe iterumque parietes granariorum abradantur duro quodam instrumento, eoque modo, si qua adhaereant parietibus, simul enecentur insecta, deinde ut sulphur crebro in granariis accendatur, cuius odor dicitur insectis omnium funestissimus. Ipsa grana si contemplamur, praeter culmum, qui spicam sustinet succosque, grani incremento destinatos, transmittit, gluma occurrit grani inuolucrum exterius, germen siue ea pars, qua genus suum propagat granum, plantae totius compendium et tandem farina, germen circum circa ambiens. Ultimo loco in farina latentium vermium exhibetur descriptio, deque farinae bonitate iudicium. Angli de farina cerealium suorum albidiori gloriantur; Galli vero de panis bonitate maiori.

No. 4. *Commentariorum Societatis Regiae scientiarum Gottingensis Tomi II. recensio* *.

No. 5. *De micrometro nuper inuento relatio*, exp. 334. D. ROB. SMITH ad Cl. A. G. KAESTNERVM data epistola, ex anglico versa sermone.

Pars IV. n. 2. ALBERTI DE HALLER de partibus corporis humani sensibilibus et irritabilibus commentationis Sectio II. **.

In Promptuarii, quod indicamus, Hamburgensis Volumine XIV. sequentes continentur dissertationes:

Part.

* Comment. nostr. Vol. II. Pars IV. p. 714. seqq

** ibid. p. 695.

- p. 3. *Part. I. n. 1. Recherches sur les usages des feuilles dans les plantes et sur quelques autres sujets relatifs à l'histoire de la végétation par CHARLES BONNET, recensionem legimus; quarum ipsi uberiores iam dedimus expositionem **.
- p. 30. *No. 2. Cl. HILL observationum microscopicarum continuationem insertam deprehendimus **.*
- p. 69. *No. 3. DOMINICI GYSMANN GALEAZZO de tunica reticulari intestinorum dissertatio ex Comment. Bonon. Tom. I. p. 359. desumpta est.*
- p. 89. *No. 4. A. Z. epistola ad auctorem diarii, Gentleman's Magazine, ex eius parte, quae mense februar. 1754. prodit, translata in vernaculam legitur, de morfu tarantulae complectens varia.*
- p. 94. *No. 5. Continuatio meditationum de lapidibus cochleatis. Quas olim Promtuarium ipsi Hamburgensi insertas, in nostris commentariis exposuimus***, et contra quas Cl. LEHMANN in deliciis physicis, quae Berolini prodire, non nulla monuit, eas ipsas iam fuse prosequitur, et in primis a factis eidem obiectio- nibus mascule sese defendit Auctor.*
- p. 115. *Pars II. no. 1. Het ondeckt Roonhuisaansch Geheim in de Vroedkunde nader opgeheldert en bevestigt door IACOBVS de VISSCHER en HUGO van de POLL, Stads Doctoren te Amsterdam. h. e. Arcanum Roonhuisianum in arte obstetricia detectum a IACOBO de VISSCHER et HUGONE van de POLL. Lugduni Bat. 1753. 8. Est recensio libri, hoc titulo qui prodit.*
- p. 138. *No. 2. P. B. P. commentatio de rore melleo, anno 1753. conscripta. Ita vero suam Cl. Auctor pertractavit dissertationem, ut primo loco, quas studiose col-
legerat,*

* Comment. nostr. Vol. III. Pars IV. p. 668. sqq.

** vid. supra p. 471.

*** Hamburgisches Magazin. IX. Band. p. 73. et Com- ment. nostr. Vol. II. Part. III. p. 477. seq.

legerat, de rore illo experientias enarraret ingenue, deinde in eius originem inquireret penitus, tandemque etiam effectus ipsius perpenderet saepe mirabiles. Inter segetes primum, guttarum forma, culmis, spicis, aristis granisque frumenti insistentem aliquando vidit Noster liquorem flavescentem, melli saccharoae perquam simillimum, mutatamque inde iam observavit granorum substantiam et saporem. Aliquot dies post magis penetrauerant guttulae; grana aliquot ad maiorem naturali increuerant longitudinem; membrana exterior eorum erat tenuis, purpurea, substantia vero sine odore et sapore. Similem liquorem in aliis plantis earumque partibus variis, ut in foliis cerasi, fagi, pruni, ribesiorum, aliarumque diuersis temporibus observavit, modo in guttulis, modo diffluentem, modo in aversa, modo in aduersa foliorum facie diffusum. Interdum pediculos paruos simul cum rore illo vidit Noster. Patina, libero aeri in horto per noctem exposita, mane similibus, ac folia, imbuta fuerat guttulis. In foliis inde relinquuntur splendentes maculae, post pluuias parciore, solis intensiore calore copiosiores. Liquor porro, e guttulis illis collectus, ut gummi, aqua soluitur; ad ignem ebullit, sensim subsidet, durior, dulcisque euadit, colore tinctus fusco; aere libero mollescit; igne flammam concipit, flammaque extincta, remanet substantia nigra, filamentosa, tenax, amari acrisque saporis. Iam vero quaeritur, unde suam ille ros melleus trahat originem? decidatne ex aere, vaporum sub forma, uti ros vulgaris aqueus? an vero ex ipsis plantis, tamquam gummi aliquod exsudet? an denique apum aliorumue insectorum opus sit? Insecta conferre nihil huic parando liquido, neque plantas ipsas illud exsudare posse, ostendunt et copia et situs guttularum, et quibus insident, partium diuersitas. Confirmant potius eandem melleo illi liquori esse, ac rori vulgari, originem

Cl.

Cl. Auctoris experientiae. Vnde enim, nisi ex aere, destillare potuit liquor, qui in diuersis plantis idem deprehenditur, qui aliis aequè adhaeret partibus, ac plantis, quique tantam copiam foliorum, haud inquinatorum antea, una nocte inquinauerat. Ex aere quidem depluit liquor hic melleus, rorisque inde nomen accepit, prouenire eum tamen ex ipsis floribus plantarum, ac perspirationis ope, vaporum forma exhalasse, valde est probabile. Cadit enim tunc potissimum, quando plures florem gerunt plantae. Indoles eius similis succis in floribus parandis idem euincit. Quum autem parca copia eius modi liquidi perspirare possit, parcior inde etiam, quam roris aquei, huius mellei deriuatur prouentus; neque ubique locorum occurrit, sed quorsum eundem in primis vehant venti. Rorem nostrum melleum confundunt vulgo cum rubigine siue rore farinoso, ut loquuntur germani (*Mehlthau*); sub hoc plerumque intelligi cupiunt pediculos paruulos, qui in foliis et petiolis variarum plantarum insident, puluerulentaque quadam materie saepius inquinati visi sunt, sed roris nomen propter ea non meriti: namque hanc forte pediculi exsudarunt, vel plantae ipsae, ut salic.

p. 161. ces. Tandem roris mellei effectus quod attinet, noxium valde eum esse probat granorum secalis incrementum praeternaturale, supra quod adnotauimus. Evenit illud tunc in primis, quando liquor iste in granum aliquod decidit, nondum euolutis staminibus, horum cum puluere sese miscet, atque ita pulueris dispersionem cohibet, et dependentem inde simul grani ipsius foecundationem: cadit vero saepe sine hoc effectu idem liquor, si tempus, situs et copia eundem impediunt. Auxilia contra ipsum dantur nulla; forte tamen aliquid valet pluuia, roris stillicidium quae mox sequitur. Dicunt rorem hunc melleum esse causam ustilaginis siue frumenti adusti. Sed quum adustarum spicarum singula grana id vitium

tium capiant, quum inter plures spicas, si una laborat, omnes corripantur eodem, quum denique in ipsis granis iam lateat vitium, quod experimenta confirmant, succus ille melleus causa vix ac ne vix quidem istius effectus dici iure poterit. Atque ita, quamvis in se noxios omnino ros melleus edat effectus, plures tamen forte eidem tribuuntur immerito.

No. 3. Ill. ELLERI *Experimenta nova et observationes de vegetatione seminum, herbarum et arborum*, desumpta ex *Histoire de l'Acad. Royale des Scienc. à Berlin, année 1752.* p. 1, et a nobis quoque iam indicata sunt *.

No. 4. *De colica pictorum* ex Cl. A. de HAEN *Dissertatione eiusdem argumenti*, Hagae Comitum 1745. 8. edita, itemque ex Cl. GRASHVRSII *tentamine de colica pictorum*. Amsterdam 1752. 8. ** excerpta legitur tractatio.

No. 5. Non nulla recensentur *de usu aquae calcis* p. 199. *viuae contra calculum* ex anglico illo libro, qui inscribitur: ROB. WHYTTS *essay on the virtues of lime-water in the cure of the stone*. Edimbourg, 1752. 12.

No. 7. IO. GE. ROEDERER *Sermo de pondere et longitudine recens natorum*, itemque

P. III. no. 1. SAM. CRISTIAN. HOLLMANNI p. 227. *commentatio de corporum marinorum aliorumque peregrinorum, in terra continente origine*, e *Commentariorum Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis Tomo III* translata sunt, fuseque a nobis recensita ***.

No. 2. A. G. KAESTNERI *animadversiones intenta* p. 291. *men aliquod opticum*. Reu. P. SCHEINERI *tentamen*

* vid. *Comment. nostr.* Vol. III. P. IV. p. 677 seq.

** *ibid.* Vol. II. P. II. p. 241.

*** *ibid.* Vol. IV. P. II. p. 197. et 201.

men opticum, rem unicam bis terue videndi, explicare tentauerat Cl. LA MOTTE in den *Abhandlungen und Versuchen der naturforschenden Gesellschaft in Danzig*, 2 Theil, quod ipsi quoque indicauimus *. Contra hanc explicationem, quam dedit Cl. LA MOTTE, non nulla monet hic Cl. KAESTNER, atque in primis phaenomeni illus causam non dependere a peculiari oculi cuiusuis dispositione, sed ex theoria visus perfecti et obscuri explicari posse accuratius demonstrat.

p. 269. No. 3. *Academiae scientiarum utilium, quae Erfordiae instituta est, concessa iura legesque rogatae, versione germanica donatae enarrantur.*

p. 300. No. 4. *Ossis magni, in pago Schieritz prope Misenam urbem inuenti, breuem descriptionem exhibet Cl. SCHVLZE.* Quum alio iam tempore hoc in pago a ruricolis olim inuenta fuerint bina unicornua marina siue dentes piscis Narual, superiori anno magnum quoque os femoris effossum fuit, cuius substantia porosa et friabilis, color albicans cum maculis liuidis, diploe copiosa, longitudo ulnam unam cum quadrante, diameter digitos viginti tres cum dimidio, inferior autem pars, qua cum tibia connectitur, undecim digitos longitudine, et totidem latitudine aequauit. Haud procul etiam caput ossis femoris diffractum sese obtulit fossorum conspectui, eratque eius diameter nouem digitorum, color albus, substantia interna spongiosa. Ceterum terra, in qua haec latitarunt sepulta, limosa erat et lutea.

p. 339. P. IV. no. 1. *Operationem chirurgicam, in vesicula fellea a se factam, modumque, quo unus pluresue calculi ex eadem tuto et cum successu extrahi possint, describit ZACH. VOGEL, Med. et Chir. D. Pract. Lubec.* Vir quidam mediae aetatis, validus et robustus, a febre suppressa laborauerat ictero, ab eoque restitutus, aliquo

* vid. Comment. nostr. Vol. IV. P. II. p. 312.

quot menses post in eundem, febre acuta et delirio stipatum, rursus incidit. Pharmacopolae cuiusdam opera mitior quidem euasit morbus, liuidus tamen totius habitus cutanei tumor supererat; albuginea oculi flaua, pulsus debilis, lingua sicca et obscure flaua, in dextro in primis hypochondrio tumor durus, a febre olim suppressa superstes, in dies iam auctus, figura oualis, fluctuans, mutato situ idem persistens, absque omni tamen febre, obseruabantur. Calculum vesicae felleae ductum choledochum communem obturasse, vesicamque forte cum peritonaeo concreuisse collegit Cl. VOGEL, de eodem extrahendo mox meditatus. Diu seduloque prius perpensis omnibus, quae difficilem hanc atque haud tentatam ante circumstabant operationem, paratisque necessariis instrumentis, fasciis, reliquisque, ipsam operationem suscipere ausus est. Aeger constanti animo libere eadem se subiecit, praecedenti die, mixturam temperantem postquam adsumerat, canalemque intestinorum clysmate abstergi passus fuerat. Ita posuit Noster aegrum in tabula, ut puluinar aliquod, dorso medio subiectum, tumorem simul eleuaret facilius inde incidendum. Cute dein parum adducta, eam ad musculos usque incidit, hisque cito separatis peritonaeum sese obtulit a tumore liberum; tunc lanceolae ope circiter digitum transuersum longam incisionem fecit in tumescentem adnatamque peritonaeo vesiculam felleam, ex qua mox effluxit multum corruptae, viscidae, granulosa bilis. Argentei specilli auxilio calculum in ductu choledochi communi adhaerentem detexit Noster, eumque forcipe haud difficile extraxit; post plures adhuc quaerens, nullos inuenit; inde materia biliosa prius educta, ut simplex aliud, vulnus hoc deligauit, emplastris fomentoque, ex vino rubro, myrrha et oleo cocto, superimposito, cum sextuplici splenio, additis ultimo, quae requiruntur, fasciis. Quies riteque obseruata

medendi methodus, intra quatuor hebdomadum spatium, aegrum perfecte sanitati restituit. Similem sciam, quum haec scripsit, tractare morbum Cl. VOGEL monet, quem cum aliis rarioribus observationibus se in lucem editurum esse pollicetur.

P. 349. No. 2. Legitur recensio *tentaminis Herpetologiae*, auctore IAC. THEOD. KLEIN*.

P. 365. No. 3. *Rariora quaedam hypochondriacorum symptomata* describit Cl. H. G. HOPPE. Quas alio iam tempore, promptuario ipsi Hamburgensi inseruerat de hypochondriacis symptomatibus, meditationes nos quoque enarrauimus**, nunc commemoraturi breuiter, quae exponit de rarioribus, quae ipse passus est hypochondriis laborans, symptomatibus. Notatu dignum in primis putat esse tempus, quo suos illud malum continuo renouauerat insultus, quum mitiores hosce quotidie ab hora quarta ad octauam post meridiem, vehementiores vero ab hora decima ad duodecimam matutinam, idque cum constantia, expertus fuerit. Cuius phaenomeni causam si quaeras in acido ventriculi, quod in primis hypochondriacos vexat, quodque versus vesperam augeatur a relictis ciborum cruditatibus, illa quidem multorum, quae hypochondriacis accidunt, malorum fons est, huic tamen producendo effectui minus rite respondet. Nam nullis licet probe sciret Noster se onerari in ventriculo cruditatibus, circa consuetum tamen tempus semper rediere symptomata. Neque ab acido etiam deriuari posse idem affirmat illud symptomatum genus, quod externas tantum capitis et thoracis partes cruciaret. Potius igitur ducit esse Cl. HOPPE, fateri ingenue ignorantiam suam causae huius phaenomeni,

* Vid. Comment. nostr. huius voluminis p. 462.

** Vid. Promptuarium Hamburgense. Tom. VIII. Pars VI. n. 3. p. 604. et Tom. IX. Pars VI. n. 1. p. 339. et Comment. nostr. Vol. II. P. I. p. 70. et Vol. III. P. III. p. 433 seq.

ni, quam ad multas easque occultas confugere de eadem hypotheses. Aliud singulare symptoma est, quod saepe perpessus fuit, lassitudo summa, sensuumque obnubilatio, post varia consuetaque symptomata superueniens; pulsus nulla mutatio; respiratio parum aucta; tandem accessit sudor in facie; sensim cessat lassitudo; sensuum vigor redit, viriumque ita restauratur robur, ac si nulla prorsus sensisset No-ster incommoda. Cui opposita saepe accessit praeternaturalis quaedam animi corporisque alacritas. Suas sponte libereque anima perficiebat actiones, ingenium vigeat optime, feraxque nouis erat ideis, quae longa sese serie excipiebant, atque animum diu multumque reficiebant; sed mox in occipite et vertice tensio quaedam molesta, mox auctior, et in primis versus vesperam sentiebatur; sudor superueniens leuabat malum; sponte sensimque cessabat etiam insignis illa animi alacritas. Quae causa sit huius phaenomeni, in dubio relinquitur.

No. 4. B. *ab* HEDEMAN Epistola ad Cl. K A E S T - p. 376.
NERVM, qua tentamen aliquod magneticum exponit. Chalybem, vi magnetica imbutum, ab incude fortius attrahere ferrum, Ill. REAVMVR docuit; si nimirum ille non laminae ferreae, sed magnae portioni ferri, instar incudis, adfixus fuerit; Cl. HEDEMAN tentauit illud cum chalybe eius modi in fornace humili ferreo, eiusque vim attrahentem inuenit omnino fortiolem. Idem tentauit cum magnete vero natiuo. Qui autem quum aliquando frigido fornaci impositus esset, trahere ferrum recusauit, neque quid attraxit aliquot dies post; tandem tamen igne carbonum admoto calefactus, sponte iterum attraxit vel maximum pondus. Quod tentamen, ulteriori omnino dignum disquisitione, ut repetatur accuratiusque describatur, in subiecta nota monuit Cl. K A E S TNER.

- P.378. No.5. Cl. ABRAH. GOTTHELF KÆSTNER, quod nuper edidit cum adnotationibus et additamentis, ex anglico versi, *systematis completi optices* ROBERTI SMITH, recensionem exhibet.
- P.433. No.7. *De iis, qui dicuntur icti a tarantula*, epistola ad Cl. KÆSTNERVM data ab A. F. BÜSCHING. Quorum mentionem fecerunt epistolae aliquot, Promtuariorum huic Hamburgensi insertae, a tarantula ictos Noster credit astutos potius fuisse mendicos, qui miros eiusmodi simulando motus, decipere et flectere laborauerint hominum animos, ut stipem darent eorum miseria commoti largiorem.
- P.437. No.8. Excerptum ex epistola quadam D. STEPH. HALES d. 25. ian. 1755. de usu ventilatorum ipsius non nulla exponit.
- P.441. No.9. 10. GOTTFR. OHNEF. RICHTERI *Ichthyothekologia*, germanico idiomate conscriptam, recensuit Cl. KÆSTNER.
- P.477. No.10. *De elasticitate glaciei* experientia adducitur ex *Histoire de l' Acad. Roy. des Scienc. à Paris, année 1752*. In nivis congelatae portionem, fortuito casu immittebatur culter, sed ad quatuor pedes protinus repellebatur; aliquoties repetitum hoc tentamen eundem semper edidit effectum.
- P.451. Part. V. no.1. *Aedificiorum*, quae vocantur, *gradatoria* (*Gradier oder Lecke-Häuser*), in coquendo sale usum demonstrare tentavit Cl. GERH. LUDW. MEYER. Quum nostris diebus magna ubique sit ligni caritas, eiusque pretium vel in dies augeatur; multam vero eius copiam sal ad cocturam sui postulet, multisque adeo simul impensis det occasionem; ut lignorum parcior ad coquendum sale fiat usus, omni studio efficiendum est. Illud autem ope aedificiorum gradatoriorum in primis obtineri posse, fuse demonstrat Cl. MEYER. Minor enim lignorum copia tunc requiritur, atque nihilo minus maior salis quanti-

quantitas eorum ope coquitur. Vt id ostendat, sigillatim enumerat Noster impensas illas, quae, si sola ignis vi excoquitur sal, requiruntur, additque etiam e sale ita cocto factos redditus; Quibus cum deinde comparat impensas redditusque, quae, quando ope gradatoriorum aedificiorum coctura salis perficitur, quotannis deprehenduntur; unde magnam omnino apparet esse impensarum reddituumque differentiam, ita, ut priori casu plus sit impensarum, quam reddituum. Insignis igitur omnino gradatoriorum aedificiorum utilitas, immo necessitas inde intelligitur. Consilium propter ea quoque dat Noster plura adhuc extruendi eius modi aedificia, modumque simul exponit atque rationem, qua illa strui optime debeant. Quae vero omnia, quum magis spectent mechanicam oeconomicaeque, huc referre vix licet. Sub finem tandem tractationis suae Cl. MEYER in Ill. IO. CHRIST. a DREYHAPPT, qui gradatorias domus statuerat minus esse utiles, animaduersiones addit.

No. 2. Cl. MODEL *meditationes de partibus constitutivis boracis, occasione disquisiti ab ipso salis cuiusdam perfici propositae*, in vernaculam translatae sunt, a nobis vero iam olim recensitae *.

No. 3. *De fonte quodam, quo coeci capiuntur lupi* p. 522. *piscis, observatio, ex Histoire de l'Acad. Royale des Scienc. à Paris, année 1752. p. 27. desumpta est **.*

No. 4. *Scirrbum rariorem* describit IO. CONR. p. 524. FVESLIN. Virum quendam triginta circiter et, quod excurrit, annorum, phlegmaticaeque temperiei, inuaserant vehementes capitis, dorsi, laterum ventrisque dolores, multis coniuncti cum flatibus. Chirurgi cuiusdam castrensis auxilio conualuit quidem, sed aliquot annos post rediit idem malum, insigni cum lassitudine membrorumque omnium dolo-

H h 4 re

* Comment. nostr. Vol. I. P. II. p. 265 seq.

** Pertinet historia acad. reg. scientiar. ad annum 1748. vid. Comment. nostr. Vol. II. P. IV. p. 577.

re stipatum; conqueri coepit aeger de pondere circa
 praecordia; medicastrosum, quos consuluit, plus
 nocuerunt auxilia; neque balnea attulerunt leuamen
 aliquod; deglutitio redditur difficilis, sensimque dif-
 ficilior, ita, ut praeter fluida vix quidquam admitte-
 ret. Variis multisque frustra tentatis remediis, au-
 getur malum, accedit frigus corporis, capitis dolor,
 inquietudo, somni defectus, tumor abdominis, dorsi
 dolor immanis, sputum viscidum squalidum; deglu-
 titio prorsus tollitur; cruoris aliqua portio sputo reii-
 citur; malorum tot tandem finem facit mors. Se-
 ctione facta, sequentia inuenit Cl. FVESLIN:
 Omentum prorsus euauit; intestina fuerunt vacua,
 naturali tamen praedita colore; ventriculi loco appa-
 ruit magnus tumor scirrhus; pars parua fundi ven-
 triculi superfuit, valde contracta, instar intestini;
 scirrhus cardiam totam occupauit; specillo immisso
 ulcus detectum fuit, ventriculum quod perforauerat,
 tres digitos latos ambitu suo continens. Scirrhus
 porro adhaesit firmiter diaphragmati, membranae in-
 ternae supra aortam venamque cauam, atque ipsis
 vertebis. Pylorus totus sese immiserat in scirrhum,
 ita, ut hic istum circum circa ambiret. Ad duode-
 num sese extendens, glandulas mesenterii quoque
 obstruxerat tumor, ad ductum choledochum pro-
 gressus, hepatis accreuit, atque cum liene se coniun-
 xit ope vasorum breuium. Figura eius fuit triangu-
 laris, irregularis; pondus trium librarum cum dimi-
 dia. Reliqua viscera integra fuerunt et sana, prae-
 ter cor, quod valde paruum apparuit. Glandulae,
 oesophagum tracheamque ambientes, intumuerunt
 multum; e quibus eminuit magna quaedam, galli-
 nae oui instar, glandula scirrhusa, accreuitque venae
 iugulari in latere sinistro sub clauicula.

p. 532. No. 5. *Commentarii Societatis Regiae Scientiarum
 Gottingensis. Tomus III ad annum 1753. recensentur;*
 id, quod ipsi iam fecimus *. Part.


* vid. Comment. nostr. Vol. IV. P. II. p. 193 seq.

Part. VI. no. 1. De indole et efficacia speculorum p. 563.
causticorum parabolicorum, quae struit PETER HOESEN, Mechanicus et Faber lignarius regius dresdensis, tractatus germanice edictus a I. P. HÖSEN, recensetur.

No. 3. *Continuatio historiae naturalis Louisianae* p. 578.
regionis, cuius priorem commentationem insertam inuenimus Promptuarii huius Hamburgensis Tomo X. Parti II, ex diario oeconomico translata in germanicam linguam.

N. 5. *Animadversiones in Roonbuisianum arcanum* p. 643.
detectum obstetricium, quod supra vidimus expositum in ipso Promptuarii Hamburgensis Vol. XIV. P. II. no. 1. Illud autem instrumentum, in quo latuit arcanum, in unico tantum casu adplicari posse, atque tunc etiam plerumque cum periculo, numquam tuto, saepe sine fructu id fieri, variis argumentis affirmat auctor anonymus.

No. 6. Recensionem legimus *de Hydrargyro tenta-* p. 653.
minis physico-medici. Partis prioris, auctore CHRISTIANO XAVERIO WABST. M. D. Vindobonae, 1754. 4.



XI.

Essai sur l'Education médicinale, des Enfans, et sur leurs Maladies. Par M. BROVZET, Medecin Ordinaire du Roi, de l'Infirmierie Royale et des Hopitaux de Fontainebleau; Correspondant de l'Académie Royale des Sciences, et Membre de l'Académie des Sciences et Belles-Lettres de Beziers, etc. Tome Premier et Second. A Paris, Chez la Veuve Cavelier et Fils. MDCCLIV. Volum. II. in 12 mai. Vol. I. pag. 404. prae-fat. pag. 68. Vol. II. pag. 368. una cum indice.

i. c.

Tentamen de educatione medica infantum, eorumque morbis. Auctore Cl. BROVZET, etc.

Medicam infantum educationem e manibus imperitarum nutricum matrumque infantes suos saepe nimium deperientium erepturus Cl. Auctor, medicisque hanc medicae cognitionis nobilissimam partem vindicaturus, totum opus in *tres libros* diuisit, quorum *primus* infantis statum eiusque educationem medicam a prima conceptione ad ablaetationis usque tempus in sex capitibus considerat. *Secundus*, quo primum huius operis absoluitur volumen, dissertationis filum, in quinque capitibus, ab ablaetationis tempore ad pubertatis terminos continuat; et *tertius* tandem, in secundo volumine contentus liber, infantum morbos in quinque capitibus exponit.

p. I. Merito vero medica infantum educatio iam hominis nascendi et in utero adhuc latitantis curam habere debet. Posteaquam igitur huius conceptionem secundum Cl. DE BUFFON seu potius HIPPOCRATIS systema

systema ex miscela spermatur in utero fieri ostendit, atque embryonis statum et pericula in utero materno, nec non praegnantium regimen, ad haec evitanda, descripsit; in gestationis terminos inquit, p. 37. signaque instantis puerperii vel abortus, una cum partus accidentibus, ipsaque infantis natiuitate, considerat; atque, hac occasione, casum quemdam ad modum rarum refert, quo femina quaedam, anno 1748 Marseillani in Occitania, puerum viuum edidit, sexto exacto mense post aliud praegressum puerperium, quem quinque mensium aetatis aestimat. Hic vero adeo paruus et debilis, cum oculis clausis, membris flaccidis pendentibusque, fuit, ut vix pro viuo haberetur. Per integros tamen quatuor menses, quo toto temporis spatio nec eiulauit, nec excrementa reddidit, (id, quod nobis vero vix probabile videtur), lactis tepidi quibusdam guttis enutritus, tandem hoc vix superato, clamare, excrementa reddere, fugere tantaque incrementa capere coepit, ut, post quindecim vel sedecim menses, coetaneos suos robore adhuc superaret.

Omnes dein mutationes, quae in organis sensu- p. 62. riis, sanguinis circulatione, reliquisque infantis recens nati visceribus naturaliter ac necessario occurrunt, una cum optima, eius modi tenellos rite tractandi, fasciisque quam commodissime inuoluendi, methodo, satis copiose, et ad viuum usque, tradidit, atque depinxit. Infantis cutis, quam primum ex magis humido calidoque uteri loco in aerem ambientem, ceu longe leuiorem frigidiorum atque sicciorem peruenit, necessario inflari, irritari, rubere, plus minus inflammari, erysipelatisque speciem formare debet, quae primus plerumque infantis morbus est. Haec summe vero conuulsiua maximeque p. 88. inflammatoria febris non nisi per meconii euacuationem terminatur, quae huius morbi crisis est, natura quasi ipsa sic nobis monstrante, quanti fere in omnibus

- p. 92. bus morbis alui purgatio aestimanda sit. Meconii quoque euacuatio lenissimis promoueri potest; clysmata vero, quantumcunque salutaria videantur, ideo tamen exulent, quia, colon celeriter nimiumque expandendo, et diaphragma comprimendo, magnas excitare possunt turbas. Suppositorium hisce, ex melle et sapone paratum, ex Cl. Auctoris sententia, p. 110. longe praeferrri debet. Somnus dein atque corporis infantilis huic maxime conueniens positura, cunarum p. 128. motus, crebra infantum abluitio, cui longe commodius salubriusque canum hoc edoctorum linctus substitui possent, ligamenti sublingualis in casu necessitatis discissio, atque tempus tandem, quo prima infanti alimenta porrigenda sint, consideratur, variaeque utiles insperguntur animaduersiones.
- p. 134. Nutritionis negotio hinc breuiter explicato, nutrimentum potissimum disquiritur, quod infanti recens nato porrigi debeat. Quaestiones vero: Estne lac ad nutriendos infantes necessarium? Estne lac muliebre? Estne lac maternum? sic diuifuit, ut p. 151. tandem asserat: 1) HELMONTII methodum * illi, qua lacte nutriuntur infantes procul dubio praefereendam esse, si unicum, quod iste adduxit, nobile exemplum, ad illam generatim commendandam sufficeret. 2) Methodum educandi infantes recens natos animalium et praefertim vaccarum ** vel caprarum

* *Laudo, inquit, pro puero nostro alimenta, quae pane tantisper in tenui cereuisia bullito, cum melle despumato, sin minus saccharo, instituitur, donec simul in mucilaginis aut collae speciem, siue gelatinam deuenierint; huic tunc tantumdem tenui cereuisiae miscetur quantum satis, ut potus loco inseruiat.* VAN-HELMONT. De Nutrit. Infant. ad Vit. long. vid. Ortum Medicinae Amsterodami 1648. 4to. p. 784.

** Quomodo lac vaccinum humano similius et ad nutriendum infantem aptius reddi possit, docuit Cl. IAC. REINBOLD SPIELMANN in diss. med. de optimo infan-

rum lacte, si illud praecipue per tubulum quemdam fugere, et sic cum propria saliva permiscere queant, non solum non periculosa, sed, in se spectata, quoque, ad minimum aequae securae esse, ac methodum educandi liberos per nutrices. Huius vero methodi generalem introductionem magis exoptandam, quam sperandam esse. 3) Matrem firma valetudine praeditam, diaetae regulis obedientem atque ab animi affectibus liberam, nutrici rure degenti; hanc vero, matri debili, delicatulae animique affectibus deditae, praefereendam esse. Nutrici vero rure degenti, domesticam nutricem semper esse anteponendam, hancque matri fere ubique aequiparari posse. Examinatis dein optimae nutricis, optimique lactis, characteribus; diaetae regimen nutrici ac lactanti conveniens describit Cl. Auctor; nec opus esse censet, ut nutrices maritatae a virorum amplexibus penitus arceantur. Veneris enim moderatum exercitium, ex Cl. Auctoris sententia, lac non turbat; plenaria vero invitaque iocorum conjugalium privatio sanitatem lactisque bonitatem earum, quae veneris deliciis adsuetae, iisdem, quo magis irrito conamine, eo ardentius semper insidiantur, longe gravius affici potest. Pulticulas quoque ex lacte et farina ad consistentiam consuetam coctas minime approbat; quodsi vero lac solum ad nutriendum infantem non sufficere deprehendatur, tunc forte supplementi loco pulticulam ex malto, seu farina hordei germinati, magis conducere ideo quoque arbitratur, quia, in Gallia Narbonensi, infantes, *pcnada* enutriti, sanissimi plerumque reperiuntur, rachitide et affectibus scrophulosis istis locorum vix cognitis. Quamdiu vero infans lactatur, illi prorsus nihil de reliquis ciborum

p. 165.
p. 186.
p. 204.
p. 214.
p. 220.

infantis recens nati alimento. Argentor. 1753. 4. pag. 29. et Comment. nostr. Vol. III. P. II. p. 315.

- rum generibus * praeter memoratam puliculam concedendum esse suadet, et cautiones addit, quibus mediante nutricum lacte medicamenta quaedam infantibus exhiberi queant. Pulchra denique salivationis infantum dentitioni praeciae, pruritus gingivarum, et dentitionis negotii ipsius, descriptio, additis ubique medendi consiliis, primam educationis
- p. 234. medicae infantum partem absoluit. Miramur vero, cur in necessitatis casu gingivas cum unguis extremitate superficietenus tantum incidendas esse suadeat, cauendo, ne gingiva ad os usque maxillare nec periosteum laedatur?
- p. 243. Quando iam omnes fere dentes prodierunt, id quod decimo quinto vel sexto mense plerumque fieri
- p. 254. solet, tunc infans tuto ab lactari potest. Methodum vero, qua infantibus cibi masticati exhibentur, reprobatur. Cl. Auctor, et longe melius esse censet, si ipsi cibos masticare propriaque cum saliva miscere adfuescant, taliaque ipsis exhibeantur, quae diuturna
- p. 260. masticatione haud indigent. Ablactationis vero tempore infantes omni lacte penitus priuandi sunt, plurimique ablactationi superuenientes morbi Nostro vel a prava variorum diuersimode inter se mixtorum alimentorum qualitate, vel a nimia eorum quantitate
- p. 262. dependere videntur. Generatim vero ablactatis cibos facilis digestionis, et aquam puram pro potu ordinario commendat, totumque reliquum infantibus maxime conueniens diaetae regimen secundum sex
- p. 319. res non naturales egregie pertractat. Vestimenta dein considerat, quae horum sanitatem tueri corporisque incolumitatem quam commodissime seruare
- p. 328. possunt. Oleosa et magis emolliens lanae qualitas infantum cuti, quae rudis plerumque, sicca, leuibusque fissuris subiecta esse solet, praec linteis Nostro conuenientior esse videtur, et hinc quoque subtiliores,

* Conf. cit. dissert. Cl. SPIELMANN. p. 6. et 30, seq. et Comment. nostr. l. c. p. 314. et 316.

res, ex lana confectos, pannos iisdem ad corporis superficiem tegendam suadet Cl. Auctor. Thoracum p. 330. commodis incommodisque perpenſis, eosdem, si modo rite confecti ſint, plane reiiciendos non eſſe, ſed potius varios non contemnendos uſus praeſtare poſſe arbitratur. Pubertatis tandem mutationes cum p. 342.

HIPPOCRATE atque STAHLIO ex cutis tunc temporis ſiente contingente maiore conſtrictione maioreque exſiccatione deriuat; et haec quoque Noſtro uberioris crinium prouentus barbaeque ortus ratio eſſe videtur. Miramur vero, Cl. Auctorem primores p. 372.

dentes pro ſuccedaneorum epiphyſibus habere, eosque radice plane deſtitui, affirmare potuiſſe. Ea, p. 379.

quae dentibus interdum ſub tartari nomine adhaeret, lapidea fere concretio, a morbis potius, quam a terreſtribus alimentorum particulis Cl. Auctori deriuanda eſſe videtur. En ſingularem caſum, quo hoc ulterius confirmare conatur! Virgo quaedam aetate iam prouectior, colicae nephriticae admodum ſubiecta, ſaeppiſſime calculos piſi magnitudinis per plures annos excernens, dentium tandem doloribus corripitur; quo facto dentes non ſolum exterius ad marmoreae ſubſtantiae altitudinem uſque laminis eiſmodi tartareis obteguntur, ſed idem quoque in interna oris parte prope dentes inſiſſores accidit. Hac vero cruſta paullo poſt ſponte delapſa, nec colicae nephriticae reuerterunt, nec aegra amplius calculos, ſed per urinam tantum ſabuli quidpiam ſubinde excreuit.

Dentes praeter ea in plurimis morbis, praecipue tamen in quibusdam febribus malignis, tartareis eiſmodi, ex Noſtri opinione, laminis obteguntur, quas pro tot lamellis contextus cellulofi gingiuarum, conſiſtentiam ſcirrhoſam naſtis, haberi poſſe autumat. Monita tandem de capillis unguibusque, ad ſanitatem pulchritudinemque corporis conſeruandis, primi voluminis ſecundo libro finem faciunt. p. 382.

- In recensendo tandem secundo volumine, seu tertio totius operis libro eo breuiores esse poterimus, quo breuius ipse Cl. Auctor plurimos infantum morbos nobis pertractasse videtur. Indicata igitur capitum summa, pauca tantum, Cl. Auctori propria visa,
- p. 4. hinc inde decerpturi sumus. *Primum caput* acutos infantum morbos tradit, quorum conuulsiones, tussis, vomitus, diarrhoea, vermes, ventris intumescencia, nec non variolae ac morbilli referuntur.
- p. 91. *Secundum* morbos externos complectitur, ut crustam lacteam, morbos narium, aurium, oculorum, faciei, aphthas, cingulum et crustas circa umbilicum reliquumque corpus, hernias, haemorrhoides, ac intestini recti prolapsum et fissuras tandem labiorum manuumque, in quibus fere omnibus vini tepidi lotiones optimum remedium esse censet. *Tertium*
- p. 131. morbos organicos exhibet, in quo de mala conformatione capitis, morbis oculorum, palpebrarum, labro leporino, morbis trunci, atque extremitatum
- p. 175. tam superiorum, quam inferiorum agitur. *Quartum* morbos infantum chronicos describit, quales sunt, dispositio ad calculum renum et vesicae, serophulae,
- p. 217. rachitis. *Vltimum* denique raros infantiae morbos et extraordinarios recenset; huc pertinent: vermes umbilicales, crinones, pili inter cutem et carnem nascentes, loquelae vitia et defectus, chorea S. Viti, tracheae tumor, verrucae manuum et faciei, morbus solstitialis S. Syriae, aurium stillicidium, oscitatio frequentior, hydrocephalus, pediculi capitis, et corporis totius marcescentia.
- p. 10. In conuulsionum paroxysmo infantibus saepe tartarum emeticum maiore, quam Ill. HOFFMANN doli, et cum successu quidem exhibuit, remissio enim non semper expectari potest. Purgantia quoque conducunt, sed extra paroxysmum; leniora vero
- p. 37. morbum ipsi potius augere videntur. Vermes omnem chylum consumere, intestina rodere ac perforare,

forare, in oesophagum adscendere, intestinorum motum intercipere, eosdemque vermifugis fugari posse, ideo prorsus negat, quia 1) parum admodum comedant, pinguiſſimique ſaepe infantes vermibus maxime excrucientur, 2) instrumentis ad mordendum aptis deſtituantur, 3) ipſi potius a conuulſiuis ventriculi et intestinorum motibus ſurſum deorſumque rapiantur, et 4) longe debiliores ſint, quam qui intestinorum motum intercipere valeant. Vermes p. 48. quoque viuos et bene nutritos aceto, vino, abſinthii decocto, aquae atque oleo indidit, quorum bina ultima eos parum tantum debilitare, reliqua vero potius longe viuaciores reddere videbantur. Tartarus ſtibiatuſ, quem in omnibus vermium affectibus valde commendat, puellae undecim annorum bis exhibituſ, vermem ſolitarium cum multa viſcoſa bilioſaque materie excuſſit. Infantes quoque ante pubertatis terminum aſcaridibus fere non ſubiectoſ eſſe arbitratur *. Intestini recti prolapſum facile curari p. 121. poſſe memorat, ſi alui excrementa erecti ſtanteſ reddere moneantur. Cartilaginem xiphoideam a riſu p. 151. immoderato interiora verſuſ cedere vidit, et quaeſtionem tandem proponit, annon ſcrophularum in- p. 196. oculatio illaſ minus periculoſaſ minusque pertinaceſ reddere poſſit?

* Nobis vero aliquot pueri noti ſunt, qui ante hoſ aliquot annos, quinto circiter vel ſexto aetatiſ anno de intolerabili ani pruritu conquerebantur; et cum exteriuſ nulla huiuſ prurituſ cauſa detegi poſſet, excrementa horum puerorum ſtatim poſt alui depoſitionem attentiuſ perluftrata innumerabileſ, paruoſ, viuoſque adhuc, alboſ, iſſque haud abſimileſ vermiculoſ undiquaque in externa ſuperficie conſpectui exhibebant, qui in caſeiſ fere quotidie occurrunt. Continuatuſ per aliquot ſeptimaneſ rhabarbari aethiopique mineraliſ uſuſ eoſ ab hoc intolerabili pruritu aſcaridibuſque ipſiſ proriſ liberauit.



XII.

Recueil des pieces, qui ont concouru pour le
prix de l'academie royale de Chirurgie Tom.
I. à Paris chez Delaguette, 1753. 4to. mai.
3 alph.

Hoc est:

Collectio dissertationum, quibus de praemio, in
academia regia chirurgiae obtinendo, con-
certatum fuit. Tom. I.

Non de praemio tantum obtinendo, sed de assensu
eruditorum assequendo solliciti sunt, qui quae-
stiones a societatibus publicis propositas elaborandas
sibi sumunt, omnem itaque animi vim eo dirigunt,
ut de themate proposito accurate exponant, ideoque
in medicina et scientia naturali potissimum perficien-
da hos labores omnino utiles esse, quis est, qui nescit.
Et certe utiles erunt eae, quae nunc proponuntur,
dissertationes, qua propter nos, qui nuper tomum
secundum commentariorum, ab academia regia chi-
rurgica parisiensi editum, proposuimus*, lectoribus
nostris haud ingratum laborem suscepturi erimus, si
et ea, quae in hoc volumine continentur, breuiter
indicemus.

Exoptat vero in praefatione societas, ut ii, qui
quaestiones resoluendas sibi sumunt, ideam quaestio-
nis primo euoluant, porro vel definitiones vel pro-
positiones principes praemittant, deinde diuisionem
aptam et ordinem conuenientem ubique assumant,
et tandem argumenta probantia ex theoria et praxi
petant. Theoriam quod concernit ea, principiis phy-
siologico anatomicis superstruatur, praxis autem in
observationibus veris et concinne propositis theori-
am illustret atque perficiat. In primo hoc volumine
quaestiones ab anno huius seculi tricesimo secundo
ad

* vid. Comment. nostr. Vol. III. P. IV. p. 575. sqq.

ad quadragesimum tertium usque propositae ventila-
ntur, reliquas in sequenti volumine proxime expe-
ctamus.

Prima quaestio anno tricesimo secundo exposita,
sequenti anno praemium reportavit: *Cur quidam tu-
mores exstirpandi, alii tantum aperiendi sint, in una
vero et altera operatione quaeritur, ubinam cauterium
instrumento secanti praeferendum sit, et quaenam sint
rationes, cur praeferatur.* Auctore Cl. MEDALON,
Med. Doct.

Quaestionem propositam in duas partes diuidit p. 5.
Noster, et monet eandem tumores humorales et ta-
les quidem, qui resolui nequeunt, concernere. Disqui-
rendum primo est, quinam tumores exstirpandi, qui-
nam aperiendi sint, et generatim respondet eos tu-
mores, in quibus, et humor vasa et interstitia obstruens
euacuari, et unio partium siue regeneratio nouae car-
nis praestari potest, aperiendos esse, hinc necessario
sequitur exstirpationem in casu contrario locum habe-
re. Haec ex suppurationis consideratione declaran-
da sunt, quae duplex est, prima, quae effusionem ob-
structi humoris una cum vasis et solidis corruptis ef-
ficat; altera, quae affluxum succi unientis et carnem
regenerantis praestat, illam *praeparantem*, hanc *rege-* p. 8.
nerantem suppurationem appellat, et utramque erudi-
te explicat. Illa locum habet, ubi humores nondum
ad illum gradum indurationis peruenerunt, qui disso-
lutionem eludit, haec obseruatur, ubi vasa per prio-
rem libera reddita non nisi lympham balsamicam et
succum nutritium verum exhibent, si enim alia vasa
succum extraneum adducunt, hic lympham optimam
inquinat et consolidationem impedit. Prior itaque
suppuratio bene succedens, dum plenariam effusionem
obstructi praestat, necessario posteriori fauet. Hinc
Noster concludit: *Tumores, qui vere et perfecte in ob-* p. 10.
structis partibus ad effusionem praeparati sunt, aut per
Ii 2 *suppu.*

suppurationem praeparantem eo deduci possunt, aperiendos esse, omnis vero tumor exstirpandus est, qui per suppurationem praeparantem ad dissolutionem integram partium deduci nequit, vel in quo organisatio ita praeparata est, ut spem-affluentis succi nutritii auferat, aut effectus eius perturbet.

Haec generatim enunciata in diuersis tumoribus declarat et de phlegmone primo loco exponit. Haec vel plenariam suppurationem subiit, vel tantum ad veram suppurationem tendit, subsistente tantum leuiori inflammatione, tumore et duritie, vel in scirrhosam duritiem transiit; in primo et secundo casu aperiendus est tumor, in tertio ille exstirpandus est. In scirrhosa phlegmone forte adhuc aliqua sanguinis et lymphae mixtio et inde noua suppuratio expectari posset, quae tamen in scirrho vero, ubi lymphæ stagnat, nullo modo expectanda est, qui ideo exstirpationem omnino exigit. Tumores callosi circa orificia fistularum ad naturam scirrho accedunt, hinc exstirpatione quoque necessaria est, interdum tamen, si loca callosa haud adeo magna sunt, scarificatio instituta superuenientem suppurationem et certam ideo separationem promittit.

p. 14. Oedema recens incisione superatur et parua quidem, tumori non proportionata, cum humores stagnantes fluidi ad orificium duci, et in vasis et cellulis tonus per topica restaurari possint; inueteratum vero ob nimiam distensionem, et ob nimiam lymphæ remoram, quæ partes solidas maceratas et ad putredinem dispositas reddidit, exstirpationem exigit. Progreditur inde Cl. Auctor ad carcinoma et cancerum, et de incremento carnis luxuriantis vegetationi simili varia proponit, similique modo furunculos, anthraces aliosque tumores praeternaturales considerandos sibi sumit.

p. 28. Altera quaestionis pars casus definit, in quibus, si tumores vel aperiendi vel exstirpandi sunt, cauterium instru-

instrumento secanti praeferendum est. Generatim ideo Noster effectus cauterii et instrumenti secantis inter se inuicem comparat, et hoc illi ut plurimum praeferendum esse iudicat, quasdam tamen exceptiones passim admittit v. c. dolor et inflammatio, quae per actionem cauterii excitantur, in tumoribus, ubi suppuratio imperfecta est, hanc excitare et perficere valent, uti in abscessibus lentis, valida inflammatione non stipatis. Cum etiam cauterium potentiale acrem et rodentem vim haud raro corporis succis inferat, actuale praeferendum esse iudicat Noster, monet tamen et hoc ab incommodis generalibus cauteriorum minime liberum esse.

Eadem quaestio a Cl. L E C A T declarata fuit, qui eam quoque in binas partes diuidit, et de resolutione et suppuratione tumorum in genere agit. Quatuor itaque tumorum classes proponit, quarum prima tumores, ad optimam suppurationem dispositos, secunda eos, qui emolliendo et relaxando ad optimam suppurationem disponi possunt, tertia eos, quos ad suppurationem perfectam deducere non possumus, quarta eos, qui nunquam ad suppurationem disponuntur, proponit.

His in articulo primo generatim expositis, in altero ad tumores aperiendos refert omnes, qui ad primam et secundam classem pertinent, qui per suppurationem veram aut spuriam, perfectam aut imperfectam accurate dissolui possunt, ut phlegmones diuersae species, et tumores lymphatici scirrhusi, qui suppurationem admittunt. Non enim permittendum est, ut per se aperiantur, quoniam, cum materia purulenta non satis euacuari possit, sinus et fistulae inde eueniunt. Dum quartae classis tumores scirrhusos et carcinomata extirpandos esse ostendit Cl. Autor, possibilitatem, utilitatem et necessitatem extirpationis contra dissentientes defendens. Tandem ter-

tiae classis tumores addit, qui et fluida continent, non nisi euacuatione, et concretiones solidas non nisi exstirpatione remouenda, in quibus itaque utrumque auxilium adhibendum est, ut sunt scirrhusi tumores aliquo modo suppurantes et tumores cystici non nulli.

- p. 52. In altera quaestionis parte disquirat Noster, quo in casu cauterium et in aperiendo et in exstirpando tumore instrumento secanti praeferendum sit. Huic quidem in operationibus chirurgicis instituendis laudem non detrahit, sed postquam differentiam actualis et potentialis cauterii ostendit, hoc etiam interdum adhibendum esse declarat, dummodo apta applicatione efficax reddatur et commodum. Cauterium itaque praeferendum est instrumento secanti in aperiendis tumoribus 1) sanguineo lymphaticis siue inflammatoriis lente ad suppurationem deducendis, v. c. in quibusdam phlegmones oedematosae speciebus, quoniam sanguinem ad vasa capillaria alliciendo, inflammationem auget et vasa dilacerat et fundit; 2) inflammatoriis malignis, quarum materia ad massam humorum non reducenda est, ut in tumoribus venereis et pestilentialibus, cauterium enim et purulentae materiae exitum et coctionem aptam conciliat, et irritationes solidorum regressum materiae ad sanguinem impediunt. Sed et in exstirpandis tumoribus cauterium instrumento secanti non nunquam praeferendum est, si magna et reiterata incisio aegroto nimium dolorem inducit v. c. ubi verrucae et condylomata exstirpanda sunt, porro etiam si post incisionem tumores magis propullulant, quos tamen cauterium stringendo partes vicinas ad suppurationem disponit.
- p. 56.

- p. 60. Hanc ipsam quaestionem Exp. BASSIVS Cl. Halensium Professor, cuius obitum nuper indicauimus *, examinan-

* Vid. Comment. nostr. Vol. III. P. II. p. 359.

examinandam quoque sibi sumsit. Hic primo differentiam tumorum omnium a contento vel liquido vel solido, et a continente membrana vel alio velamento desumptam proponit, postea ad tumores singulos considerandos se conuertit, et cur quidam radicitus euellendi, alii incisione simplici tantum remouendi sint, apte diiudicat. Cum eum in omnibus sequi haud possimus, en quaedam exempla, quae rationem tractationis declarant.

Glandulae induratae, dummodo nec vasa magna p. 78. nec aliae partes vicinae prohibeant, beneficio ferri secantis funditus euertendae sunt, hoc in casu nec uestigio nec sepsis locum inueniunt, inde enim intolerabiles ferme dolores, stagnationes nouae inflammatoriae, immo conuulsui motus oriuntur. Qb lapideam etiam duritiem neque ferro urenti neque corrosiuis medicamentis obediunt. Idem valet de scirrhis, in quibus et incisione et cauteriis materia haecenus quiescens in motum deducitur. Simili ratione cancerum occultum in corpore puro excindendum esse monet Noster, cum e contrario in inueterato hoc fieri nequeat. Apostemata, quae materiam purulentam in penetralibus suis fouent, incisione scalpelli optime aperiuntur; ea vero, quae valide dura sunt, et tarde in suppurationem abeunt, magis cathaereticorum applicationem, quam cultelli cuspidem efflagitant. Sar. p. 93. comata et polypi exstirpationem exigunt, si haec apte perfici potest, vel scalpello vel ligatura vel corrosione praestandam, si enim fibrae relinquuntur, denuo propullulant. Et tumores cystici, cuiuscunque demum sunt indolis, cum folliculo refecandi et exstirpandi sunt, chirurgus tamen ad magnitudinem, locum affectum, et partium vicinarum situm omnino respicere tenetur. In fine de cauteriis et potent. p. 103. tialium et actualium applicatione in quibusdam tumoribus aliisque operationibus chirurgicis differitur.

p. 109. Quaestio anno trigicesimo tertio huius seculi proposita, et cui sequenti anno praemium decretum fuit, *commoda et incommoda adhibitarum turundarum aliorumque remediorum dilatantium in diuersis casibus examinanda* exhibet. Praemium Cl. L E C A T obtinuit, qui quaestionem sequentem in modum pertractauit. Turundae siue remedia dilatantia separationem partium vel maiorem reddunt, ut spongia et quaedam radices siccae, quae humore suscepto mole augentur, vel separationem praesentem tantum sustinent, et vel integra sunt, ut lintea, vel caua, ut canales ex metallo parati. Turundae vero certissimos quosdam effectus praestant, ex quibus earundem agendi ratio declaranda est, diminuunt enim vel prorsus tollunt lumina vasorum vicinorum et rete nervorum his vicinum distendunt.

p. 114. Incommoda remediorum dilatantium, quae in prima parte recensentur, vel suppurationem vel genesis nouae carnis concernunt, quae in duobus articulis separatim proponuntur. Dispositio suppurationis moderatam obstructionem in capillaribus vasis et tensionem solidorum, cuius beneficio pus formatur, exigit. Turundae itaque vascula minima comprimendo, obstructionem in parietibus vulneris, ubi necessaria est, tollunt, in profundiore autem parte nimiam et inde periculosam reddunt. Porro irritabilitatem partium et tensionem inde oriundam, quae moderata esse debet, praeter modum augent, et ita

p. 117. indurationem vel putredinem inducunt. Vti vero hos, quae suppurationem praecedere debent, effectus impediunt, sic simili ratione suppurationem iam formatam supprimunt, dum accessum et egressum puris haud permittunt, quod ex generalioribus effectibus paulo ante ostensis declaratur, oriuntur inde callosa et fistulosa ulcera, et materia non apte excernenda in massam sanguinis reuehitur.

In altero articulo incommoda dilatantium respe- p. 120.

Et regenerationis carnis ita declarantur, ut primo ostendatur, quo modo succus nutritius affluens et adhaerens paruulam eminentiam et ita sensim sensimque carnem nouam quasi granulatam efficiat, quae aucta nouas accessiones admittit, donec non nisi vapor tenuis perspiret, et sic cicatrix formetur. Omnes hi effectus compressione orificiorum vasorum per turundas et irritatione neruorum, qui vasa stringunt, inde succedente impediuntur; hinc paruulae eminentiae non libere formari possunt, sed callus oritur, et, licet postea turundae remoucantur, depressa tamen et inepta se sistit cicatrix. Ex his etiam grauiora, quae subsequuntur incommoda, v. c. fistulae explicari possunt.

Altera tractationis pars commoda turundarum p. 122, et aliorum remediorum dilatantium recenset, quae tribus articulis exponuntur, in quorum primo utilitas dilatantium exiguis incommodis stipata declaratur. Si magnae incisiones vasa dissecant, ex quibus haemorrhagia perniciofa oriri posset, compressio a turundis inducta et orificia angustiora reddit, et irritatione stricturas fibrarum efficit, quae aptius quidem, quam per medicamenta adstringentia, hoc in casu ab aliis proposita, praestantur. Si apertura naturalis coacta incisione aperienda est, tunc apte satis turunda orificium apertum seruat, in eo quoque casu, ubi humor effluens aperturam denuo coalescere non finit, melius cannula quaedam iniicitur, ne humor acris labia vulneris arrodant et nimis inflammet.

In secundo articulo casus recensentur, ubi usus dilatantium longe maior est, quam incommoda concomitantia, v. c. ubi corporis alicuius peregrini vel corrupti exitus expectandus est, vel ubi fluida corrupta exire, medicamenta autem iniici debent, qua in re Cl. Auctor non nullas regulas circa situm partium, quibus vulnera inflata fuerunt, addit et varia chirurgiae capita breuiter illustrat.

p. 131. In tertio tandem articulo exemplo fistularum et setaceorum ostenditur, haec ut vitia localia in aegrotis interdum diu admitti, quo uniuersali humorum vitio remedium afferamus.

p. 133. Haec ipsa quaestio porro ab anonymo quodam Auctore sub examen reuocata fuit. Hic in prima parte tractationem de operatione naturae in regeneratione carnis praemittit, in altera vero ad quaestionem motam de commodis et incommodis turundarum respondet.

p. 135. Totum corpus ex vasculis, tenui rete tendinoso connexis, compositum est, in his liquor partim sanguineus, partim lymphaticus vehitur. Sanguis maxime compositum est fluidum, ex quo omnes reliqui humores praeparantur, ex his lymphæ est, quæ spissior reddi potest, serum autem tenue manet vix inspissandum, lymphæ igitur, quæ omnium partium nutrimentum praestat, in suppuratione bona affluit et ita saepius in insigni eius augmento dissipatur, ut aegri inde debilitentur; quod si vero etiam in moderata suppuratione aliqua pars dissipetur, reliqua tamen tenues illas eminentias efficit, quæ carnem nouam et inde cicatricem formant.

p. 138. His praemissis in altera nunc parte Cl. Auctor ad quaestionem propositam se conuertit. Non operatione chirurgica tantum, secundum regulas artis peracta, naturam iuuat, sed apta quoque succedere debet deligandi ratio, ad quam etiam turundæ et alia remedia dilatantia pertinent. Horum usus ad quinque capita reduci potest: 1) absorbent maximam partem succi ex labiis vulneris transsudantis; 2) vulnere balsama aliaque medicamenta applicant; 3) sanguinis affluxum sistunt; 4) labia vulneris separata seruant; 5) eadem labia magis distendunt.

p. 140. In simplicibus igitur vulneribus, sine destructione substantiae inflictis, sanguinolentis, vel etiam aliqua suppu-

suppuratione conspicuis, turundae minus necessariae, immo nociuae sunt, et, si etiam balsamus quidam digestius applicandus est, linteum carptum molle sufficit, quo nec labia nimis detergantur, nec comprimuntur. In complicatis vero vulneribus natura p. 144. omnino auxiliis chirurgicis adiuuanda est, Cl. Auctor itaque vulnera capitis, pectoris, abdominis et extremitatum considerat, varia lectu digna in primis respectu turundarum proponit, et passim ostendit haec auxilia interdum cum fructu adhibita, saepius tamen praeter necessitatem applicari, et ita plus nocere, quam prodesse.

Quaestio 1734 proposita in quolibet genere morbi p. 155. chirurgici casus, ubi frequens vel rara deligatio conuenit, definiendos exhibet. Elaboratio, cui praemium adiudicatum fuit, est Cl. LE CAT, qui argumentum hoc sequentem in modum pertractauit. Deligatio autem non tantum circumuolutionem fasciarum, sed et applicationem remediorum, variae medicationi inferuentium, exigit. Ostendit itaque utilitatem deligationis et post ea morbos, qui crebram deligationem requirunt, considerat, tandem eos morbos attendit, ubi applicata remedia diutius relinquenda sunt. De p. 158. ligatione autem 1) partes male affectas in statu conuenienti conseruamus, quod exemplis vulnerum recentium, fracturarum et luxationum facile declaratur, 2) remedia medicationi inferuentia applicamus, 3) partes minus conuenientes remouemus, e. g. pus, faniem, partes ossium, vel corpora peregrina, vulnere nociua.

His in primo articulo expositis, in secundo casus p. 162. citat, ubi crebra deligatio requiritur. Hi rariores sunt, quoniam ut plurimum indicationi curatoriae contrariae inueniuntur, inde ut plurimum in symptomatica indicatione tantum valent, v. c. si dolor in fractis vel abscessibus urget, vel si excrementorum collectio post

post lithotomiam et operationem fistulae ani remouenda est. Sic porro medicamentorum applicatio crebram hanc deligationem exigit, in gangraena vel aliis morbis celeriter proserpentibus. Tandem et quantitas et qualitas materiae excernendae hanc attentionem poscit, v. c. in pure copiosius moto vel fero acri rodente.

p. 165. Simili modo et rara vulnerum deligatio ex his fundamentis in tertio articulo diiudicatur. In fractis, luxatis et vulneribus recentibus partes separatae semper in situ retinendae sunt, nisi symptoma quoddam apparatus remouere iubeat. Medicamentum applicatum diu relinquendum est, si vel tardius vires suas exerit, vel easdem diu retinet, ita, ut per longius temporis intervallum utile esse possit; his enim vel operationes naturae diu adiuuantur, vel obstacula huic opposita diu arcentur. Hinc incommoda apparatus praeter necessitatem soluti demonstrat, et alia exponit, quae in ipsis momentis inter remotam et iterum applicatam deligationem oriuntur, v. c. frigus partem affectam laedens, in crebra deligatione vix satis arceri, vel medicamenta sub conuenienti caloris gradu applicari possunt, deinde etiam et motus et dolor inde oriundi haud raro nocent, tandem et puris formatio et partium ex vulnere remouendarum v. c. ossium exfoliatione solutorum separatio non apte fieri potest, nisi interdum longiorem applicationem fasciarum et medicamentorum permittamus.

p. 173. Eadem quaestio ab Anonymo quoque pertractata fuit. Hic omnes morbos chirurgicos ad duo capita reducit et tum respectu solutionis continui, tum respectu tumorum, quaestionem propositam examinat. In primo capite, quae vulnera tradit, eiusque primo articulo simplicia vulnera disquirat; haec sine destructione substantiae sunt, nec ratione morbi coniuncti, nec causae, nec symptomatis aliquid mali ostendunt,

dunt, in his itaque omnino rara deligatio conuenit. In vulneribus complicatis, in quibus omnia contraria p. 176. eueniunt, maior attentio requiritur. Respicendum itaque in primis est ad suppurationem praeparantem, quae, si pus diutius in vulnere relinquitur, et erosioni et resorptioni occasionem praeberet; hinc crebra deligatio requiritur, quae et ideo necessaria est, quo chirurgus exinde statum morbi frequentius se mutantis cognoscere queat. Finita vero suppuratione praeparante, regenerans succedit, sub qua rara deligatio omnino exposcitur. In virulenta vulnerum conditione hoc eo magis attendendum est, cum mala morbi materia semper laedens crebrius remouenda sit.

In vulneribus cum fracturis crebra deligatio non requiritur, nisi in nimis violenta partium destructione. Si causa vulnus efficiens latet v. c. globulus plumbeus, cuspis ensis etc. tunc crebra deligatio eo usque continuanda est, donec peregrinum corpus remoueri queat, postea suppurationis ratio habenda erit. Sym- p. 182. ptomata vulneribus accidentia sunt haemorrhagia, dolor et conuulsio, de quibus Noster porro agit, et solutionem continui in partibus durioribus considerat, in cunctis vero ad antecedentia monita respicit.

In altera parte huius tractationis quaestionem re- p. 186. spectu tumorum et in primo quidem articulo eosdem ratione temporis examinat. Hic ad phlegmonem et oedema praecipue respicit, cum reliqui tumores ex his intelligi queant. In principio igitur, ubi phlegmone reprimenda, oedema autem spirituosum exigit remedia, crebra eorundem requiritur applicatio, cum vires facile perdant. In augmento tumorum chirurgus eo respiciat, ut ex una parte symptomata mitigentur, quod in inflammationibus saepe attendendum est, ex altera parte viae resolutioni aptas praeparat, quod omnes tumores concernit. Ostendit itaque Noster, quomodo emollientia leniter anodyna in inflammatione, et spirituosum in oedemate applicanda sint, et quo-

quomodo obseruatio operationis medicamentorum et inde praestanda mutatio, crebram deligationem exigant.

p. 191. Pergit itaque ad articulum secundum, in quo tumorum differentiam respectu mutationis inductae disquirat. Si resolutio tumorum incipit, crebra emollientium et resoluentium applicatio requiritur, in continuatione vero et quando resolutio succedere videtur, medicamenta eam adiuuantia fortiora eligenda sunt, ita tamen, ut sensim sensimque ab emollientibus ad resoluentia progrediamur, qua in re crebra rareque deligatio ex concomitantibus causis et symptomatibus definitur. Tumores in suppurationem tendentes distinguendi sunt, illi enim, qui per malignam indolem corruptionem massae humorum inferre possent, crebrius deligandi sunt, quo materia purulenta, licet nondum copiosa sit, remoueatur; alii, qui humores non malignos continent, parciolem remediorum applicationem exigunt, tandem alii, in quibus lenta suppuratio est, ut in tumoribus scrophulosis etc. naturae quidem negotium committendum est, ita tamen, ut ea medicamentis rarius applicatis adiuuetur.

Ab hac tractatione ad ulcerum curationes progreditur Noster, et dum illa, quae suppurationem praeparantem non admittunt, ad induratorum tumorem indolem refert, sic illa, quae hanc suppurationem admittunt, ex monitis supra propositis diiudicat. De tumoribus ad putredinem deductis pauca monet, cum in illis separatio integra magis, quam lenta tractatio conueniat. In articulo tertio pauca de tumoribus sanguineis, scilicet varicosis et aneurismaticis, nec non de herniosis subiungit.

p. 199. Quaestiones, ad annos tricesimum quintum et sextum propositae, annis sequentibus praemium non reportarunt, prima igitur, quae *differentias vulnorum sclopetis infligatorum ab aliis vulneribus et medendi rationem*

tionem proposuit, ad annum tricesimum septimum translata fuit, et duplum praemium Cl. L. E. C. A. T. obtinuit, qui cum explicationem ex pathologia et therapia generali repetat, omnem hanc doctrinam concinne proposuit, ita, ut nos non nisi ordinem paucis indicare possimus verbis. Quaestio enim ipsa in duas p. 205.

partes diuiditur, quarum prima characteres vulnerum, sclopetis inflictorum, quibus ab aliis vulneribus distinguuntur, tradit. Mutationes vulnerum, quae incisione, ruptura, dissolutione, contusione et attritu fiunt egregie proponuntur, inter se comparantur, et vulnera sclopetis infecta attritu potissimum fieri ostenditur, quo partes solidae parietum crispantur, substantia ipsa destruitur, haemorrhagia minimorum vasorum supprimitur, hinc simul obstructio et tensio insignis, nec non stupor et irritatio partium vicinarum efficitur. Phaenomenon, quod vulnus, sclopeto infli-

ctum, partem mollem penetrans, angustius sit in introitu, quam in exitu, ita declaratur, quod nimirum maior sit impetus et resistentia carnis in ingressu, in egressu vero impetus globuli immineatur, cum nil nisi aer resistat, hinc tumor partis laesae angustiam maiorem in introitu efficiat. Symptomata vero, quae cum his vulneribus sunt, ideo in primis atrociora deprehenduntur, quoniam systema nervosum, omnes actiones dirigens, concutitur, idque eo magis, si nobiliores et nervosae partes destruuntur et globuli lac-
dentis figura conquassationi partium magis apta est.

In therapia horum vulnere, quam altera pars p. 218. tradit, tres potissimum indicationes formantur, quarum prima de humoribus ad unionem praestandam aptis sollicita est, et ideo vires vitae instaurare, bonos succos ingerere, peruersos autem corrigere et euacuare docet; Secunda aequalem humorum distributionem efficere tentat, quae non nisi remotis partibus destruentibus et destructis fieri potest, supprimendo simul irregulares solidorum et fluidorum motus;

tus; tertia tandem indicatio eo respicit, ut solutae partes illum situm acquirant, qui depurationi et consolidationi partium fauet. Has indicationes accurate prosequitur Noster et ea, quae profert, observationibus illustrat. De amputatione partium his vulneribus affectarum iam alibi multa proposita fuerunt *.
 p. 225. Cl. Auctor vero monet, sphacelum post talia vulnera oriundum, destructiones articulorum, laesiones maiorum vasorum saepius quidem amputationem membri exigere, et in genere quidem concludi posse, partem, quae servari non potest, amputatione auferendam esse, neminem vero, nisi chirurgum artis peritum et experientia clarum, in casibus dubiis decidere posse.

p. 239. Quaestio 1738 proposita, *an carcinoma mammarum, vulgo cancer appellatum, amputari debeat?* disquirat. Duplex praemium, ex quaestione altera vice exhibita enatum, partim Cl. L E C A T, partim Cl. L A S O N E redditum fuit. Prior considerationem generalem pathologico therapeuticam carcinomatis sequentem in modum exhibuit. Humores per tot series vasorum, sibi inuicem succedentium, in statu naturali apte transeunt, si vero iidem in vasis vel relaxatis vel ruptis extra limites propelluntur, vel etiam in vasis, praeter naturam constrictis, condensantur, tunc tumores vel molles vel duri oriuntur, ex quibus praesuppositis Noster in differentiam tumorum ulterius inquirat, et scirrhum et carcinoma species tumorum dicit, in quibus quasi concretio solidorum et fluidorum facta fuit.

p. 245. In causas postea inquiratur, nec virus aliquod peregrinum, nec singularis quaedam humorum deprava-

* Vid. varii commentarii in *Memoires de l'Academie royale de chirurgie* Tom. II. Paris 1753. 4to. et Commentarii nostri Vol. III. Part. IV. in recensione huius libri passim, in primis p. 599. et 612. seq.

prauatio, sed peculiaris irritatio cum dolore et tensione assumitur, et porro declaratur, quo modo consensus neruorum per suppressas mensium et haemorrhoidum euacuationes, melancholiam animique tristem affectum, contusionem validam, medicamenta fortiora, scirrhum quiescentem agitantia, ut per causas accessorias irritationem hanc adeo funestam producere valeat, et quo modo constrictio ex irritatione oriunda, vel fluida ad vicina vasa angustiora protrudat, vel in propriis vasis figat, ideoque concretiones efficiat. Hoc potissimum in glandulis fit, in quibus nimirum diuersae vasorum series sibi inuicem succedunt. Si obstructio in primo genere vasorum est, et circulatio adhuc in multis vasis libera manet, tumores scrophulosi nuncupantur; si illa ulterius progreditur et concretio magis compacta fit, scirrhus dicitur; si illa in ultimis vasculis occurrit, in quibus omnium vitalium humorum motus intercipitur, carcinoma appellatur, quod Noster ut gangraenam albam siue anthracem chronicum considerat.

Fibras neruosas ulterius productas et concretionibus fluidorum conspicuas ut radices carcinomatis, interdum occurrentes, considerare possumus. Circulus sanguinis interceptus venas varicosas sistit et haemorrhagias frequentes efficit. Lymphatica vasa ultra modum extensa et rupta, aquae copiam, quae ex his tumoribus saepius effluere solet, exhibent. Carcinoma itaque siue cancer est tumor durus tuberculatus, urentem dolorem in centro et inde lancinantem exhibens, in ulcus saniosum, rodens, foetidum, oris callosis reflexis conspicuum, mutatus. Si obstructio intima in parte tumore nondum affecta oritur, iam carcinomatica est et cancer primarius dicitur, si vero noua irritatione, quocunque modo inducta, tumor iam formatus, minime vero carcinomaticus, agitatur, cancer secundarius, siue scirrhus, in cancerum mutatus, appellatur.

p. 249.

p. 251.]

p. 253. Ad therapiam carcinomatis postea accedit Noster, nec resolutione nec suppuratione hos tumores dissipari posse monet, et quanta incommoda ex tentatis his medendi viis oriantur, ostendit. Cum igitur durum omnino videatur, exitiosum hoc malum intactum relinquere, vel extirpationem tantum in cancro paruo, in corporis superficie posito et nobili suscipere, methodos tractandi carcinomata, a variis in arte versatis viris propositas, breuiter recenset et simul ostendit, quo modo recentioribus temporibus haec chirurgiae pars magis exulta fuerit, ita, ut et cancer adhaerens et ulcerosus factus non nunquam cum optimo successu extirpatus fuerit. Quid vero tandem in dubio casu efficiendum est, ubi malum habituale factum humores ipsos corruptos reddidit? cum C E L S O respondet Noster, melius esse anceps eligere remedium, quam nullum.

Tandem, quo modo extirpatio suscipienda sit disquiritur. Veteres post incisionem ferrum candens ad radices extirpandas applicabant, alii innumera medicamenta, quorum vis caustica deprehensa fuit vel quae inuentores inter arcana retulerunt, ad carcinomata extirpanda apta iudicarunt: Noster vero his ipsis irritationem ceu primariam canceri causam augeri et vicinis partibus communicari ostendit, ideoque usum causticorum omnino suspectum reddit, et instrumentum secans, ut unicum remedium cancro extirpando conueniens, proponit.

p. 268. C L I O S Z P H V S L A S O N E eandem quaestionem sequentem in modum resolvere tentauit. Mammarum muliebrium substantia laxa et veluti fungosa obstructioni et obstructi humoris corruptioni praecipue obnoxia est; hinc crebra in eadem carcinomata oriuntur, quae ex partis situ et fabrica huiusque tumoris maligna indole declaranda sunt.

Cancer in genere consideratus est tumor durus, p. 273.
 sphaeroideus, dolens, qui mox ab initio malignam in-
 dolem obtinet. Est vero vel criticus, vel symptoma-
 ticus, prior oritur, si morbosa quaedam materia vi-
 vitae ex interioribus ad mammas defertur, si v. c.
 post quartanam febrem, praecipue ex visceris cuius-
 dam abditivi vitio, cancer in mammis generatur; sym-
 ptomaticus vero causam in mammis praesentem ha-
 bet, v. c. tumorem, cui vel per internam vel per ex-
 ternam causam vitium accedit canerosum, sic men-
 sium et haemorrhoidum suppressio, dyscrasia sangui-
 nis, valida contusio, et inepta medicamentorum ap-
 plicatio scirrhum latentem euoluunt. Cum igitur do-
 lori anodyna et lenientia, tumori emollientia, resol-
 uentia et discutientia, quae indicari videntur, saepius
 frustra applicentur et haud raro damnum afferant,
 chirurgica sectio tanquam sola et legitima medendi
 methodus eligenda erit. Quem ad modum enim
 SEVERINVS strumas mammarum cancro affines ex-
 trahendas statim proponit, sic carcinoma eo maiori iu-
 re ressecandum erit. p. 281.

Maligna enim materia morbi, metastatica crisi huc
 mota, exigit, ut eadem in sacco quasi collecta resece-
 tur, si tumor ex quacunque causa increscit et totam
 fere mammam occupat, si scabrosa superficies ex
 coadunatis glandularum inaequaliter tumentium su-
 perficiebus redditur, si dolor veluti ab acu candente pun-
 gens et lancinans interior observatur, si liuor hinc in-
 de sparsus et radices malignae, more pedum canceri
 fluuiatilis expansae, fluida vitalia ad centralem duri-
 tiem non ferri declarant, tunc, cum omnia medica-
 menta emollientia et resoluentia nociua sint, sola
 amputatio locum habet. Et in tristi casu, ubi ulcus
 sordidum fit tetrumque odorem spirat, praeter ea in-
 signem dolorem et non raro haemorrhagias efficit,
 sectio negligenda non est, cum enim et hoc in casu

topica semper noxia inuenta fuerint, amputatio, licet rarius ex voto cesserit, tentanda tamen est.

p. 289. His itaque praemissis casus, ubi cito et tuto secandum est, recenset Noster, non nullos tamen subiungit, ubi, cum et sectio frustranea sit, ab ea abstinendum esse ipse iudicat. Tandem quasdam obiectiones circa amputationem canceri factas remouet, et in fine monet, ignem causticum et intensiores dolores efficere et euidentem vim repellendi virus cancerosum habere, hinc sectionem semper praeferendam esse.

p. 296. Quaestionibus anno 1739 de medicamentis repellentibus et anno 1740 de medicamentis resoluentibus propositis, sequentibus annis praemium non adiudicatum fuit, hinc dissertatio prior, in qua *diuersae species medicamentorum repellentium, eorum agendi ratio et usus, quem in diuersis morbis chirurgicis praestant*, definienda erant, ad annum 1741. iterum proposita fuit, et duplex praemium Viri Cll. ALARY et KÜLBEL obtinuerunt.

p. 301. Prior medicamenta repellentia sequentem in modum diiudicat: sunt nimirum ea, quae humores, ad partem morbosam progredientes vel ad eam iam deductos, ad massam humorum reprimunt. Haec ut simplicia et composita in tres classes coniiciuntur, vel enim aquosa vel acida vel terrestria sunt. Ad aquosa referuntur aqua simplex, nix et glacies, ex vegetabili regno plantae succulentae, v. c. lactuca, nymphaea, narcoticae v. c. solanum, cicuta, hyoscyamus, ex animalibus serum lactis et albumen oui. Ad acida pertinent ex vegetabili regno succi citri, acetosae etc. ex minerali vero nitrum et vitriolum, ex praeparatis acetum et acida mineralia varia. Ad terrea medicamenta plantae adstringentes bistorta, tormentilla, pentaphyllum etc. nec non ex terris bolus armenus et terrae sigillatae variae referuntur, quibus et lithargyrium additur. Plura habet Cl. Auctor, nos praecipua exempli causa allegare volumus. Agend

Agendi rationem veteres in refrigerio posuerunt, P. 305.
 quod non actu, sed potentia in illis est, et adstrictio-
 nis effectum praestat, hic tres gradus admittit, quos
 vel varia medicamenta vel diuersimode applicata
 sistunt. *Defensua* dicuntur in primo gradu, si vasa in
 naturales limites constringunt, quo fluida apte trans-
 mittantur. In secundo gradu *repellentia* stricte sic
 dicta appellantur, si tonum solidorum per impetum
 fluidi contenti imminutum sensim sensimque augent,
 quo humores in circulum aptum et liberum reduci
 queant. *Stiptica* tandem sunt in tertio gradu, ubi
 fibras vasorum ita crispant, ut diametro ferme sublata
 accessus fluidorum ulterior denegetur. Praecipua ho- P. 307.
 rum medicamentorum vis in nervos est, per quos in
 vasa sanguifera et lymphatica agunt. In nervis enim
 repellentia agitata fluidum nerveum in motu com-
 pescunt, languentes huius fluidi motus tono reddito
 excitant, et irregulares impetus coercent. Caute ta-
 men in applicatione versandum est, ne inconsiderato
 usu veterum sententia, quod nimirum frigida nervis
 inimica sint, confirmetur.

In primo igitur gradu actionis repellentium inter- p. 311.
 dum imminet mala praevertuntur, v. c. si ad per-
 niones dispositi ante accessum vehementissimi frigoris
 articulos niue fricant; interdum his ipsis principio
 mali oriundi obsistitur, v. c. aestus insurgens epithe-
 matibus acidis compescitur, contusionis effectus his
 acidis cum bolo mistis, et si dolor urget, additis ano-
 dynis coercentur, vasa tamen ita disposita sint, ut
 circulo liberiori humorum nihil se opponat. In vul-
 neribus simplicibus tumores et inflammationes vici-
 nae decoctis adstringentibus vel aqua aluminosa re-
 primuntur.

Dum in alterum gradum repellentium inquit p. 313.
 Noster, omnino monet circulum sanguinis non mu-
 tari, sed vasis tantum illum tonum reddi, qui fluida
 apta conuenienti modo reducere valet, quamobrem

dispositiones et solidorum et fluidorum, quae huic medicamentorum operationi respondet, studiose diiudicat. Si enim solida iam nimis stricta sunt, aquosa tantum et acida mitiora conueniunt, si vero tumores laxi et aquosi obseruantur, acida fortiora et terrea magis conducunt. Fluida vero in felici medicamentorum operatione dominio solidorum adhuc obnoxia sint, mobilia non coagulata, blanda non virulenta, bonae mixtionis non nimium resoluta. In contusionibus interim et ipsa sanguinis coagula interdum ab acidis admotis resoluuntur, et tensio nimia anodynus additis corrigitur; spiritus quoque aceti, sale ammoniaco admixto efficacior redditus, dispositiones

p. 317. gangraenosas non raro tollit. Tres casus potissimum sunt, in quibus stiptica siue repellentia tertii gradus applicanda sunt; primo in herniis, prolapsu ani et vaginae, aneurismatibus veris et varicibus; deinde ruptura vasorum sanguiferorum et haemorrhagia inde oriunda, tandem in vulneribus et ulceribus puris redditis et nunc consolidandis. In his tamen omnibus caute versandum est, ne effusiones salutare cohibeantur. Cum vero repellentia effectum suum praecipue in solida exferere videantur, Cl. Auctor quaestionem mouet, an non interdum in fluida immediate agant, et in massam humorum resorbentur? in huius rei testimonium quaedam phaenomena adducit, licet ipse fateatur, in his difficile rationem actionis definiri posse.

p. 322. Hanc ipsam quaestionem Cl. KÜLBEL, cuius obitum nuper indicauimus *, enodandam sibi sumsit, et omnem hanc doctrinam in tribus capitibus proposuit, quorum primum *de remediorum repellentium natura et diuersitate speciali* agit. Repellentia Cl. Auctori dicuntur, quae externe applicata partim humores in superficie corporis subsidentes, et extra va-

missi

* vid. Comment. nostr. Vol. IV. P. I. p. 169.

missos in oscula venarum et vasorum lymphaticorum reprimunt et massae humorum reddunt, partim calorem nimium inflammatorium coercent, partim ulteriolem decubitus humorum ad locum affectum impediunt. Agunt itaque in solida et fluida, et in refrigerantia, adstringentia et anodyna dispescuntur. Remedia plurima ad has tres classes pertinentia, quae hic fusius enarrantur, omittimus, cum praecipua paulo ante indicauerimus, et reliqua ex scriptoribus materiae medicae repeti queant.

In secundo capite *modum operandi repellentium* p. 335. describit Noster; refrigerantia in solida et fluida agunt, in his motum intestinum compescunt v. c. si aqua frigida ebullientis motum temperat, in illis fibras cutaneas crispant et ita fluida repellunt, uti exanthemata non raro recedunt. Ita ille haec medicamenta ut actu frigida assumit, et posteriorem effectum in solida ex sensu principii vitalis declarat, eundemque non mechanico physicum, sed physico moralem dicit. Mucilaginosa partim ad refrigerantia, partim ad acrimoniam inuoluentia referuntur. Adstringentia vera repellentia sunt eorumque effectus mechanice declaratur, terreis praeter ea vis humida resorbendi tribuitur. Narcotica specifica quadam vi instructa dicuntur, quam tamen ex principii vitalis sensu et emollientium indole deducere tentat Cl. Auctor.

Caput tertium tandem *de conuenienti et legitimo* p. 347. *repellentium usu* agit. Varii itaque casus adducuntur, ubi eorum usus noxius deprehenditur. Si enim in tumore, ulcere vel vulnere materia maligna, acris vel virulenta obseruatur, repellentia non nisi post massam humorum correctam applicanda sunt, hinc nec in illis, in quibus crisis naturae adest. A repellentibus quoque abstinendum est, in plethoricis et caochymicis corporibus, vel in quibus laesi visceris indicia apparent, in primis, si congestiones inflamma-

toriae, rheumaticae et arthriticae cum acutissimo dolore incedunt, vel parti nobiliori, in quam con-
 p. 357. uerti possunt, proximae sunt. Quibus praemissis illi potissimum casus recensentur, in quibus repellentia optimo cum successu applicantur. In genere ostenditur, omnia contraindiciantia paulo ante recensita examinanda esse, ante quam indicatio resolutoria suscipitur, et selectus aptissimorum remediorum instituitur. In summa inflammatione non efficacissima, sed moderatiora eligenda sunt medicamenta, hinc semper ad qualitatem inflammationis, indiuidui temperamentum et tempora morbi respiciendum esse. Noster abunde declarat, et examen praecipuorum medicamentorum repellentium, nec non cautelas circa eorum usum passim ex praestantissimis scriptoribus et propria experientia adducit, ideoque in phlegmones, erysipelatis et apostematis curatione, quae a causa interna deducuntur, nec non in symptomaticis ulcerum, vulnerum, fracturarum et luxationum inflammationibus veras medendi vias explicare tentat. Omittimus amplissimam tractationem, quae medicamentorum varias compositiones nobis exhibet, cum vera de omnibus iudicia vix ubique afferre, et cuncta ad casus speciales reducere nequeamus.

p. 420. Quaestio ultima, quae in hoc volumine continetur et anno 1742 proposita fuit, *diuersas species resoluentium medicamentorum eorumque agendi modum, nec non usum diuersis morbis chirurgicis accommodandum* exhibet. Praemium duplex Viri Cll. PONTIER et HVGON obtinuerunt et dissertatio Cl. MOPILIER prelo quoque digna iudicata fuit. Prior vero ex his argumentum sequentem in modum pertractauit. Ab eo, quod in motu solidorum et fluidorum aequabili accidit, ad statum morbosum concludendum est; vel enim robur solidorum augetur vel imminuitur, vel mixtio fluidorum varie vitata redditur, haec igitur, quae

quae intra solida stagnant, effectum resolutionis exigunt. Resolutio est dissipatio humoris, qui vasa vel nimium distendit, vel extra eadem missus fuit; exigit igitur dispositionem humorum aptam vel talem eorundem mutationem, sub qua vel in vasa iterum regredi, vel ex contextu celluloso resorberi et dissipari possunt. Natura saepius resolutionem ipsa et p. 425. sola praestat, et circumspecte omnino agendum eiusque vestigiis insistendum est, si operationes per remedia applicata adiuuare suscipimus; quamobrem, cum tonus vasorum auctus et imminutus, dispositiones morbosae variae humorum aliaeque causae congestiones diuersas forment, repellentibus, emollientibus, narcoticis, discutientibus, adstringentibus et aliis medicamentis opus est, si resolutionem apte praestare volumus, et resoluentia certa, quae semper effectum speratum producant, vix inueniuntur. Medicamenta vim suam et in solida et in fluida exercent, at tamen in consideratione operationum suarum vel ut ea, quae in solida agunt, vel ut ea, quae in fluida agunt, sigillatim contemplari et effectus inde pendentes ita deduci debent. Noster itaque classes p. 429. emollientium, narcoticorum, stimulantium, adstringentium constituit, et ostendit, quo modo vires eorundem ad resolutionem praestandam concurrunt, et his generatim praemissis varias medendi vias in tumoribus diuersis recenset, et indicantia et contraindicantia ponderat, quae in his, ut acutis et chronicis consideratis, occurrunt. Varietas enim applicandorum medicamentorum non tantum per successiuam tumorum mutationem, sed etiam per partis affectae fabricam et alia accidentia definitur, quam rem et Noster non nullis exemplis declarat.

Eandem quaestionem Cl. H V G O N sequentem in p. 447. modum pertractauit. Resoluentia sunt medicamenta, quae humores stagnantes attenuant, diuidunt, et
Kk 5 sensibus

- sensibus percipienda quadam perspiratione in vaporibus calidis et humidis propellunt, aerem praeter ea rarefactum, telam cellularem saepe distendentem, discutunt. Eorum itaque vis in volatilitate quadam posita est. Quo vero Noster rationem agendi melius declarare queat, tres classes constituit, et attenuantia, resoluentia stricte sic dicta et carminatiua separatim considerat. Attenuantia partem fibrosam sanguinis diuidunt, et solida, in quibus illa impacta haerent, irritant; Resoluentia stricte sic dicta naturalem tonum irritatione intendunt; carminatiua vehementius oleo subtili et sale volatili in nervos agunt, quo contractione sua distensionem flatuosae se magis opponant. His, in prima parte breuiter et ut nobis videtur non
- P. 450. satis accurate, expositis, in secunda parte et simplicia et composita medicamenta, quae ad has tres partes referuntur, in tabulis, nominibus tantum exhibitis, recensentur. In tertia tandem parte, quae usum resoluentium, in variis morbis chirurgicis explicandum, sibi sumit, ampla recensio plurium medicamentorum compositorum, quae a praestantissimis viris passim in scriptis chirurgicis allegantur, exhibetur, agit itaque de tumoribus cysticis, scirrhis, serophulosis, inflammatoriis, oedematosis et flatulentis, cum vero omnis haec tractatio tantum compilata sit, ulteriori recensione supersedemus.
- P. 491. Ultima dissertatio, quae idem argumentum tractat, Cl. M O P I L I E R Auctorem habet. Hic differentiam resoluentium ex ratione agendi desumit et usum ex diuersitate morborum definire tentat. Omnis ideo tractatio in duas partes diuiditur, quarum prima differentiam resoluentium ex effectu declarat. Resolutio humores stagnantes et partes continentes mutans in his vel relaxationis, vel roboris aucti effectus, in illis dissolutionem siue maiorem fluiditatis gradum praestat.

Hoc in tribus articulis ulterius explicatur, in quo p. 493.
 rum primo effectus resoluentium, ad vasa relaxanda
 aptorum, declarantur. Fluidae partes fibris se inter-
 ponentes solida relaxant, huc faciunt aquosae et oleo-
 sae, quae vere fluidae dici possunt; est tamen in his
 ea differentia, ut aquosa medicamenta sedatiua et anti-
 phlogistica sint, acriusque salia soluant, cum e con-
 trario oleosa calore potissimum excitata salia extricent
 et inde magis acria fiant, hinc saepius aquoso oleosa
 ut lac et mucilaginosa melius conducunt.

In secundo articulo effectus resoluentium ad vasa p. 495.
 roboranda aptorum recensentur, aut enim humida
 resorbent, fibras leniter exsiccant et ad motum quasi
 ineptas reddunt, haec passiva magis sunt, fixa et fri-
 gida; aut stimulo suo in vasa agunt, eaque constri-
 gunt fluidaque ita dissipant, haec actiua magis sunt,
 stimulantia et calida.

In tertio tandem articulo ea recensentur resoluen- p. 497.
 tia, quae spissos humores mutant. Humidi defectus
 et nimia vasorum actio fluida spissa reddunt, hinc
 optimorum fluidorum accessus et applicatio per vasa
 agilia reddita vitium tollit, quae quidem mutatio
 per emollientia, tum in fluida tum in solida agentia,
 et discutientia siue leniora stimulantia, quae scilicet
 fibras non crispant, inducitur. Coniunctae hae vires
 in saponaceis sic dictis medicamentis deprehendun-
 tur, quae optime forma emplastri applicantur, fluidae
 enim partes, quae in hac resolutione requiruntur; vel
 iam in spissis humoribus adsunt, licet immobiles sint,
 vel a partibus vicinis in suppressa per topicum medi-
 camentum perspiratione adducuntur.

In altera parte usus resoluentium per indolem p. 499.
 morborum accuratius definitur. Constrictio nimia
 et inertia vasorum usum resoluentium exigunt: in
 priori casu durities et dolor relaxantia medicamenta
 indicant, sed inflammatio sic mota eo respicere iubet,
 ut sedatiua et antiphlogistica eligantur; in altero casu
 inertia

inertia fibrarum stuporem et frigus ostendunt, si itaque nimia relaxatio est, tunc adstringentia fixa, si autem nimia inmeabilitas humorum observatur, resolventia, emollientia et discutientia requiruntur.

Haec generalius enunciata ut eo melius intelligantur, in duobus articulis ulterius declarantur, et in p. 500. primo quidem usus resolventium diuerso gradui et effectui constrictionis vasorum accommodatur. Constrictionis, quae ab irritatione pendet, effectus non tantum ratione causae, sed et ratione fabricae vasorum et diuersorum humorum contentorum variant. In inflammatione sic dicta alba, quae in serosis et lymphaticis vasis sedem habet, humores nimis aquosi sunt, et contractio vasorum non viuida satisprehenditur, ut calorem excitare queat, in ea itaque relaxantia oleosa pura, igne acria non reddita exigit Noster, cum laxas reddant fibras et acria irritantia inuoluant. Inflammatio, quae a contractione spasmodica arteriarum sanguinearum dependet, tres gradus constituit phlogosin, erysipelas, et phlegmonem. In phlogosi dolor, calor et rubor sine tumore et pulsatione sunt, cum in extremis arteriis, a corde admodum remotis, levis irritatio inueniatur, refrigerantia igitur conueniunt medicamenta leuiter austera, acida et aquosa. Erysipelas symptomata phlogoseos auctiora sistit, maiorem tumorem et vibrationem, nec non maiorem crispationem, hinc antiphlogistica relaxantibus miscenda sunt. Phlegmone tandem omnia inflammationis symptomata auctiora exhibet, in primis calorem insigniorem, hinc relaxantia et antiphlogistica in simili proportionem superhabenda sunt.

p. 503. In articulo altero usum resolventium ad diuersos gradus et effectus inertiae vasorum disponere suscipit Cl. Auctor, agit itaque de tumoribus aneurismaticis, varicosis, flatulentis, oedematosis, serophulosis, scirrhis variaque de inflammationis diuersae gradibus subnectit, in quibus ut in antecedentibus genera-

generalem medendi methodum tantum proponit, et ita, ut nobis videtur, non satis distincte resolventium usum definire potuit, cum in medicamentorum applicatione ad solida tantum, non vero ad humores contentos respiciat.

XIII.

Observationes quaedam botanicae et anatomicae, de vasis subtilioribus oculi et cochleae auris internae. Ad Vir. Ill. PAVL. GOTTLIEB WERLHOF, M. D. Auctore IO. GOTTFR. ZINN, M. D. Prof. Med. Extraord. Gottingae, 1753. 4. pl. 5½.

Duplicis generis, id docente etiam inscriptione, observationes in hoc libello occurrunt, quarum argumenta vero utique maiorem merentur, quam quae a nobis adduci possent, attentionem. Hinc ea tantum cum nostris libet communicare lectoribus, quae sunt praecipua.

Primam quasi partem botanicae absoluunt obser-
p. 1.
vationes; quibus mox ab initio catalogus plantarum fasciatarum augetur, qualem fasciam in *Moldauica*, *floribus calycem vix superantibus*. HALL. crescentem vidit Cl. Auctor, ita comparatam, ut duo rami, ex caule procedentes, in unum coaluerint, latum et fasciatum. Idem in *Andryala* ROY. occurrit, cui flores monstrosi inhaerebant, et in *Hieraciode* multicauli et multiflora. Porro et folia laxuriantia deprehensa sunt, tum quoad numerum, tum quoad situm; in *Astere Tripolii flore*, namque varia sese obtulerunt exempla, quibus duo, immo tria folia inter se concreuisse manifestum fiebat, quam mutationem ex delineatione prima in gemma deducit Cl. Auctor. Partium floris varietas quotidianis exemplis confirmatur, in calyce plerumque maior est constantia, tamen hunc

p. 6.

hunc etiam in *Atriplice*, *Sedo*, *Anacampserote*, foliorum et laciniarum numero discrepantem adnotauit Noster, et vel in his aliisque exemplis, ut reliquarum etiam partium numerus differret, nec ne, quo simul pateat, ex eo non admodum certum methodi fundamentum desumi. Certioris constantiae est, non omnes verticillatas plantas quinquifidum et monophyllum habere calycem, cuius rei varia exempla proponuntur et praecipue *Ocimum* adducitur, cuius calycis labium non solum superius, sed reliquae etiam quatuor lacinae singulae bifidae sint *. In *Sideritide Monspessulana* T O V R N E F. cuius descriptionem floris suppeditat Cl. Auctor, calyx bilabiatus et aristatus est, labio inferiori in duos dentes abeunte, superiore in tres maiores, medio trifido, lateralibus minori accedente auctis. In umbellis saepe inuolucris foliolum abundat vel deficit, et calycis folia atque structura flores compositos distinguit, quamuis et in his limites difficiles sint et crescendi ratio aliquam videatur mutationem posse inducere. Quo tandem in numero non esse genuinum methodi fundamentum ulterius declaretur, descriptionem plantae cuiusdam adiungit Noster, quae cum *Crotone*, a LINNAEO descripto sub nomine: *Croton foliis cordatis, inferius tomentosis* conueniat proxime, numero laciniarum autem, et petalorum defectu longissime absit.

p. 10.

Reliquae observationes emendationes continent, sic *Cakile angustifolia maritima* ob siliquas dispermas, et folia pinnata, pinnis longis linearibus, inter se distantibus, a *Raphano siliquis ouatis, angulatis, monospermis* differt: *Solanum Guineense*, caule spinoso, foliis vix emarginatis, oblongis, corolla dilute violacea,

* Et si autem miretur Cl. Auctor, a nemine animaduersam fuisse hanc denticulorum diuisionem, reticere tamen non possumus, in copiosis a nobis disquisitis exemplis, et superioris labii et inferioris nullam fuisse deprehensam.

cea, fructu maiori, a vulgari discrepat. In arenosis circa Berolinum sylvis umbelliferam inuenit Noster plantam, quae, consentiente eodem, magnam cum *Caruifolia* BAVHINI habet affinitatem, quam vero quantum ab *Angelica tenuifolia* RIVINI, et specie *Peucedani* G'MELINI, *Seseli* LINNAEI, differat, simul ostendit.

Sed ad anatomicas transimus obseruationes, quae p. 15. visus atque auditus organum, nouis adnotationibus locupletant. Ligamenta ciliaria olim iam Cl. Auctor musculosa fabrica destitui probauerat*, nunc eadem ex ineris vasculis, reticulum elegans efformantibus, componi demonstrat. Idque eo melius quo fiat, de choroideae tunicae fabrica primo exponit. Vasa vorticosa choroideae, quae cum Ill. HALLERO** venas esse adsumit, inter se decurrentes arterias, sed rectas habent, quae circulum iridis faciunt. Aliae vero arteriae per internam choroideae faciem antrorsum procedunt, et reticulo elegantissimo vasculorum minimorum obducuntur, cuius inuentionis laudem modeste Cl. LIEBERKÜHNIO tribuit Noster. Harum arteriarum ramuli recti absque omni ramificatione ulteriori ad plicas choroideae deueniunt, in iisque, miro modo flexi et inosculati, reticuli etiam sub forma, procedunt ad ligamenta ciliaria, unum autem maius vasculum, semper ad extremitatem plicae continuatum, alteri demum iungitur. His argumentis permotus, multum nunc dubitat, utrum ad mutationem lentis distantiae a retina ligamenta ciliaria in uniuersum conferre quidquam possint. In primis, quod in iridem vascula ligamentorum ciliarium non transeunt, nec nerui quidem ciliares, siquidem hi omnes per externam choroideae superficiem ad iridem dimittuntur. Ligamentorum ciliarium forman-

* In progr. de ligamentis ciliaribus. Gotting. 1753. 4. vid. Comment. nostr. Vol. II. P. III. p. 459.

** Vid. ibid. Vol. IV. P. II. p. 213.

formandorum necessitatem autem aliquam mechanica esse subsumit Cl. Auctor, quum choroidea tunica, maximum circulum oculi succingens, hoc minorem lentem circumdare debeat, et ea propter implicatas componi. Impedire autem haec ligamenta poterunt, quo minus radii lucis ad retinam deferantur alii, quam qui per lentem transierunt. Quod si tamen haec distantia lentis a retina mutationi sit obnoxia, eaque ab his ligamentis fieri nequeat, eandem musculorum obliquorum insertionibus actionique majori iure tribuendam esse demonstrare satagit Noster: hi namque agentes, spatium, tendinum insertioni intercedens, ad planitiem redigunt, et humorem vitreum, aliunde cedere nescium, antrosum cogunt, id, quod ex actione horum musculorum et anatome comparata corroboratur. Paullo obscurior usus reticuli vasculosi est, quem merito in secretionem faciendam ponendum esse concedimus, nec omnino refragamur Cl. Auctori, choroideam tunicam glandulae instar considerandam esse, in qua vascula non in acinos colligantur, sed in tunicam expansa, secedant, ex quorum ostiis, humor aqueus maximam partem proveniat. Siquidem hic ex iridis vasculis paucioribus, et inter duas etiam laminas cellulosas constitutis, deriuari nequeat. Hae laminae in humano quoque oculo facile conspiciendae sunt, anteriorem autem ita crassam in bubulo oculo detexit Cl. Auctor, ut hydrargyro repleta vasa non pellucere, in oculo vero humano, membranae albae specie separavit, extus quae tota villosa est. Ex hisce villis et vasorum vario decursu colores iridis pendent, cuius simul aliqua pars pigmento nigro adscribenda est.

p. 23. Vascula porro iridis unice ab arteriis, extimam choroideae faciem transeuntibus, sunt, quae iridis constrictionem perficere declaratur. In lente crystallina vero vasa quidem a processibus ciliaribus adcedunt, sed et alia tentamina ex centrali oculi arteria quaedam fuisse

fuisse adducta indicarunt, eorumque originem diuersam esse demonstrarunt.

Tandem oculi vasa, in externa scleroticae facie p. 26. reperiunda, adduntur, et breuiter *circulus anterior**, circa originem corneae ex sclerotica, *circulusque posterior*, circa neruum opticum constitutus, describuntur, ad quem posteriorem praecipue variae arteriolae, a centrali arteria aliisque, ad superficiem scleroticae accedentibus, pertingunt. Sed de omnibus hisce accuratissime expositis, propediem Cl. Auctoris eruditam oculi humani historiam explanaturis, noua dicendi orietur opportunitas.

Ab his ad organi auditus considerationem pro p. 27. gredimur, quae praecipue de cochlea, et deinde de aquaeductu FALLOPII aliisque externis ossis temporum partibus instituta est. Neque tamen haec omnem harum partium historiam absoluunt, sed singularia tantum quaedam annotata concernunt. Vulgo apicem cochleae promontorium efficere dicitur, quum priui tantum cochleae gyri initium hic situm sit, os autem hic durissimum est, et testa ossea, in foetu cochleam constituens, non ubique eiusdem est crassitiei, basis crassior, ad summum fornicem in tenuissimam solum laminam abit, cum aetate duriorum magis magisque euasuram. Foraminula etiam quaedam, ab aliis praeteruisa, hic animaduersa describuntur, quorum praecipue duplex series existit in sinus cochleae eminente linea. Lamina porro of p. 31. fea, quae modiolum cochleae interius ambit, ex duplici substantia constat, altera interior pars aspera est *in scala vestibuli granulis hirta et foveolis inaequalis*, *in scala autem tympani notatur multis lineis extantibus, ex ipso modio in illam porrectis*; altera pars fasciam sistit, leuem et microscopio perlustratam ex striis transuersis parallelis compositam, quae sensum breuio-

* vid. Comment. nostr. Vol. IV. P. II. p. 213.

breuiiores sunt. Conoideum quoque cauum magis quam conicum relinquitur, dum modiolus non ad apicem cochleae pertingit, sed ad finem secundi gyri terminatur, cuius verticem apex modioli, basin for- nix cochleae et peripheriam paries internus, ultimum gyrum absoluens, constituit. Lamina spiralis ad apicem usque delata, hamulum efformat, per quem scala tympani foramine in scyphi Cl. VIEVSSENI cauitatem patet. Quantum autem haec a Cl. CAS- SEBOHMI descriptione differant, ostenditur. Ex his dictis simul utilitas harum partium quodam modo stabiliri potest, quae eo fere redire videtur, ut non tendantur fibrillae nerueae, quippe quod in earum actione non obseruatur, sed potius a tremente peri- ostio concutiantur, et quum variae striae sint trans- uersae ossae longiores et breuiiores, mox haec, mox illa, pro ratione facti tremoris singula vel cum vici- nis quibusdam ut contremiscat, effici poterit, quo facto nerui, his inhaerentes, simili afficiuntur ra- tione.

p. 37. De aquaeductus Fallopiani directione deinde, qui septo intercedente a canaliculo illo distinguitur, cui musculus stapedis inest, et variis aliis foraminibus tandem disquisitionem instituit Cl. Auctor, de qui- bus vero omnibus, quum eius in obseruando adhibi- tum studium ex iam adlatis luculentum reddatur, et subtiles eiusmodi adnotationes ipsae legi mereantur, plura iam hic non adferimus.



XIV.

Dissertatio inauguralis medica, qua quaedam de neruo intercostali notantur. Praefide D. CASIMIRO CHRISTOPHORO SCHMIEDLIO, Anat. et Botan. P. P. O. Respondente *Ioh. Gerold*. Gienga Sueuo. Erlangae 1754. 4. pl. 4 $\frac{1}{2}$. tab. aen. I.

Quam controuersa nerui intercostalis origo ab antiquis fuerit temporibus, et nostris etiam esse soleat, anatomes studiosis res est maxime nota, et singulari etiam scripto a Cl. Auctore ante aliquot annos demonstratum fuit*. Est autem hic inter eos, qui sententiam tuentur hanc, neruum intercostalem suam etiam a quinto pare neruorum repetere originem, et eius quidem secundo ramo. Varia contra propositam eo tempore explicationem monita fuerunt, quae iam nostra non facimus, eam potissimum ob rationem praesentis pertractationis iniicientes mentionem, quod totius nerui intercostalis decursus per corporis truncum nunc fuerit declaratus. Ita vero enarrabimus dicta, ut normam, a Cl. Auctore obseruatam, explanemus, quam in obscurioribus neruorum itineribus illustrandis, sequi possint alii et vel confirmare vel emendare. Probaturus autem, *neruum interco-* p. 31.
stalem, neque ex cerebri cerebellique, neque ex spinae medulla directe procedere, et hinc complexum unionis neruorum medullae spinalis cum quibusdam nervis capitis esse, notat eius originem in sinu ophthalmico ex p. 5.
sexto neruorum pari nunc simplici nunc duplici radice fieri, cui per canalem carotidis arteriae descen-

Ll 2

denti,

* Edidit nimirum: Epistolam anatomicam, qua de controuersa nerui intercostalis origine quaedam differuntur, ad IO. WILELM. WERNERVM, Med. D. & Prof. Publ. in Academia Regiomontana. Erlangae, 1747. 4. c. fig.

denti, secundi rami paris quinti propago accedit, quae circa primam dictae arteriae flexuram adiungitur, aliquando tota, aliquando ex parte tantum, ramulis aliunde quibusdam et ad auditus organum properantibus. Hoc facto nervus intercostalis, rubicundum et mollem constituit funiculum, sensim ad posteriora carotidis recedentem, et dum ex osse temporum exit, inuolucro durae matris partim, partim nervorum truncorum vicinorum concursu tectum. Hic enim nonum nervorum par non nunquam cum eo communicat, vagum seu octauum exterius posteriusque positum est, nec non occipitale. Inter ea nervus in ganglion cervicale primum intumescit, oblongo ovale, antice et postice planum, inferius gracile. Magnitudine tamen illud variat, licet utrinque ramos dispergat. Ex *interiore* scilicet latere secedunt haud raro duo magni ad pharyngem oesophagum et laryngem, quibus alii et hic descripti inconstantius adcedunt, tertius gracilis, quartus itidem ad laryngem, quintus maximus ex fine ganglii, cum aliis ad cardiacos pertinens. Ex *exteriore* latere retrorsum mittuntur ramus ad par occipitale, quandoque ad vagum, alii ad cervicales, varie communicantes; ex quibus tamen nullus ad quartum cervicale par a Cl.

p. 11. Auctore delegatus visus est. Truncus autem descendens ab hoc ganglio, musculo colli recto interno incumbens, eique nervos suppeditans, aut sine ramis progreditur, aut circa thyroideam inferiorem arteriam diuiditur in duos ramos, interiorem atque anteriorem. *Interior* supergreditur arteriam et varios ramos suscipit, descendens sub subclaviam transit, ad latera tracheae progressus, cum vagi paris ramis communicans, cardiacum quendam nervum constituit. *Exterior*, qui etiam posterior est et cum priori communicat, iuvante saepe minore ganglio, sub thyroidea arteria sito. Ex hoc autem rami posterius ad vertebrae secedunt, alii cum inferioribus cervicalibus

vicinalibus iunguntur, qua facta coniunctione itidem ganglion variae fit formae et situs, cervicale inferius. Idem hic ramus retrorsum procedendo in thorace, nervi intercostalis truncum constituit, quum autem minores rami ad cardiacos pertineant nervos, eorum historiam tradit Cl. Auctor; hi multum variant, et p. 15. ex gangliis iam dictis, mox hoc, mox illo, enascuntur, et ad varias cordis partes pertingunt. Truncus tamen nervi intercostalis, circa thoracis confinia, ganglion novum, thoracicum scilicet primum, efformat, in foetu et recens nato oblongum, in adulto latius et in cornua diuisum, ab inferna eius parte secedens truncus ad costarum capitula appropinquat, sub pleura latens cum nervis costalibus medullae spinalis totidem gangliis coniungitur, ramusculis saepissime bifidis, angulo insertionis discrepante. Deinde ab anteriore parte ramuli ex hoc trunco dimittuntur, ad venam azygos, arteriae aortae parietes locaque vicina, et ex inferiori loco circa vertebrae thoracis ultimas ramulos porrigit, qui *anteriorum intercostalis nervi truncum* efficiunt, ad vertebrarum corpora adscendentem et ad diaphragmatis appendicem anteriorem accedentem, in quam ramusculis datis ad abdomen pergit. Sub diaphragmate mox in ganglium semilunare ille definit, cuius conformatio in omnibus non eadem est hominibus, saepe ex pluribus coagmentatur lobis, quae quidem varietas ramorum etiam differentiam facilem inveniendam arguit. Longe singularis huius ganglii fabrica, in aliquo cadauere reperta, in addita icone sistitur, et studiose describitur. Strata nempe gangliosa, ut vocat, varia ex ramorum concursu efformantur, et inde plexus diversi, coeliacus et mesentericus existunt, quorum multiplex in viscera est distributio. Non tamen libuit Cl. Auctori omnium ramificationum ultimos definire fines, quorum descriptionem absque iconibus difficillimam esse sensit, quum ex multiplici

demum facta inter se collatione eorum, quid pro naturali habendum sit, intelligi posse arbitremur. Posterior deinde intercostalis nervus, ex thorace egressus, circa primae lumbaris vertebrae corpus gracilis redditur, usque dum ad primum lumbarem nervum ramus quidam, ad angulum acutum adscendens, ipsi adiungitur, trunco fere aequalis, quo facto ab eo rami ad lumbares vertebrae mittuntur, cum plexibus intercostalis nervi communicantes, tres eorum concatenatos ad aortam vidit Noster, ganglion super dictam arteriam formantes. Inferiores lumbares nervi suas radices ad angulos magis obtusos ad hunc deferunt, usque dum, ramis inconstantioribus in glandulas, hic occurrentes, lymphaticas datis, in lumborum terminis ad os sacrum exspiret. In sacro autem osse constitutus ab ipsis sacris nervis, novis auctus accessionibus, iterum crassior euadit, nouo etiam ad quemcunque sacrum nervo enato ganglio. Rami, ex dictis coniunctionibus egredientes, tum ad membranas, post intestinum rectum sitas, tum ad posticam eius superficiem, et ad latera corpusque vesicae urinae, tum tandem ad coccygis os et terminos infimi ventris properant.

p. 31. Breuiter ex omnibus simul sumtis conditionibus utilitates patefcunt, nunc, quatenus febrile frigus inde dilucidetur, enarratur. Siquidem illud, infimo ventri et lumbis molestum, nervosorum filorum intricatorum singulares stricture significat. Porro ex quinti paris cum intercostali nexu, clauus hystericus, dentium dolor, aliaque explicationem inueniunt, et ex distributione mirifica ipsius nervi in pelui, effectus catameniorum haemorrhoidumque abundantium intelliguntur. Vberiore nervi expositionem alia se occasione daturum esse promittit Cl. Auctor, quam pro eius, in anatome peritia exhibiturum quoque esse speramus.

XV.

Obſervationes anatomico chirurgico - medicae
nouae et rariores, accurate descriptae iconi-
busque illustratae a IO. LVD. LEBERECHE
LOESEKE, Med. D. Berolini apud I. I.
Schützii viduam 1754. 4. pl. 6. tab. aen. 3.

Eo lubentius obſervationum rariorum, ad corporis
humani machinam, tum ſanam, tum morboſam
declarandam facientium, mentionem facimus, quo
maiores in noſtram ſcientiam utilitatem inde redun-
dare arbitramur. Continentur autem in paruo hoc-
ce libello aliquae, quae omnino videntur attentio-
nem mereri. Sunt earum quatuor, quarum confi-
derandarum neceſſitatem etiam Cl. Auctor in addita
praefatione, variis adductis exemplis confirmare an-
nititur.

Obſervatio I. de noua acetabuli ſcapulae, quod ar- p. 11.
ticationi cum humero inferuit, formatione per ſolam
αὐτογενεῖαν naturae, agit. Articulationum noua-
rum, per morbum factarum, exempla plura proſtant,
aliqua etiam a Cl. SALZMANNO deſcripta; in ſca-
pula tale quid accidiſſe, vix legitur adnotatum. Luxa-
tum autem humeri caput, ſub naturali ſua glenoidea
in margine anterioris coſtae paulo demiffiori loco, ad
locum, ad quem ſubſcapularis muſculi fibrae acce-
dunt, ſubſidit, et nouum, recipiendo humeri capiti
aptum, acetabulum efformauit ſenſim, circa ambi-
tum aſperum et inaequale, media ſui parte tamen
laeue. Ob friktionem ſimul intumuit eminens eius
margo, quod a nouo ſucco oſſeo adducto et poſt
deſtructum perioſtium laminamque externam oſſis,
factum fuiſſe perhibetur, apophyſis etiam coracoidea
plana magis euafit, et foraminulas pertuſa. Haec
momenta addita quoque declarat delineatio, dolemus
interim de motu huius brachii et ligamentorum ad-

haesione nihil rescire potuisse et animadvertere Cl. Auctorem.

- p. 15. *Obseru. II. demonstrat naturam errantem in conformatione partium corporis humani: exemplo membranae tympani duplicis et arteriae pulmonalis, quae loco canalis arteriosi tota in arteriam aortam terminatur.* Variam se scribit Cl. Auctor in peruestigando organo auditus dedisse operam, qua saepe repetita factum sit, ut in homine atque brutorum animantium haud raro ipsi occurrerint insolita. Vidit musculum mallei duplicem, stapedis crus breue in spinam extensum, et ad cochleam pertingens, similiaque; nunc potissimum de nerui acustici portionis durae progressu differit, in quo non nulla, quae ab aliis adnotata non sunt, obseruauit. Disquirat vero eam tantum illius partem, quae ab ingressu per foramen acusticum in aquaeductu FALLORII ad exitum eius latet, eamque ex situ suo extractam, cum iis, quos inuenerat, ramificationibus delineatam sistit, nec non zonam tympani, inter malleum incudemque transeuntem, et cum quinto neruorum pari coniunctam, ex ipso hoc dicto quinto neruo potius, quam ex septimo originem sumere argumentis euincere tentat. Describit autem iter nerui nostri sequenti modo: Neruum durum per proprium foramen, ad cochleam situm, transeuntem extrorsum flecti, sub dura meninge exeuntem, ossi petroso incumbere, ramo per hiatum aquae ductus cum neruo petroso, qui a secundo ramo quinti paris proficiscitur, iungi: porro ex curuatura ramulum ad mallei musculum internum dimittere, reflecti et aquae ductum ingredi, in hoc recta postquam descendit, ramulum musculo stapedio largiri, vel aliquando plures: in progressu ulteriori ad angulum acutissimum dare ramulum flexuosum ad cauitatem tympani, qui zona tympani est, quae vero partim cruri incudis longo adhaeret, partim tenuissimis filis duobus tribusque in membranam

nam tympani inferitur, alio in membranae arcam minorem abit: deinde hanc per membranam tenuem ad FOLII processum adcrefcere, inter mufculos mallei externum et internum pergere, illique filum tenuiffimum neruofum dare: iter poft in fiffura GLASSERI continuari, ab hac descendendo tubae incumbere, ramulos ad mufculos tubae remittere et tandem neruo maxillari inferiori ad angulum acutiffimum iungi, qui exinde craffior euadit. Ipsum autem truncum nerui duri ante exitum ex canali ramulis quibusdam cellulis processus maffoidei profpicere. His praemiffis duplicatam veram membranam tympani obferuatam ex adulto homine fiffit, quarum altera a confueta diftabat, nullumque cum malleo nexum habebat.

Quum deinde alia naturae, ut vocat, aberrantis exempla proponere vellet Cl. Auctor, in vasis potiffimum, quod anatomicis frequentiffime obuenit, fan- guiferis, varietates detectas adducit, et immediatum arteriae pulmonalis in infante transitum in aortam delineat, quippe quae non diuifa et bifurcata, fed tenuibus tantum ramulis in pulmones abiuerit. Alia occasione fimul memorat, fe omnes pulmonales venas unico trunco in auriculam pofteriorem terminatas vidiffe. Adduntur tandem malae conformationis documenta varia, quae forte ulteriori digna descriptione figillatim exponi potuiffent. Notamus enim, ubiuis Cl. Auctorem ad obferuationes certiores reddendas ex iis, quae ipfi occurrerunt, exemplis ea addidiffe, quae huic fcopo fatisfaciendi idonea ipfi vifa funt.

Obferu. III. docet naturam vi morbi fuperatam, p. 29. in primis exemplo, aboliti ferme intestini coeci et summe angustati coli in recens nato. Quum itidem huius rei demonftrandae caufa omnium, oeconomiam corporis animalis infestantium, morborum effectus poffint adduci, in os conuerfa varia vafa, ut corona-

riam cordis arteriam, ipsam ad iliacarum secessum usque osseam redditam aortam, glandulam pinealem petrefactam, similia que recenset Cl. Auctor, hacque data occasione varia praxin adiutura momenta perpendit. Singulare interim est, observasse eundem, ossa capitis in vetula sic abrafa, ut interna tantum lamina superfuerit, nec non praeter naturam factos diversorum ossium coalitus, eorumque habitum omnem mollem redditum. Inter alia porro est cordis ventriculus anterior, aneurismate permultum distentus, et ex partibus, praeter molem naturalem contractis, intestina sunt. Huc itaque pertinet casus, in tenera adhuc puella recens nata observatus, cuius nempe coecum et coli proxima pars angustata, colon autem quasi abolitum detegebatur, quam conditionem icon exprimit.

p. 39. *Observ. IV. Res contra naturam* proponit, ad quas veteres vermes simul referebant. Taenias easque numero etiam multiplices, inuenit Noster, et cucurbitinos, per se viuentes, singularesque vermes sistentes, observauit. Priorum etiam capita osculo rotundo instructa, non tamen acuminata vel oculis praedita detexit, et tandem vermes, ex carioso dente, vapore aromatico expulsos, describit atque depingit, qui anteriore parte simplices erant, posteriore in duas caudas plano conuexas diuidebantur.

Tandem, quod recentiorum experimenta, cum radice rubiae tinctorum in animalibus instituta eiusque vegetabilis efficacia, ossa rubro inficiendi colore magis magisque innotesceret, quae a se instituta fuerint experimenta, docet Cl. Auctor in *appendice*, quae *radicis rubiae tinctorum per experimenta effectus in cartilaginibus et ossibus animalium* monstrat. Vidit nempe in columba, tribus tantum diebus hoc cibo nutrita, cartilagines ossis hyoidis, laryngis et tracheae eleganter rubicundas euasisse, in cane deinde, per rubiam pasto, et emaciato, post aliis cibis iterum

iterum reſecto, poſt quatuor adhuc annos dentes rubere vidit, ex quo non adeo fugacem hanc, oſſibus colorem inducendi, vim eſſe conici poſſe arbitratur.

XVI.

Graecorum chirurgici libri **SORANI** unus de Fracturarum ſignis: **ORIBASII** duo, de Fractis et Luxatis e **Collectione NICETAE** ab antiquiſſimo et optimo codice Florentino deſcripti conuerſi atque editi ab **ANTONIO COCCHIO**, Anatom. Prof. P. et Antiquario Caefaris. Florentiae e typographia Imperiali. 1754. fol. 2 alph. 5 pl. 1 tab. aen.

Cum **Cl. COCCHIVS** ſtudium rei medicae ita inſtituiſſet, ut cum literarum graecarum ſcientia coniungeret, perluftraretque editos ineditosque graecorum de re medica libros, incidit in bibliotheca Medicea in codicem, dudum praedicatione clariffimorum virorum, **HOLSTENII**, **BARTHOLINI**, **SPONII**, **TOLLII**que nobilitatum, qui ab **LASCARI** in Italiam allatus, et per **CLEMENTEM VII.** in eam bibliothecam illatus eſt, continetque Corpus medicorum graecorum, ad chirurgiam pertinentium, conſectum a **NICETA**, ſaeculo undecimo exeunte, vel duodecimo ineunte, ſcriptum in membrana nitide, literis rotundis, raris interpunctionibus, itemque apicibus et notis. Hunc codicem cum diligentius inſpexiſſet, vidit in eo eſſe partim plane ineditos libros, partim, quorum tantum latinam verſionem haberemus, denique etiam, per quos edita exemplaria medicorum graecorum pluribus locis emendari poſſent. Itaque induxit in animum, in primis ineditos libellos publici iuris facere, praefertim impellentibus clariffimis medicis, **BOERHAAVIO**, **MEADIO**,
ad

ad extremum etiam ANT. ASCEVIO, Britanno, graece doctissimo. Id quo modo fecerit, et quid ei debeat res literarum publica, quam breuissime poterimus, demonstrabimus.

- Primum exhibet conspectum totius Collectionis, adpersis literariis quibusdam animadversionibus, unde emendari supplerique possunt, quae de ea Collectione tradunt FABRICIUS B. G. Vol. XII. p. 1778.
- P. 34. alique. Sequuntur tria epigrammata in laudem NICETAE versibus iambicis, ut mos illorum temporum tulit, non usquequaque legitimis. Ea excipit SORANI *de signis Fracturarum* libellus, cui subiiciuntur ex ORIBASII Collectione medica *Liber XLVI. de articulis excidentibus* s. *Luxationibus* ex iisdem et praeter ea *Asclepiade*. Ad extremum, velut corollarium, additur *varietas lectionis* e codice MSt. Florentino CELSI, pertinens ad Lib. VIII. in quo de eodem argumento agitur, h. e. de Fracturis, grata futura iis, qui CELSUM emendatiorem edere velint, quod nuper in animo habebat Cl. GUNZIVS, multis librorum veterum subsidiis instructus: nunc spes est facturum Cl. BLANCONVM, haud paulo ab literis antiquis instructiorem. Graeca e codice, satis vitiose scripto, emendate edita sunt, addita versione bene latina, perspicua, graeci-que bene consentiente. Notae sunt paucae et breues, sed bonae, et plurimum exquisitae doctrinae habentes. Ab iis primum hoc quisque expectet, ut loca GALENI, unde excerpta SORANI, ORIBASIIQUE repetita sunt, indicentur. Sed eo labore, utique immenso, et plerumque inani defungi ubique noluit Cl. Editor. Ac profecto id sufficebat fieri locis iis, ubi corruptio aliqua aut obscuritas comparisonem GALENI desiderabat: quibus locis id facere Vir doctus non neglexit. Sed distinctius agamus.
- P. 55.

SORANOS quinque aut sex historia medicinae commemorat. Horum ei COCCHIUS libellum de *fractu-*

fracturis tribuit, quem *SVIDAS* Ephesi natum, et Alexandriae eruditum, Romae medicinam fecisse magna cum nominis fama, sub *TRAIANO* et *HADRIANO*, tradit, nulla tamen eius coniecturae ratione red-
dita. Libellus inscribitur ille quidem in codice *de p. 44.*
signis Fracturarum in Caluaria, sed agit de *signis Fracturarum uniuersarum*, estque titulus ille a manu non prima adscriptus, et ad primam libri particulam pertinet.

In caluaria genus est fracturae, quae fit ab corporis acuti illapsu. Eam scriptura vitiosa apud *PAV-
LVM*, etiam *GALENVM*, facit *ἐκκοπήν*, perperam, pro *ἐγκοπήν*, ut mox alteras species duas *ἐκγείσματα* et *ἐκπίεσματα* pro *εγγ.* et *εμπ.* Noster e Codice Florentino omnia ista composita edidit ex *ἐν*. Ceterum ita frequens est ista in multis talibus verbis confusio, ut subinde suspicari liceat, utramque scripturam rectam esse, cuius nec exempla certa desunt. Nam patria, et mater dicitur *ἐκτεκῆσα* et *ἐντεκῆσα*, itemque proles *ἐγγονα* et *ἐκγονα* etc. Nec dubitemus *ἐγκοπήν* et *ἐκκοπήν* recte dici, cum etiam *ἐκκόπτειν* ita saepe pro *ἐγκόπτειν* reperiatur in bonorum librorum locis, nihil de menda suspectis, ut nimis multa loca corrigenda sint, si ea omnia vitiosa pronuntiare velimus. Sed forte quis nec hoc dubitet facere. *Ἐμπιέσματος* effectum *SORANVS* facit etiam *p. 48.*
torporem: quod vehementer probat *COCCHIUS*, sed grauiorem docet, et perniciosiorem sequi solere eo, quem *SORANVS* commemoret. Nam confractis officulis vertebrarum, medullam, per ea descendentem, comprimi, pungi: atque ea irritatione inflammari necessario subiectas corporis partes, uniuersas resolui, vesicae denique et intestini recti vim constringentem ita frangi, ut excrementa et urina vel excerni nequeant, vel sine ullo hominis nisu prorumpant. His animaduersis, saepe se suspicatum ait, vertebrae alicuius processum spinosum confractum

Etum esse, idque se verum deprehendisse, quoties a morte cito consecuta corpus inciderit, etiam cum nullo modo vertebrae excidissent. Veteres existimasse, eas noxas a vertebriis luxatis venire, cum sint a fractis. Atque ad eo saepius accidere expertus tradit, contra quam veteres crediderint, ut frangantur ossicula illa, quam ut luxentur.

P. 51.

Talum SORANVS negat frangi, quia contineatur fibula, et κυβοεδεῖ, *osse cubo simili*. Pro eo verbo Vir Cl. legendum suspicatur σκαφοειδεῖ. Nam os illud cubiforme non attingere talum, sed os *naiculare* cum eo committi. Perplacet viri docti ratio, sed longius recedit correctio a scripturae vestigiis. Lenius fuerit, corrigere κυμβοειδεῖ, quod synonymum est σκαφοειδεῖ, et ab edito verbo una modo litera differt, quam satis constat a librariis saepe vel detrahi, vel addi alieno loco. Quodsi κυβονδεῖ verum sit, intelligendum coniicit os calcis, quod eo nomine appellasse videatur et ipse SORANVS, proxime praecedentibus verbis et BACCHIVS apud EROTIANVM in verbo κυβιτῶ.

Oribasiana quoad e GALENO ducta sunt, hunc usum praestant, ut per ea vulgata GALENI lectio permultis locis (in quibusdam etiam HIPPOCRATIS) emendari possit: Quod singulis locis monere Cl. Editor non neglexit*. Iuvat unum locum apponere, ita corruptum et lacunofum, ut intelligi non possit: unde etiam ab ALDO stellula notatus est. Is est in Comm. I. de Artic. T. V. ed. Basil. p. 586 (non 589, ut operae dederunt) lin. 14. Ibi sic vulgati libri habent: ἐν τοῖς μυσὶν ὡθεῖν αὐτὸ χρεὶ πρὸς τὴν ἐναντίαν χώραν ἐμβαλόντα τῶν μυῶν ἀνασπασθὲν εἰς τὴν μασχάλην ἐνεχθῆναι. E libro NICETAE autem sic plenius editum est: ἐν τοῖς - - - τῶν μυῶν. ἐν τῷ δὲ τῷ ἔργῳ κίνδυνός εἰς τὴν κάτω χώραν ὀλισθῆναι αὐτὸ, πρὸς τῶν μυῶν

* Vt pag. 58. not. 6. 59, 10. 12. 16. 17. 62, 4. 65, 4. 5. etc.

μυῶν ἀνασπασθὲν εἰς τὴν μασχάλην ἐνεχθῆναι. Atque hunc fere sensum expressit **VIDIVS**: unde colligere licet, eum in loco hoc vertendo usum esse libro graeco **MSto** meliore ac pleniore vulgatis. Nam olim hic mos fuit virorum doctorum, qui graecos scriptores facerent latinos, ut codices meliores inspicerent, et in locis corruptis eos exprimerent, sine omni ostentatione et iactatione, quae nunc in talibus obtinet.

Notulas autem **COCCHIVS** etli perpaucas addidit, eaeque maxime habent indicia locorum **GALENI**, unde sua excerpfit **ORIBASIVS**, tamen passim etiam in iis occurrunt alius generis, eaeque exquisitae eruditionis observationes: quarum aliquot speciminis causa ponemus, ad vocabula chirurgica pertinentes. **GALENVS** in *Exposit. Voc. HIPPOCR.* in v. *Αἰς*, p. 92. nil aliud interpretandi causa ponit, quam ὄργανον, contentus nomine generis, ut in obscuris glossis saepe faciunt Glossographi. Item **SVIDAS** solum hoc, τεκτονικὸν ἐργαλεῖον. Nec plus **FOESIVS** in *Oecon. HIPP.* aut **STEPHANVS** in *Thes. G. L.* At ex **HELIODORI** loco, cuius excerpta dedit **ORIBASIVS**, patet, fuisse partem terebrae, per quam circumagitur, h. e. arcum cum habena, ut exprimitur a **IO. ANDR. CRVCIO**, in *Officin. Chirurg.* p. 10. Atque huic coniecturae fauent verba **HIPPOCRATIS** de articulis, c. 14. p. 770. ed. **LIND.** quem in animo habuisse **GALENVS** videtur, ubi parili motu agitari **HIPPOCRATES** ait *ferram* et *αἰίδα*, tum **PHILIPPI** versus in *Anthol. VI. epigr. antepen.* καὶ γύρας ἀμφιδέτης αἰίδας, denique **POLLVCIS** locus X, 146 ubi *τρυπάνια τρυπανίας ἔχοντα*, ex inscriptione antiqua ipse explicat, ἴσως τὴν αἰίδα.

κυκλίσκας apud **GALENVM**, et hinc apud **ORI** p. 108. **BASIVM**, Lexica interpretantur *scalpra caua* et *excisoria*. Sed **COCCHIVS** rectissime correxit, et in textum adeo Oribasianae orationis recepit *κοιλίσκας*. Nam etsi nulla MSS. librorum auctoritate nititur, at auctorem

auctorem habet HESYCHIUM, in quo est κοίλισκον, κοῖλον. Tum, ubi in GALENI vulgatis est τοῖς κυκλίσκοις, Oribasianus liber praefert τοῖς κοίλοις, quod forte per compendium, aut negligentiam librarii factum est e κοιλίσκοις. sed tamen et τὸ κοῖλον potuit

p. 118. esse instrumenti nomen. Illa quoque est bella emendatio, cum in loco ORIBASII, ubi ex ARCHIGENE de ὑπερσαρκώσει praecepta ponit, eamque medicos demere posse ait, vel medicamento exedente, vel scalpello, ἀποδήσαντας, cauentesque, ne modus excedatur. Ibi pro ἀποδήσαντας, quod sane ineptum est, reponit, mutatione leuissima, ἀπεδίσαντας, *complanantes*. Nam HESYCHVS ἀπεδίζειν interpretatur ὁμαλίζειν, ex ἀπεδόν, quod est ὁμαλόν, *plinum*.

Ad ASCLEPIADIS fragmentum, quod ante hos decem annos iam ediderat separatim Florentiae, repudiat opinionem eorum, qui auctore PLINIO XXVII, 3. eum POMPEII MAGNI aetate vixisse dicunt. In quo nititur maxime CICERONIS loco Or. I, ubi CRASSVS orator ait, eo se medico et amico usum esse. Sed id argumentum nobis hanc vim non habere videtur, ut PLINII auctoritatem deferendam putemus. Neque vero credibile est, PLINIVM, in re non longe remota a suis temporibus, errasse, qui in aliis longe remotioribus rebus tanta diligentia est usus. Illa autem mera coniectura est, cum ASCLEPIADEM iam mortuum fuisse putat, quo tempore ista loqui CRASSVS apud CICERONEM fingitur. Quid impedit, quo minus CRASSI medicus fuerit ASCLEPIADES, et tamen ad POMPEII mortem vixerit, cum centum amplius annos vixisse tradatur. In eo autem ASCLEPIADIS fragmento commemorantur duo exempla femoris luxati et sede sua expulsi ab longo aut graui morbo sine vi externa. Ad eum locum, quia ea res raro accidit, quae commentatus est Cl. COCCHIUS non ingrata fore sperauimus le-

p. 154. storibus nostris: itaque ea adscripsimus: *Vitiatorum*
sic

sic femorum exempla oppido rara, ASCLEPIADEM, ostendunt, in visendis aegris operam diu dedisse. Nobis semel licuit anno MDCCXLV. cultello corpus aperire hominis tabe ischiadica extincti, in quo caput femoris sua sede prolapsum vidimus. Fuit is DOMINICVS PALATIVS, famulus noster, cui crus dextrum ab ineunte aetate debilius fuerat, et aliquantulum valgius longiusque, ut leuissime claudicare videretur. Annum agenti XXXIII. ob equi casum, cui insidebat, femur dextrum ad terram compressum fuit: inde tamen parum doluit, inceptumque iter biduum equitando perficere potuit. Bene valuit duos menses: sed rursus iter faciens mense decembri, cum ex equo descendisset, et aliquot passus cum grauibus ocreis ambulasset, subito dolore, ab ipsius coxae sinu ad ultimum pedem affectus fuit. Qui dolor etsi statim remitteret, nunquam tamen deinde in coxae articulo euauit, imo sua munia interdum, non aegre obeunti, ad noctem quotidie dolor increfcebat, atque una debilitas, ita, ut mense demum ianuario stare et ambulare nequiuert. Iacenti nullus ibi tumor apparuit, femur vero attolenti dolor ingens intimus ad coxam oriebatur. Non defuit illi quidem neque consilium neque opera chirurgiae principum BENEVOLII atque NANNONII: Sed crus altero longius plus pollice fuit, coxaque admodum gracilior, et attollendi femoris facultas ablata, cum conuertendi satis integra permaneret, totiusque corporis macies sensim et fabricula superuenit, et exeunte martio sub trochantere exteriori tumor latus paulum extans sine dolore et rubore deprehendi potuit, mollis in cute, materiamque intus mobilem tactu prodens. Quo lente maturescente, quamuis idonea medicamenta imposita fuerint, extremo aprili cutis ferro aperta puris aliquantum emisit, tenuis subliuidi, inodori. Linamentis iniectis, vel aridis, vel aqua cum melle madefactis, et calidae perfusione plaga diu nutrita fuit. Cumque ulcus nunc purgari, nunc putrescere, iterum-

Tom. IV. Pars III. M m que


que purum fieri ac sanari videretur, et mouendi, ac leui quoque adiuumento sustollendi cruris facultas augeri, febris magna cum horrore et frigore accessit, et in inguine totus locus intumuit, coxaeque exterior, ulcerisque ima pars, quae caua antea fuerat. Intumuit quoque pes, et crus omnino immobile, integro crure non nihil breuius, cum antea longius et aliquando aequale fuisset. A plaga puris copia manauit, unde tumor inguinis minuebatur, ibique corpus globosum, durum, non dolens tactu percipiebatur, quod caput femoris extra sinum coxae promotum esse coniecimus. Quotidie tum sponie tum comprimendo multum puris albi crassique emissum est, quo denique imminuto ac tenuato, et ulcere albido atque arido, tabida macie homo consumptus, et postremo breui pulmonis inflammatione extinctus est. Dissectum cadauer magnam puris subuiridis copiam ostendit, musculorum interstitia recti et vasti exterioris usque ad genu opplentis, et in ipsum articulum femoris ac tibiae eroso alicubi ligamento derivati. Musculi postici gluteus, medius praesertim, parte, qua femori accedit, gluteus medius, et minimus, et quicquid carnis est a crista ilii ad femur post trochanterem, corrupta omnia in pus versa fuerant, fibris aliquot subnigris confusis transuersis remanentibus, reliquiis musculorum pyriformis, geminorum, quadrati et obturatoris interioris, ita, ut ossis ilii superficies prorsus nuda, et alicubi erosa quoque fuerit, pus vero et per interstitia musculorum descenderat. Ipsum femoris caput extremis musculorum psoae et iliaci integris, sed gracillimis appensum, e suo sinu vel cotylae elapsum iacebat introrsum, paulo supra eiusdem cotylae supercilium. Vtrumque ligamentum capsulae ac teres abruptum et in pus dissolutum fuerat, cartilago tum capitis femoris, tum cotylae exesa, et ossea utraque superficies carie aspera erat. Ex quibus omnibus abunde patuit morbi principium ab ipso coxae sinu proximaeque ei exteriori parte fuisse, abscessu ibi exorto, vel
ab

ab inflammatione ob naturalem illarum partium habitum, vel fortasse ab iniuria extrinsecus illata, vasculis nempe collisis et ad inflammationem altius mouendam, penitusque conditam suppurationem faciendam comparatis. Patuit quoque femoris caput, non nisi disruptis ligamentis, musculisque validis absumptis, e suo sinu excidere potuisse. Duos praeter ea curationi nostrae traditos obseruauimus, quibus ab ischiadico dolore totum crus subito immobile, ac tumidum, et breuius uarumque factum fuit, aliaeque notae apparuere, quae femori promoto vulgo tribuuntur, qui cum diu quieti iacuissent, nulla restitutione tentata, moueri denique, claudendo tamen aliquantulum pede potuerunt. His ego omnibus valde suspicor femoris caput in ceruice fractum in sinu remansisse, reliquumque os initio diuulsum ab eo et debiscens fallacia signa dedisse, quasi totum os elapsum fuerit, idque postea obducto callo eidem capiti, etsi minus concinne adglutinatum, corpus sustinere ac ferre valuisse.

Haec COCCHIUS. Age vero quoniam Auctarium quoddam additum diximus e codice CELSI Mediceo: de eo quoque aliquid planius dicendum videtur. Est autem codex ille antiquissimus, correctus, sed multo post, manu B. MARCHIONIS PALAVICINI, adscriptasque habet quasdam POLITIANI emendationes. Nomen CELSI aliter quam ceteri exhibet, nunquam AVRELIVM appellans, sed A. CORNELIVM CELSVM, interdum tamen omisso pronomine atque adeo CORNELII nomine. Differt etiam capitum titulis liber iste ab ceteris codicibus omnibus, alios habens ac pauciores. Et ceterorum quidem codicum tituli videntur deberi auctori, non admodum vetusto, qui eos margini antiqui libri adscripserat. Memorantur enim in iis SORANVS, qui posterior CELSO fuit. Sed illi tamen reperiuntur in libris scriptis, etiam Florentinis omnibus, praeter unum illum antiquiorem et meliorem, de quo nobis

iam sermo est. Ab hoc autem cum absint, isque alios et pauciores habeat, credibile fit, exemplum **CELSI**, unde hic liber ductus sit, diuersum et antiquius eo fuisse, unde ceteri omnes manarint, consentientes illi inter se quam maxime, et ab hoc plurimis locis valde discrepantes. Itaque Cl. Editor existimat, de restituenda vera Celsianorum librorum lectione tum demum spem fore, si tertium quoddam, antiquius et emendatius exemplar, proferatur. Vt nunc est, Florentini illius auctoritas haud dubie maior est ceterorum, quam adeo non deferere debebant editores **CELSI**. Itaque praeclare fecit Cl. **COCCHIUS**, cum octauo libri accurata excerpta dedit, passimque loca **CELSI** protulit alia ex illius codicis lectione, ut p. 81. et aliis locis. Atque etiam p. 52. omnium codicum Florentinorum, qui sunt septem, notitiam dedit, seque facturum promittit, cum primum aliquid otii nactus fuerit, quod eum in Ep. VII. in **CELSVM** rogarit Cl. **MORGAGNIUS**, ut totius codicis varietatem proderet.

Ceterum in Codice **NICETAE** restant promenda porro hac tria: **APOLLONII CITIENSIS** Commentarii tres, in **HIPPOCRATIS** librum de articulis, **PTOLEMAEO** regi inscripti, quem Vir Cl. putat esse Cypri regem, **PTOLEMAEI AVLEAE** fratrem: **ORIBASII** de laqueis et machinamentis liber, latine tantum editus a **VIDIO**: denique locorum quorundam **HIPPOCRATIS**, **GALENI**, **ORIBASII**, **PAVLLI**, **RVFI**, **PALLADII**, emendationes. Quae ut pollicetur Vir Cl. se proditurum, si vires suppetant, et viris bonis edita placeant: ita, ut illae ipsi contingant, optamus; viris quidem peritis edita, et editoris diligentiam, doctrinamque in iis edendis, probari, certo scimus.



XVII.

Elementa Mineralogiae systematice disposita a
 FRIDERICO AVGVSTO CARTHEVSER,
 Med. Doct. Francofurti ad Viadrum. Impen-
 sis Pauli Sigismundi Gaebler. 1755. 8. pl. 8.

Quam in indaganda corporum naturalium per
 chemiam indole et miscela diu et cum laude pa-
 ter posuit operam, eam iam quoque in mineralium
 corporum contemplatione dignum tanti nominis pa-
 rente filium proſitemur posuisse. Etsi enim ipse se
 fatetur ingenuè Cll. virorum, LINNAEI, WALLE-
 RII, WOLTERS DORFII et in terris LVDWIGII
 pressisse vestigia, eum tamen sollertiori indagine tam
 externas mineralium contemplando qualitates, quam
 varias eorum ad se inuicem aliaue corpora relationes
 attendendo, multum omnino in facta hac minerali-
 um dispositione arbitramur adhibuisse studii atque
 operis, quod suo sibi iure vindicare possit. Septem
 vero constituit Cl. Auctor Regni sui mineralis Classes,
 iisque terras, lapides, salia, inflammabilia, semime-
 tallâ, metalla, et mineralia heteromorpha compre-
 hendit. Primae classis, terras complectentis, duos
 ordines constituit earum facilis vel difficilis in aqua
 dissolubilitas; inde terrae dissolubiles vel indissolubi-
 les. Alteram classem lapidum in quinque ordines
 disposuit Cl. Auctor, in lamelloſos, filamentosos,
 continuos, granulatos, aggregatos et diuisionis fun-
 damento ab aggregatione et natura molecularum de-
 sumto, quod affirmat firmitus meliusque esse, quam
 si cum aliis lapidum ad ignem relationem respexeris.
 In tertia classe quatuor occurrunt ordines, salium ni-
 mirum alcalinorum, acidorum, mediorum et stypti-
 corum; qui nouus, ab Auctore additus, duo gene-
 ra, vitriolum et alumen sub se comprehendit; ex-
 terno enim habitu aequè ac interna miscela a reliquis

quum differant, distinguere se eadem quoque iure posse Noster arbitratus est. Inflammabilium nomen quartae classi datum fuit vel ideo, quod generalior eius latiorque notio melius conueniat, quam specialior sulphurum aut bituminum denominatio; iam etenim duo constitui poterant ordines genuinorum et spuriorum inflammabilium; illis subsunt bitumen et sulphur; his autem humus maiori iure, quam terris, adnumeratur. Quinta classis, semimetalla complectens, tres habet ordines, nempe solida non malleabilia, solida submalleabilia et fluida: primum ingrediuntur bismuthum, cobaltum, arsenicum et antimonium; alteri zincum, tertioque additur mercurius ordini. Metalla occurrunt in sexta classe, in tres ordines subdiuisa, subuolatilia flexilia, subuolatilia dura et fixa. Primus ordo plumbum et stannum; secundus cuprum et ferrum; tertius comprehendit argentum et aurum. Vltima tandem classis exhibet heteromorpha mineralia tribus ordinibus, petrefacta vera, petrefacta spuria et figurata.

Atque haec est generalis huius mineralium distributionis conspectus, unde iam satis patere arbitramur, quid Noster praestiterit, quidūe cum aliis commune habeat auctoribus, quid contra noui addiderit tam in ordinum, quam in generum ac specierum facta dispositione. Iam per singulas classes earumque ordines eundum nobis esset indicandumque uberius, quae singulis subsint ordinibus genera et species, quique sint horum characteres essentiales aut differentiae varietatesque saepe occurrentes; sed breuitatis studiosi haec praetermittimus, illud unicum adhuc monentes, Cl. Auctorem ubique tam a qualitatibus externis mineralium, quam a relationibus eorum ad se inuicem vel ad alia, puta ignem et menstrua, aptos sufficientesque characteres generum aeque ac specierum desumxisse, varietates sedulo adnotasse,

tasse, illudque omne, quod ad systematicam mineralium dispositionem requirebatur, praestitisse feliciter.

XVIII.

Noua physico - medica.

Doctores et Professores medicinam docentes.

1) In Academia Rostochiensis:

GEORG. CHRISTOPH. DETHARDING, Phil. et Med. Doct. Sereniss. Duc. Mecklenburg. Regn. Consiliar. Aulic. Anatom. et Mathemat. superior. Prof. Publ. Ducal. * Ord. Collegii Ducalis Professor et Facult. Med. Senior.

GVSTAV. CHRISTIAN HANDTWIG, Med. D. Sereniss. Duc. Mecklenb. Regn. Consil. Aul. Med. Prof. Publ. Ducal. Ord.

IOH. BERNHARD QVISTORP, Med. D. et Prof. Publ. Ord. Ciuitat. Rostochiensis Poliater.

CHRISTIAN EHRENERIED ESCHENBACH, Med. Doct.

2) In Vniuersitate Auenionensi **:

SPIRITVS ROYX, Facultatis Medicinac Doctor Aggregatus, Professor primarius et Regens Ordinarius.

M m 4

IOAN-

* Bini enim priores professores a Sereniss. Duce Mecklenburgico constituuntur, *Ducales* ideo dicti, tertius autem, *Senatorius* dicendus, ab urbis senatu ex tribus illis eligitur candidatis, quos illud corpus academiae, quod professoribus senatoriis constat, nominandi deinceps Senatus, qui ex iis unum feligat, sistendi gaudet potestate.

** Scire tamen licet hosce iam nominatos professores a mense tantum octobri superioris anni ad eundem huius anni mensem usque publice docere medicinam

Auenio-

IOANNES FRANCISCUS DE LA FONT, Doctor
Medicus Aggregatus et Professor Botanices.

PETRUS LUDOVICUS MANNE, Doctor Medi-
cus Aggregatus et Professor Anatomes.

Stutgardiae societas eruditorum eum in finem
coiit, ut in physices, artis oeconomicae, ac in gene-
re in vitae hominum communem utilitatem atque in-
crementum eius generis scripta, quae ad illas scien-
tias pertinent, tum ex aliis eruditorum diariis de-
prompta, tum quoque alia suo marte elaborata, colligat,
singulisque septimanis unam plagulam edat. Quod utile ut iuuent institutum, omnes rogantur
eruditi, nouaque inuenta, tentamina atque proble-
mata, quae huc spectant, cum illa societate commu-
nicent; iis tamen omnibus sedulo neglectis, quae in-
certa sunt et inutilia, vel quoque nimis abstrusas ma-
thematicas inuestigationes, vel indecentia et acria de
principum edictis lata iudicia, continent. E con-
trario autem collectoribus valde erunt gratae obser-
uationes de agrorum cultura, metallorum fodinis,
morbis epidemice grassantibus methodoque eis me-
dendi optima; de variis rerum naturalium mutationi-
bus, aeris temperie, fructuum horaeorum prouentu
atque pretiis, natorum mortuorumque hominum nu-
mero, variisque nouis principum edictis, politiam
regnorum, commercia resque manuum opera paran-
das e. f. p. respicientibus. Si quis argumenta suppe-
dita-

Auenione. Is enim singularis nobisque certe adhuc
de aliis academiis numquam cognitus factus mos
apud uniuersitatem Auenionensem inualuit, ut ex
omnium doctorum regentium et aggregatorum, qui
dicuntur, numero singulis annis noui eligantur pro-
fessores medicinae, qui lectiones suas publicas per il-
lum habeant. Non numquam autem fit, ut unus al-
terque eorum, qui iam per totum annum, quam
debebant, docuere doctrinam, in suscepto munere
iterum confirmetur.

ditauerit, quae unam tantum explent plagulam, omnes, quae per totum annum prodibunt, schedulas accipiet absque ulla pro iis soluta pecunia; quodsi vero plures, pro earum singula duos reportabit florenos imperiales.

Singulis quoque annis praemium duodecim numerorum aureorum illi promittit haec societas, qui quaestiones ab ea propositas omnium optime soluet. Ea, quae ad proxime futurum annum referri debet, ita se habet: Quenam datur via et facillima, et optima et vilissima, vineas, quae humiliter positae sunt, ita praestandi tutas, ne gelu, quod veris iam tempore non numquam solet consequi, eis noceat? Porro quenam eius generis vinearum cultura est facillima et utilissima? Tandem vero, si quis humiles istos agros viti colendae aut propagandae prorsus non conuenire existimet, is modum doceat, quo alius generis fructus melius atque facilius inde colligi queant? En instituti alicuius, quod laudem mereri videtur, delineatio. Quicumque igitur nouum illud diarium possidere aut scripta quaedam ad eius collectores transmittere cupit, suas ideo dabit literas vel ad officinas librarias, quae sunt Stutgardiae, *Erhardianas* aut *Mitzlerianas*, vel ad rei cursoriae curiam Stutgardensem vel quoque Lipsiensem, imposito hoc titulo: *An die Verfasser der physikalisch-oeconomischen Real-Zeitung in Stuttgart*. Exemplum collectionis, quae uno anno prodibit, singulum pretio duorum fere florenorum imperialium vendetur.

Berolini praemio, de quo, ad futurum annum 1757 reportando, certent eruditi, ante breue tempus, die nimirum quinto mensis iunii a Regia Scientiarum Academia sequens proposita fuit quaestio: Num arsenicum, cuius magna copia in fodinis, e quibus varia eruuntur metallorum genera, reperiri solet, primum atque verum sit metallorum princi-

pium? An illud autem aliqua sit substantia ibi orta et excretionis cuiusdam ope progenita? Cuius quaestionis solutionem veris atque claris ideo captis experimentis solide confirmatam cupit Illustris Academia.

Holmiae Reg. Scient. Academia in publico, quem die tertio mensis maii habuit, conuentu praemia quoque distribuere coepit, quorum bina decem nummorum aureorum pretii singulis annis in posterum tradentur illis eruditis, qui optima Academiae obtulerunt scripta; id, quod fieri legimus ex testamento Ill. Comitis DE SPARRE. In una nummi illius memorialis facie conspiciuntur gentis *Sparriae* insignia, hisce circa extremum eius marginem positae literis: *Superstes in Scientias Amor FRIDERICI SPARRE.* Ex his nummis unum prima hac vice reportavit Ill. CAROLVS LINNAEVS, Eques Suecicus, Archiater, Med. Doct. et Prof. Vpsaliensis et plurimarum Acad. socius, quem sua in primis dissertatione de utilibus in Laponiae montibus et progerminantibus et studio colendis herbis superiore anno edita promereri Academiae visus fuit.

In eodem quoque publico conuentu eadem Ill. Academia sequentes, quos a nobis commemorari fas erit, Cll. Viros suis annumeravit sociis: ERICVM nempe GYSTAVVM LIDBECK, Med. Doct. in Acad. Suecica Lundinensi Regium horti botanici Praefectum, Facultatis Medicae Adiunctum et Histor. natur. Prof. Publ. Regium; porro IO. NATHANAEL. LIEBERKÜHN, Med. Doct. Acad. Nat. Curios. et Berolinensis, uti et Londinensis Scientiar. Societatis socium; tandem Parisiensem Anatomiae Professore Publ. MORAND, iuniorem dictum.

Gottingae Regia Scient. Societas Cl. XAVERIVM MANETTI, Caesarci horti botanici Florentini Inspectorum

Etorem et Academiae, quae physices atque botanices incremento studet Florentiae, Secretarium, iis nuper annumeravit, cum quibus ipsa literarum habet commercium.

Itidem, quae *Monte Pessulano* floret, Reg. Scient. Academia, Virum Cl. PETRUM CHRISTIANUM WAGNER, Sereniss. March. Brandenburg - Baruthini Consiliar. Aul. et Archiatrum ac Ciuitatis Baruthinae Physicum primum, Acadd. Imper. Nat. Cur. et Scient. Bononiensis, ut et Societ. Botan. Florentinae sodalem, in eorum, cum quibus epistolarum colit commercium, sociorum numerum mense martio adsciuit.

Ad nos quoque pertinere arbitramur Virum Ill. GEORGIVM Comitem DE MACCLESFIELD, Reg. Scient. Societat. Londinensis Praesidem, quem in b. LE MOIVRE locum, celeberrimi illius mathematici, inter socios suos extraneos retulit Reg. Scient. Acad. *Parisiensis*.

Eodem quoque illa affecit honore Ill. LEONH. EVLERVM, physicum illum et mathematicum, quo Berolinensis gaudet Academia celeberrimum.

Bononiae quae floret Scient. Academia, *Instituti Bononiensis* nomine potissimum celebris, die decimo quarto maii inter alios quoque illum rerum naturalium indagatorem Parisiensem Cl. BUFFON, elegit sibi socium.

A *Londinensi* tandem Reg. Scient. Societate locum in sociorum catalogo obtinuit die decimo tertio mensis martii Vir Cl. CAROLVS FRIDER. HUNDERTMARK, Phil. et Med. Doct. huiusque in universitate nostra Lipsiensi Prof. Publ. Extraord. Facultatis Medicae Assessor.

Gottingae

Göttingae mense maio huius anni a Pot. Magnae Britanniae Rege Archiatri, quem diu merebatur, honore condecoratus fuit Vir Cl. IO. GOTHOF. BRENDL, Phil. et Med. Doct. et Chirurgiae Prof. Prof. Publ. Ordinar.

Ibidem et ab eodem Rege Cl. GEORG. MATTHIAE, Phil. et Med. Doct. bibliothecae Academicæ Custos, Professor Medicinæ Extraordinarius nominatus fuit.

Ad Hispanos quoque percrebuit fama de meritis, quæ circa historiam naturalem in primis habet Vir Ill. CAROLVS LINNAEVS, paulo ante iam a nobis commemoratus, ita, ut Pot. eorum Rex inde commotus eum vocauerit *Madritum*, qui liberi Baronis titulo ac honoribus cohonestatus vitam ibidem degat, omnisque rei herbariae per totam Hispaniam supremam habeat curam, concessa simul ipsi potestate libero sacrorum iure utendi. Nondum tamen adhuc constat, num inuitationem illam secuturus? an potius, id, quod alii credere malint, in statione sua remansurus sit Vir meritis iam veris illustris factus?

Sub initium mensis aprilis *Moscouiae* diem suum obiit supremum LAURENTIUS BLUMENTROST, Med. Doct. Consiliar. Status et Petri primi, Magni nomen iure meriti, Russorum Imperatoris, olim Archiater et Academiae scientiarum Petropolitanae Praeses primum constitutus; eo autem, dum e vita excessit, tempore uniuersitatis, *Moscouiae* erigendae, Curator et nosocomii *Moscouiensis* Director.

Tubingae die mensis maii vicesimo e viuis creptus fuit Vir, dum viueret, fama meritisque celeberrimus, IO. GEORGIUS GMELIN, Med. D. Botan. et Chemiae Prof. Publ. Ord. saepius a nobis suo

suo tempore laudatus, de cuius vita atque scriptis proxime ad lectores nostros relaturi sumus.

Munus, quod eius morte vacuum factum fuerat, in fratrem, PILIPP. FRID. GMELIN, Med. D. eiusque in eadem illa academia *Tubingensi* huc usque Professore Extraordinarium *, delatum fuisse legimus.

Parisis nuperrime vitam cum morte commutavit IO. CLAVD. ADRIAN. HELVETIUS, Med. D. Pot. Regi Christianissimo dicto a consiliis sanctioribus, Ser. Gall. Reginae Archiater, nosocomiorum militarium Praefectus, e Reg. Scient. Acad. Paris. Reg. Scient. Academ. Berolinensis et Regii Nanceianorum medicorum Collegii socius, cuius alio tempore laudandi habuimus occasionem **.

Archiatri loco eum habuisse successorem legimus V. Cl. CLAVD. DE LA VIGNE DE FRECHEVILLE.

Ienae denique nuperrime die mensis iulii vicesimo secundo vivere desit vir inter physicos atque medicos multum famae consecutus, GEORG. EHRHARD. HAMBERGER, Phil. et Med. D. Physices, Chemiae et Praxeos Prof. Publ. Ordinar. Sereniss. Ducum Saxoniae stirpis Ernestinae Consil. Aul. Caes. Acad. Nat. Cur. Socius, Medicus prouincialis Ienen-sis, Facultatis Medicae Senior, cuius enarrandam vitam alii occasione reseruamus.

* Vid. Comment. nostr. Vol. I. P. I. p. 61.

** l. c. Vol. III. P. IV. p. 731 et Vol. IV. P. I. p. 99.



XIX.

Continuatio indicis Scriptorum, quae anno
1754. prodierunt.

GERAUDLY, *Abhandlung von Zahn-Krankheiten, nebst der Kunst die Zähne schön, weiß und gesund zu erhalten; Aus dem Französischen übersetzt. Strasburg, 8.*

Dissertation sur l'incompatibilité de l'attraction et de ses différentes loix avec les phénomènes; et sur les tuyaux capillaires. Par le P. GERDIE; à Paris, 12. mai.

IO. GESNERI Diss. de hydroscopio constantis mensurae. Tiguri, 4.

NICOL. GEORG. GEVE, *monatliche Belustigungen im Reiche der Natur, der hartschalichten Thiere, Gehäuse und Seegewächse; Deutsch und Französisch; bis 18tes Blatt; illuminiret. Hamburg, 4.*

CAROLI GIANELLAE Diss. de admirabili radicis Ipecacuanhae virtute in curandis febribus. Patavii, 4.

A new treatise on the diseases of Horses. By WILLIAM GIBSON. The second edition. 2 Voll. London, 8. c. f

Abhandlung von Vertilgung der Zug-Heuschrecken und den eigentlichen Hülfsmitteln, die sich auf eine richtige und natürliche Erkenntniß dieses Ungeziefers gründen. Auf Geneckmbaltung und Approbation des Königlichen Collegii Sanitatis zu Berlin herausgegeben von IOHANN GOTTLIEB GLEDITSCH. Berlin und Potsdam, 8.

IO. GEORG. GMELIN, Diss. de innocuo atque egregio corticis Peruviani in febribus intermittentibus usu. Resp. Georg. Christoph Heller. Tubing. 4.

PHILIPP. GOBBI, Diss. historiam amplectens et curam epidemicae febris, quae finiente anno 1752.

et

et incipiente 1753 Tergesti incolas vexauit, cum deductis thesibus. Viennae Austriac, 4.

Formulae medicinales cum indice virium, quo ad inuentas indicationes inueniuntur medicamina. In usum medicorum praxin inchoantium editae a IO. DE GORTER. Hardervici, 8. mai.

GRESSEL, *physical- und medicinische Abhandlung von der Hornvieh-Seuche.* Augspurg, 8.

Musaeum Ichthyologicum, sistens piscium indigenorum et quorundam exoticorum, qui in Musaeo L. T. GRONOVII asseruantur, descriptiones ordine systematico. Accedunt non nullorum exoticorum piscium icones aeri incisae. Lugd. Batau. fol. c. f.

IOH. AVG. GROTIANS *güldne Kunst Brandteweine zu brennen, welche die bisanhero ganz geheim gehaltenen Vortheile: 1) wie aller mögliche, in den Früchten steckende Wein herauszubringen? 2) zu verhüten, daß der Brandtwein keinen branderischen Geschmack bekomme, nach Anweisung einiger Tabellen und selbigen beygegebenen Erläuterungen, deutlich zeigt.* Nordhausen, 8.

IO. FR. GUTERMANN, *erklärte Anatomie für Hebammen.* Augspurg, 8.

Manuel des Médecins; ou Recueil d'aphorismes choisis, tirés des ouvrages d'HIPPOCRATE et de CELSE; recueillis par M. GUYOT et traduits en françois par M. P. R.; avec une preface sur l'utilité de cet ouvrage; laquelle contient un abrégé de la vie de ces deux grands médecins; les notes fort courtes et deux tables des matières; l'une latine et françoise, et l'autre françoise et latine, pour en faciliter l'intelligence et l'usage; Ouvrage tres utile à tous les Chirurgiens; à Paris, 12.

IOH. SIEGM. HAHN, *Unterricht von Kraft und Wirkung des frischen Wassers in die Leiber der Menschen, besonders der Frauen; Neue Auflage.* Breslau, 8.

Unter-

*Unterricht vom Seidenbaue, oder I. B. DV HALDE
chinesische Nachrichten, wie mit dem Seiden- und
Maulbeerbaum zu verfahren. Wolfenbüttel, 8.*

Iconum anatomicarum, quibus aliquae partes corporis humani delineatae traduntur, Fasciculus VII. Arteriae cerebri, medullae spinalis, oculi. Auctore ALBERTO DE HALLER. Gottingae, Fol. c. f.

GEORG. ERHARD HAMBERGER, Diff. inaug. de tremore. Resp. Laurent. Christian. Claussen. Ienae, 4.

Eiusd. Diff. inaug. de gangraena. Resp. Maur. Casimir Wenneber. ibid. 4.

Eiusd. Diff. inaug. de inflammationum therapia. Resp. Io. Theoph. Trogmayr. ib. 4.

Eiusd. Diff. inaug. exhibens observationes quasdam clinicas. Resp. Christoph. Gottlieb. Schulze. ib. 4.

Traité de la culture des terres contenant les expériences et réflexions sur la culture des terres faites pendant l'année 1754. par Mr. DV HAMEL. Vol. III. à Paris, 12. c. f.

GVSTAV. CHRISTIAN HANDTWIG, Dissertatio de dormientibus secunda, agens de iusta somni salutaris quantitate et mensura. Resp. Io. Wilh. Frid. Lieb, Rostochi, 4.

Eiusd. Diff. de calculo in glandulis sublingualibus reperto; Resp. Io. Frid. Casim. Rosenberger, ib. 4.

Medicinische Gedanken von Säugung eines neugeborenen Kindes, worinne erwiesen wird, daß es besser sey, ein Kind durch eine Säugamme, als durch die eigene Mutter, zu stillen; von IO. ANDR. HARNISCH; andere vermehrte Auflage. Leipzig, 8.

Ausführlicher Unterricht von der Zucht und Wartung der besten Art von Schaafen; zum gemeinen Nutzen ertheilet von FR. W. HASTFER; aus dem Schwedischen übersetzt. Göttingen, 8.

Experiences physico-mécaniques sur differens sujets et principalement sur la lumière et l'électricité, produites par le frottement des corps: Traduites de l'anglois de Mr. HAVKSBEE, par feu Mr. DE BREMOND. Revûes et mises au jour avec un discours préliminaire, des remarques et des notes, par M. DESMARETS, avec des figures en taille douce. 2 Voll. à Paris, 12.

IO. ERNEST. HEBENSTREIT, Pr. Παλαιολογίας therapiae specimen XXXV. chirurgiam efficaciorum eorum, quae auferenda vel reponenda sunt, sistens. Lipsiae, 4.

Eiusd. Progr. Ordo morborum causalis. Specimen primum de methodo morbos ordinante. Lips. 4.

Eiusd. Progr. Ordo morborum causalis. Specimen alterum de genere morborum ad artis usum constituendo. ib. 4.

ABRAHAM HEEMSKERK, Diss. de animi pathematum efficacia in corpus humanum. Lugd. Batau. 4. mai.

GER. NICOL. HEERKENS, Quaest. med. An sepultura in urbe et templis prohibenda? Paris, 4. mai. (*Reperire eam quoque licet in Quaestionibus medicis Parisinis anno 1751. Groningae editis*).

LAVR. HEISTERI Descriptio noui generis plantae rarissimae et speciosissimae Africanæ ex bulbosarum classe, cui in honorem ac sempiternam memoriam Ser. Princ. ac. Dom. CAROLI Brunsv. ac Luneb. Ducis hodie regnantis, tanquam rei herbariae summi promotoris et fautoris munificentissimi, *Brunsvigiae* illustre nomen imposuit; in qua simul multae botanicorum quorundam hallucinationes indicantur et emendantur, cum tribus magnis tabulis aeneis huius plantae coloribus naturalibus repraesentatae. Brunsvigae, fol.

Eiusd. Diss. inaug. de hernia carnosa vulgo sarcocoele dicta. Resp. *Christian Dan. Heise*. Helmstad. 4. c. f. Tom. IV. Pars III.

IOH. FR. HENKELS *Pyritologia, oder Kieshistoria, als des vornehmsten Minerals, nach dessen Nahmen, Arten, Lagerstätten, Ursprung, Eisen, Kupfer, unmetallischer Erde, Schwefel, Arsenic, Silber, Gold, einfachen Theilgen, Vitriol und Schmelznutzung, aus Sammlung, Grubenbefahrung, Briefwechsel und chymischer Untersuchung, mit physikalisch-chymischen Entdeckungen und Kupfern. Neue verbesserte Auflage. Leipzig, 8.*

GEROGE HEVERMANN'S *Abhandlung der vornehmsten chirurgischen Operationen an menschlichen Körpern mit Abzeichnung der hierzu erforderlichen nöthigen und neuen Instrumenten. Erster Band. Kopenhagen und Leipzig, 8. m. K.*

Commentaria in HERMANNI BOERHAAVE Institutiones medicas, studio et opera IOH. GVIL. HEYMAN. Pars septima. Lugd. Bat. 8. (*Nouos ad omnes priores partes referendos titulos typis simul excudendos curauit Cl. Auctor, quibus suum addidit nomen et annum 1754. cum indice contentorum*).

W. S. C. HIRSCHING, *Versuch physikalisch-chymischer Lehrbegriffe zu möglicher Prüfung des Wesens, des Beständnisses und der Wirkungsart des so berücksichtigten Metall verwandelnden Meisterstücks und dessen vorgeblichen Nutzenwendungen zu einem allgemeinen Genesmittel in Absicht einiger Vergnügung einer Natur und Grundforschenden Wissbegierde entworffen. Leipzig, 8.*

Historische und physikalische Nachricht von einem Stahl- oder martialischen Trinck- und Badebrunnen des Fürstenthums Meinungen bey der Stadt Salzungen, der Grundhöfer Sauerbrunnen genannt, beschrieben von IOH. CARL. HOFMANN. Eisenach, 8.

Observations physiques et chymiques, dans lesquelles on trouve beaucoup d'expériences curieuses, et de remèdes très efficaces, et qui servent à établir

blir une chymie solide et raisonnée: traduites du latin de M. FRED. HOFFMANN; 2 Voll. à Paris, 12.

Consultations de médecine par M. FRED. HOFFMANN, traduites du latin. 4 Voll. à Paris, 12.

A treatise of the extraordinary virtues and effects of asses milk in the cure of various disorders, particularly the gout; scurvy and nervous diseases; and of its peculiar nourishing, and restorative qualities in all consumptive disorders and even the decays of old age. Illustrated with several remarkable cases. Translated from the latin of the celebrated FREDERICK HOFFMAN. London, 8.

10. V. HORN, *die zwei von Gott wohlbelohnten Wehmütter, welche unterwiesen werden, wie einer mit Leibesfrucht gesegneten Frauen in der Geburt recht beyzustehen sey. Vierte ganz neue vermehrte Auflage.* Stockholm, 8.

PETRI HORREBOWII initiamenta philosophiae naturalis, edita in gratiam iuventutis scholasticae. Hauniae et Lipsiae, 12.

CAROL. FRIDERIC. HUNDERTMARK, *Diss. de mercurii viui et cum-salibus varie mixti summa in corpus humanum vi atque efficacitate eiusque cum sulphure laxius vel arctius coniuncti virtute in idem nulla.* Resp. Frid. Conrad. Bergmann. Lipsiae, 4. mai. (*Eadem Dissertatio sub titulo: Liber singularis prodiit*).

CHRIST. FRID. IAMPERT, *Diss. inaug. de causis incrementum corporis animalis limitantibus.* Halae Magd. 4.

Della perfetta conservazione del Grano; discorso di BARTOLOMMEO INTIERI. Neapoli, fol. c. f.

IOH. GOTTFRIED IVGELS *gründliche Nachricht von dem wahren metallischen Saamen oder prima materia metallorum, wie aus derselbe das ganze mineralische Reich seinen Ursprung hat, nach eige-*

ner Erfahrung geprüft, durch ordentliche Wirkungen der Natur bestätigt, und auf eine vorher unbekannte Art der Welt mitgetheilet. Zittau, 8.

10. IVNCKER, Progr. quo matronae, Dorotheae Christianae Erxlebiae, natae Leporinae, dissertationem inauguralem comitatur. Halae Magd. 4.

Eiusd. Diss. inaug. de chronicis deliriis legitime curandis. Resp. Io. Christ. Hechtlin. ib. 4.

Eiusd. Diss. inaug. de spasmodicis eorumque quadruplici respectu. Resp. Frid. Conr. Meyenberg. ib. 4.

10H. HEINRICH GOTTLOB VON I~~STI~~^{STI}, neue Wahrheiten zum Vortheil der Naturkunde und des gesellschaftlichen Lebens der Menschen. Erster Band. Leipzig, 8.

Eiusd. Entwurf eines vernünftigen Zusammenhangs und practischen Vortrags aller Oeconomie- und Cammeral-Wissenschaften; Leipzig, 4.

CAROL. FRID. KALTSCHMIED, Diss. inaug. de adfectibus spasmodicis vagis. Resp. Sam. Christ. Ebart. Ienae, 4.

Eiusd. Progr. de vulnere capitis a chirurgo intempestive consolidato, fissura cranii neglecta, et trepanatione feliciter instituta, detecta. ib. 4.

Eiusd. Progr. de vulnere vasorum intercostalium non lethali. ib. 4.

CHRISTIAN. GOTTHILF. KIESLING, Diss. inaug. uterum post partum inflammatum sistens. Lipsiae, 4.

The analysis of inoculation comprizing the history, theorie and practice of it; with an occasional consideration of the most remarkable appearances in the small-pox; by I. KIRKPATRICK. London, 8. mai.

IAC. KISLER, Diss. de verbasco. Argentorati, 4.

LVDOV. GODOFR. KLEINII de aere, aquis et locis agri Erbacensis atque Bunbergensis largi Odenwaldi

di tractus tentamen physico-medicum. Francof. ad Moen. 8.

Doutes ou observations de M. KLEIN, sur la revue des animaux faite par le premier Homme, sur quelques animaux des classes des Quadrupèdes et Amphibies du système de la Nature de M. LINNAEVS; et des remarques sur les crustacés, sur les animaux qui ruminent, et sur la vie de l'homme comparée avec celle des animaux. Avec figures. Ouvrage traduit du Latin. à Paris, 8. mai.

Ordre naturel des ourfins de mer et fossiles, avec des observations sur les piquans des ourfins de mer et quelques remarques sur les bélemnites. Par M. THEODOR KLEIN; augmentées de six planches d'ourfins qui sont dans le cabinet de M. DE REAUMUR. Ouvrage traduit du latin avec le texte de l'auteur; à Paris, 8. mai. c. f.

An attempt to demonstrate, that all the phaenomena in nature may be explained by two simple active principles, attraction and repulsion: wherein the attractions of cohesion, gravity and magnatism are shewn to be one and the same; and the phaenomena of the latter are more particularly explained. By GOWEN KNIGHT. London, 4.

IOH. HIERONIM. KNIPHOF, Diss. inaug. de compressione. Resp. Io. Adam Umlauf. Erford. 4.
Eiusd. Diss. inaug. de pilorum usu. Resp. Iob. Gottfried. Kniphof. ib. 4.

IOH. CHR. GERH. KNOLL, Fortsetzung der Gedanken über einige Materien der Arzneywissenschaft. Quedlinburg, 8.

Regnum florae; das Reich der Blumen, mit allen seinen Schönheiten nach der Natur und ihren Farben vorgestellt; bis zootes Blatt; in Kupfer gestochen und illuminiret von GEORG WOLFG. KNORR. Nürnberg, fol.

Lapides ex celeberrimorum virorum sententia diluvii
uniuersalis testes etc. *Sammlung von Merkwür-
digkeiten der Natur und der Alterthümer des Erd-
bodens zum Beweis einer allgemeinen Sündfluth, aus
dem Reiche der Steine bewiesen; in Kupfer gesto-
chen und mit Farben ausgedruckt von ebendemselben,
bis 40. Blatt. ibid. fol.*

Deliciae naturae selectae; oder auserlesenes Natura-
lien-Cabinet, welches aus den drey Reichen der Na-
tur zeigt, was behalten und gesammelt zu werden
verdienet; bis utes Blatt; in Kupfer gestochen und
illuminiret, von eben demselben. ib. fol.

Praelectiones academicae publicae in physicae partes
opticas et his cognatas, commoda auditoribus me-
thodo conscriptae a GEORG. WOLFG. KRAFFT.
Pars III. 8. c. f.

LUDW. PHIL. KRAVSENS kluger und sorgfältiger
Gärtner, oder nützliches Handbuch für die Lieb-
haber eines wohleingerichteten Lust-Küchen- und
Baumgartens, nebst einem Anhang von Bienen.
Dritte vermehrte Auflage. Langensalza, 8. m. K.

PETER KRETSCHMERS oeconomische Practica,
oder deutliche Anweisung, wie der Ackerbau ohne
Vermehrung der Unkosten, wenigstens um ein Drit-
tel besser, als bishero geschehen, zu nutzen sey, und
zugleich Holzungen angelegt werden können. Ver-
besserte Auflage. Leipz. 8.

IO. GOTTLOB KRÜGER, Träume. Halle, 8.

Eiusd. Diss. de somno, morborum matre et filio.

Resp. Georg. Christoph Scheibner. Helmstädt, 4.

Eiusd. Diss. inaug. de lege naturae: quod in corpore
animali spasmus excipiat atonia spasmopro-
tionata. Resp. I. D. Moscherosch. ibid. 4.

Eiusd. Diss. inaug. de nitri virtute temperante. Resp.
Io. Anton Dettmer. ib. 4.

IO. GOTTLÖB KRÜGER, Diff. inaug. qua exhibentur experimenta non nulla cum aqua ostracodermatum instituta. Resp. *Christoph. Henr. Beste.* ibid. 4.

Eiusd. Diff. inaug. de differentia elateris, toni, contractionis vitalis, voluntariae, sensibilitatis et irritabilitatis. Resp. *Michal. Brandt.* ib. 4.

Eiusd. Diff. inaug. de opisthotono, emprosthotono et tetano. Resp. *Christ. Lud. Gelpke.* ibid. 4.

CHRISTOPH KUHLEMANNI Observationes quaedam circa negotium generationis in ouibus factae. Editio secunda. Lipsiae, 4. c. figg.

TIBERII LAMBERGEN, Oratio inauguralis exhibens encomia botanices eiusque in re medica utilitatem singularem. Groningae, 4. mai.

Eiusd. Lectio inauguralis sistens ephemeridem persanati carcinomatis. ib. 4. mai.

IO. CHRISTIAN LANGE, Diff. inaug. de acidorum natura et virtutibus, nec non de acido aereo in fonte. Hauniae, 4.

GEORG. AVGVST. LANGGUTH, Diff. inaug. de oculorum integritate improuidae puerorum aetati sollicitè custodienda. Resp. *Gottlob. Andreas Pasche.* Wittenbergae, 4.

Eiusd. Progr. de paradoxo Hippocratico ad Libr. de Arte. V. 20. ibid. 4.

DAN. LANGHANS, *Entdeckung eines Mittels wieder die Auszebrung der Leiber und der Geschwüre der Lungen.* Zürich, 8.

IAC. FRANC. LATIER, Quaest. med. An in partu difficili sola manus instrumentum? Resp. *Amabilis Chomel.* Paris, 4. mai.

Traitemens des maladies internes et externes; traduits du Latin de M. LAZERME; avec les formules en latin et en françois; augmentés d'un traité des maladies veneriennes par M. DIDIER DES MARETS. 2 Voll. à Paris, 12.

Nouveaux élémens d'odontologie, contenant l'Anatomie de la bouche ou la description de toutes les parties qui la composent, et de leur usage et la pratique abrégée du Dentiste avec plusieurs observations. Par M. LECLUSE. à Paris, 12. mai.

GVIL. BLAAUW VAN LEENDT Diss. inaug. de variolis. Lugd. Bat. 4. mai.

IOH. CHR. LEHMANN'S *allgemeine oeconomische Holz-Spahr-Kunst, oder deutliche Anweisung zur Erbauung vortheilhafter Stuben- und Haushaltungs-Oefen, darinnen bey 70 Arten verbesserter Oefen beschrieben, auch wie solche mit wenig Kosten erbauet, und dabey jährlich mehr als die Helfte Holz erspart werden könne, gezeiget worden. Zu aller Holz-Menage bey Waschen, Brauen, Mälzen, Gerben, Färben, Salz und Alaune, auch Vitriolsieden, Kochheerden, Brandtwein-Brennen, Töpfer- und Kalkoefen; alles aus der Erfahrung und bereits erwiesenen Proben, in 2 Theilen, nebst 10 Kupfer-Platten herausgegeben und anitzo mit einem Anhang vermehret. Neue Auflage. Leipzig, 4.*

NICOL. LEMERI, *Curius chymicus, oder vollkommener Chymist, welcher die in der Medicin vorkommende chymische Praeparata und Processse auf die vernünftigste, leichteste und sicherste Art zu verfertigen lehret. Aus dem Französischen übersetzt, und bey dieser fünften Auflage aufs neue durchgesehen, corrigiret und mit Zusätzen vermehret von IOH. CHR. ZIMMERMANN. Dresden, 8. m. K.*

FRIEDR. CHRISTIAN LESSER'S *kleine Schriften, theils zur Geschichte der Natur, theils zur Physicotheologie gehörig. Leipzig und Nordhausen, 8.*

Geschichtliche Nachricht von natürlichen Merkwürdigkeiten der Fürstl. Schwarzburgl. Rudolfsädtischen Unterherrschaft Frankenhausen; ausgefertiget von FRIEDRICH CHRISTIAN LESSER. ibid. 8.

IOH. CHRISTIAN LEVSCHNER, ad CVNRADI
Silesiam togatam spicilegia XII. Hirschbergae, 4.

Traité des eaux minerales de Spa par JEAN PHILIPPE DE LIMBOURG. à Leide, 12.

CAROLI LINNAEI Diff. de flora Anglica. Resp. *Grufberg*. Vpsal. 4.

Eiusd. Diff. stationes plantarum. ib. 4.

Eiusd. Confectaria electrico-medica. Vpsal.

Observationes anatomico-chirurgico-medicae nouae
et rariores, accurate descriptae, iconibus illustratae
a IO. LVD. LEBRECHT LOESEKE. Berolini, 4.
c. f.

Di TITO LVCREZIO CARO della natura delle
cose, libri sei; tradotti dal Latino in Italiano da
ALESSANDRO MARCHETTI, dati nuovamen-
te in luce da FRANCESCO GERBAULT. 2 Voll.
In Amsterdamo, 8. mai.

LVCRETII CARI de rerum natura libri sex cum no-
tis THOMAE CREECH. Edit. tertia. Londini,
8. mai.

CAROL GÜNTHER LVDOVICI, *Eröffnete Aca-*
demie der Kaufleute, oder vollständiges Kaufmanns-
Lexicon. 3ter Theil. Leipzig, 8. mai.

CHRISTIAN GOTTLIEB LVDWIG, Institutio-
nes pathologiae praelectionibus academicis accom-
modatae. Lipsiae, 8.

Eiusd. Institutiones therapiae generalis praelectioni-
bus academicis accommodatae. ibid. 8.

Eiusd. Diff. inaug. de diarrhoea in febribus acutis.
Resp. *Philipp. Ludov. Haenlein*. ib. 4.

Eiusd. Pr. de usu roborantium medicamentorum in
cacochymia. ib. 4.

GERARD. MAAS, Diff. inaug. de angina inflamma-
toria. Lugd. Bat. 4. mai.

La taille laterale s'exécute-t-elle plus sûrement et
plus facilement avec l'instrument connu sous le
nom de lithothome caché? Question medico-chi-

rurgicale, discuté dans les écoles de la Faculté de Medecine de Paris le 24 April 1754. sous la presidence de M. CLAUDE THOMAS GUIL-
LAVME GILBERT DE PREVAL et proposée
par HENRY IACQUES MARQVART. Quaestio
medico-chirurgica, an scalpello vagina recondito
Cystitome lateralis perfectior? à Paris. 8. (*Latine
et gallice*).

Elémens de chymie théorique par M. MARQVER;
Nouvelle edition. à Paris, 12.

Traité physique et historique, de l'aurore boreale
par M. DE MAIRAN. Seconde Edition, revûe
et augmentée de plusieurs éclaircissmens. à Paris,
4. c. f.

MAXIM. IAC. DE MAN, Diss. inaug. de natura hu-
mana, quatenus sanitatis praesentis est custos, ab-
sentis vindex. Lugd. Bat. 4. mai.

HVBERT. MARCHAND, Diss. inaug. de cardialgia
flatulenta. Argentorati, 4.

IOH. DANIEL MEYER, *Vorstellung allerhand krie-
chender, fliegender und schwimmender Thiere; so-
wohl nach ihrer äusserlichen Beschaffenheit, als auch
nach der Structur ihrer Scelette; dritter Theil. bis
50tes Blat. Nürnberg, fol. mai.*

La Medecine d'armée contenant des moyens aisés
de préserver de maladies, sur terre et sur mer,
dans toutes sortes de pays et d'en guerir sans beau-
coup de remédes ni de dépenses, les gens de
guerre et autres de quelque condition qu'ils soient.
Par M. DE MEYSEREX. Voll. III. à Paris, 12.

IOHANN DANIEL MITTELHAEVSERS *practi-
sche Abhandlung vom Accouchiren. Leipzig, 8.*

PETR. ABRAH. PAION DE MONCETS, Quaest.
med. An moxae ustulatio arthritidi? Resp. Io.
Baptist. Hatté. Paris, 4. mai.

ALEXANDRI MONRO, *Nervorum anatome contracta. Latine reddita a IO. KOOPMANS; cui subiectae sunt eiusdem explicatio motus reciproci cordis, et ductus thoracici descriptio. Franequerae, 8.*

Recueil pour servir d'éclaircissement détaillé sur la maladie de la fille d'un tireur des pierres du village de S. Geosmes, près de Langers; laquelle depuis plusieurs années jettoit des pierres, tantôt par la bouche, tantôt par la voie des urines, et à qui on en a tiré de la vessie à douze reprises différentes. Par M. MORAND. à Paris, 12.

EDMUND. THOM. MOREAU, *Quaest. med. An sclopetorum vulnera venenata? Resp. Io. Lud. Maria Solier. Paris, 4. mai.*

IACOB GOVRLES DE LA MOTTE, *Quaest. med. An suus in ictero venae sectioni locus? Resp. Amabilis Chomel. Paris, 4. mai.*

Eiusd. *Quaest. med. An a frequenti venae sectione hydrops? Resp. Io. Ludov. Maria Solier. ibid, 4. mai.*

GERHARD ANDR. MÜLLER, *Einleitung zu dem Entwurf einer neuen Methode. Frankfurth am Mayn, 8.*

MARTIN MÜLLER, *Gründlicher Bericht, wie aus des Erdbodens Beschaffenheit, vorlängstens ohnweit Ulm, daß unfehlbar Torf oder Turf seyn müssen, beurtheilet, solches auch viele Jahre über zu des gemeinen Wesens Nutzen gebrauchet, von einigen Jahren her bey einem mehr einreissenden Holz-Mangel, neuerdingen hervorgesucht, anbeneben alles was dabey zu beobachten, und wie ein solches mit seinem gehörigen Werkzeuge anzugreifen sey; aufrichtigst entdeckt worden. Ulm.*

SEBASTIAN MÜNCK, *Diff. inaug. de febre quotidiana intermittente. Argentorati, 4.*

GODOFR. SIGISM. MUNSTER, *Diff. inaug. de macie et atrophia infantum. Kilonii, 4.*

PETRI VAN MUSCHENBROEK, Dissert. phys. experimentalis de magnete, Lugduni Batav. 1729 edita, nunc vero auditoribus oblata. Viennae Austriae, 4.

FRIEDR. HERRM. LUDWIG MVZEL, *medizinische und chirurgische Wahrnehmungen. Erste Sammlung. Berlin, 8.*

An account of new Zoophyte or animal plant from Groenland in a letter to Dr. ALBERT HALIER, Praesident of the Royal Society of sciences at Göttingen; written in high German by CHRISTLOF MYLIVS; now translated into English. London, 8. c f.

A description of the Veneral Gonorrhoea, accounting for the symptoms and cure of that disorder in a new, easy and rational manner. With remarks on the present practice. Shewing the ill consequence of purging, mercurial preparations, injections, astringents. etc. By JAMES NEVILL. London, 8.

Vermischte Anmerkungen über einige auserlesene Materien zur Beförderung nützlicher Wissenschaften; entworfen von CARL LUDWIG NEVENHAHN. Leipzig, 8. (Continent physica, medica, oeconomica).

CASP. NEVMANNS Chymia med. dogmat. experimentalis, oder der gründlichen und mit Experimenten erwiesenen Chymie, vierten Bandes erster Theil. Züllichau, 4.

FRANT ANT. NICOLAI, *Abhandlung von den Fehlern des Gesichts. Berlin, 8.*

ERNEST. ANTON. NICOLAI, Diss. sistens hydro-pis pathologiam. Resp. Ernest. Henr. Davidis. Halae Magd. 4.

J. A. NOLLET, *Rede von der nöthigen Geschicklichkeit zur Erforschung der Natur; aus dem Französischen übersetzt, 8.*

- I. A. NOLLET, *Sendschreiben von der Electricität, worinnen die neuesten Entdeckungen, und die daraus herzuleitenden Folgerungen auf das genaueste gezeigt worden; aus dem Französischen übersetzt. ibid. 8. m. K.*
- IO. PHIL. NONNE, *Diss. inaug. de febris inter-mittentibus. Erford. 4.*
Chymische Universal - und Particular - Proceßse, welche Hr. Baron VON NVESSENSTEIN auf seinen Reisen mit sechs Adepten erlernet. Wien, 8.
- IOH. AVG. OEHME, *medizinische Fama: Vier Theile. Achte Auflage. Dresden, 8.*
- Philosophische, moralische und medicinische Betrachtungen über mancherley zur Hoffart und Schönheit hervor gesuchte schädliche Zwangmittel junger Leute beyderley Geschlechts, nebst dem schädlichen Gebrauche der Schnürbrüste und Planchette, oder sogenannte Planckscheide der Frauenzimmer, bey ruhigen Abendstunden wohlmeinend entworffen von GOTTLOB OELSNER. Breslau, 8.*
- A Letter to the Rev. Dr. YOUNG, concerning the cure of encysted and other kinds of tumours without the knife. With several remarkable cases, to shew, in what circumstances this practice is found useful. By W. OGLE. London, 8.*
- Graecorum chirurgici libri: SORANI unus de fracturarum signis; ORIBASII duo, de fractis et de luxatis; e collectione NICEAE ab antiquissimo et optimo codice Florentino descripti, conuersi atque editi ab ANTONIO COCCHIO. Florentiac, fol.*
- WILHELM. OWENS *Diss. de epiphyseis. Resp. Murck van Phelsum. Franequerae, 4.*
- Observations on the earths, rocks, stones, and minerals for some miles about Bristol, and on the nature of the Hotwell and the virtues of its water; by Mr. OWEN. London, 8.*

An explanation of that part of Dr. BOERHAAVE'S aphorisms, which treats of the Phthisis Pulmonalis, or the consumption; describing the rise, progress, and method of cure, peculiar to this disorder. By CHRISTOPHER PACKE. London, 8.

AVGVST. FRIDER. PALLAS Diss. inaug. de variis calculos secandi methodis. Lugd. Batau. 4. mai.

IO. CARL. CHRISTIAN. PAPE, Diss. inaug. de rationali aetiologia rheumatismi et arthritidis. Hauriae.

GOTTLIEB PAVL PAVLSEN, Specimen inaugurale observationem de carie ossis humeri sistens. Regiomonti, 4.

A physical Essay on the Animal Oeconomy; wherein the circulation of the blood, and its causes, are particularly considered; also what assistance the heart and lungs give thereto: and this both from anatomy and experiments. To which are added some occasional reflections on inflammatory disorders, and some others, which attend a disordered circulation. By FRANCIS PENROSE. London, 8.

IO. IACOB. PERTHES, Diss. inaug. de doloribus parturientium. Erfordiae, 4.

IO. PFEFFINGER Diss. inaug. de vi muscolari. Argentorat. 4.

PFEIFFERS *Abhandlung von der Gewisshheit rechtschaffener Aerzte in ihren Kuren. Lauenburg.*

ARCHANGELI PICCOLOMINI, Anatomie integra reuifa, tabulis explanata et iconibus mirificam humani corporis fabricam ad ipsum naturae archetypum exprimentibus; cum praefatione ac emendatione IOANNIS FANTONI. Veronae, fol c. f.

ANTON. GVILIELM. PLAZII de iucundis morborum causis Dissertationes septem seorsim antehac in Academia Lipsiensi editae, coniunctim nunc recusae: (1. de tabaco sternutatorio; 2. de potus
Cofa

*Cofe abufu noxio ; 3. de morbis ex munditie intempe-
ftua ; 4. de munditiei affectatae incommodis ; 5. de
morbis ex oblectamentis ; 6. 7. de oblectamentorum
incommodis. Lipsiae, 4.*

ANTON. GVILIELM. PLAZII *Abhandlung von ei-
nigen Hinderniffen der allgemeinen Gefundheit ; um
des allgemeinen Nutzens willen ins Deutsche überfetzt.
Leipzig, 4.*

Eiusd. Progr. de plantarum plethora. Lipsiae, 4.

Eiusd. Diff. inaug. de partu debili reficiundo. Resp.
Christian. Frid. Stempel. ib. 4.

CAROL. GVILIELM. POERNER Diff. inaug. sistens
experimenta de albuminis ouorum et feri sanguinis
conuenientia. Lipf. 4.

IOAN. DE POLETYKA Diff. inaug. de morbis hae-
reditariis. Lugdun. Bat. 4. mai.

Het Roonhuijsaansch Geheim in de Vroedkunde ont-
dekt, tegen de wederftrevers verdedigt etc. waar
agten is gevoegd een voorreden van HVIG
CHAMBERLEN en enige vroedkundige Aanmer-
kingen van WILLOVGBII; door Jac. de Vifcher
en HVGO VAN DE POLL. te Leiden. 8. c. f.
(*Editio altera auctior*).

ERICH PONTOPPIDANS *Versuch einer natürlichen
Historie von Norwegen. Zweyter Theil. Aus dem
Dänischen überfetzt von IOH. ADOLPH SCHEI-
BEN. Koppenhagen. 8. mai. m. K.*

IOH. HEINRICH POTT, zweyte Fortfetzung der
chymischen Untersuchungen, welche von der Litho-
geognofie, oder Erkenntniß und Bearbeitung der
Steine und Erden in Anwendung derselben zur Be-
reitung feuerfester Gefäße und Tiegel specieller han-
deln; nebst Tabellen über alle drey Theile, Berlin, 4.
m. K.

Reliqua proxime.



Conten-

Contenta in hac Parte.

1. Philosophical Transactions Vol. XLVIII. Part. I. p. 385.
2. SCHVLZII Praelectiones in Dispensatorium regium et electorale boruffo-brandenburgicum. Editio altera p. 404.
3. RAVLIN Observations de medecine p. 410.
4. DVNZE Diff. complectens experimenta varia calorem animale spectantia p. 425.
5. A BRVNN Diff. sistens experimenta quaedam circa ligaturas neruorum in viuus animalibus instituta p. 432.
6. LIGER Traité de la Goutte p. 439.
7. ALBINI Academicarum annotationum Liber primus p. 453.
8. EIVSDEM Tabulae offium humanorum p. 459.
9. KLEINII Tentamen Herpetologiae p. 462.
10. *Hamburgisches Magazin XIII und XIV Band* p. 468.
11. BROVZET Essai sur l'éducation medicinale des enfans et sur leurs maladies p. 486.
12. Recueil des pièces qui ont concouru pour le prix de l'academie royale de Chirurgie T. I. p. 494.
13. ZINN Observationes botanicae et anatomicae p. 521.
14. SCHMIEDEL Diff. qua quaedam de neruo intercostali notantur p. 527.
15. LOESEKE Observationes anatomico-chirurgico-medicae p. 531.
16. COCCHII Graecorum chirurgici libri etc. p. 535.
17. CARTHEVSER Elementa mineralogiae p. 545.
18. Noua physico-medica p. 547.
19. Continuatio indicis scriptorum physico-medicalium quae anno 1753 prodierunt p. 554.

